






وزارة التربية

الرياضيات

كتاب المعلم



١٢

الصفّ الثاني عشر أدبي
الفصل الدراسي الأوّل

الطبعة الثانية

تم تحميل ورفع المادة على منصة

أمجاد الكويت



للعودة الى الموقع اكتب في بحث جوجل



الامجاد التعليمي



انظم الى قناة التلجرام



وزارة التربية

الرياضيات

الصفّ الثاني عشر أدبي
الفصل الدراسي الأول

كتاب المعلم

اللجنة الإشرافية لدراسة ومواءمة سلسلة كتب الرياضيات

أ. حسين علي عبدالله (رئيساً)

أ. فتحية محمود أبو زور

أ. حصة يونس محمد علي

الطبعة الثانية

١٤٤٦ هـ - ١٤٤٧ هـ

٢٠٢٤ م - ٢٠٢٥ م

فريق عمل دراسة ومواءمة كتب الرياضيات للصف الثاني عشر أدبي
أ. فتحي محمد عبد الفتاح (رئيساً)

أ. محمود عبد الغني محمد

أ. سعيد أحمد علي خلف

أ. يسرى شملان أحمد البحر

أ. عيدة خلف عواد الشمري

أ. هنادي حباس غنيم المجلول

دار التّربويّون House of Education ش.م.م.م. وبيرسون إديوكيشن ٢٠١٣م

© جميع الحقوق محفوظة : لا يجوز نشر أيّ جزء من هذا الكتاب أو تصويره أو تخزينه أو تسجيله
بأيّ وسيلة دون موافقة خطيّة من الناشر.

الطبعة الثانية : ٢٠٢٣م
٢٠٢٤م



حضرة صاحب السمو الشيخ مشعل أحمد الجابر الصباح

أمير دولة الكويت

H.H. Sheikh Meshal AL-Ahmad AL-Jaber AL-Sabah
Amir Of The State Of Kuwait



سَمُو الشَّيْخِ صَبَّاحِ خَالِدِ الْحَمَادِ السَّبَّاحِ
وَلِيِّ عَهْدِ دَوْلَةِ الْكُوَيْتِ

H. H. Sheikh Sabah Khaled Al-Hamad Al-Sabah
Crown Prince Of The State Of Kuwait

مقدمة من كتاب المعلم

توجيهات عامة للمعلم

- هذه السلسلة تعمل على تنمية أساليب التفكير، وذلك بتركيزها على بناء المفاهيم الرياضية وربطها بالواقع الحياتي من خلال:
- ١ - الأنشطة العملية في استكشاف المفاهيم ودعم إحساس الطالب بهذه المفاهيم، وذلك باستخدام عدّة طرائق مختلفة: العمل في فريق. عمل مجالات رياضية. استخدام المحسوسات وشبه المحسوسات. التعبير الشفهي (التواصل) - التفكير الناقد.
 - ٢ - الاعتماد على المصوّرات، وذلك من خلال التمثيل البياني للمعلومات وقراءة البيانات الممثلة بيانياً.
 - ٣ - الاعتماد على المواقف والقصص الحياتية وربطها بالموضوعات، وكذلك توظيف الموضوعات الرياضية في حلّ المسائل الحياتية.
 - ٤ - التأكيد على فهم المفاهيم واستيعابها، والربط بين الرياضيات وباقي المواد.

تطبيق السلسلة

- لتطبيق السلسلة، يجب مراعاة ما يلي:
- وجود ملفين لكلّ تلميذ بحيث يُخصّص أحدهما للأنشطة الصفيّة واللاصفيّة، أمّا الآخر فيُخصّص للاختبارات والملحوظات الميدانية على أداء الطالب، ويُدوّن فيها المعلم، وهذا أوّل ما يقوم به، مقرونّة بتواريخ المتابعة. يُنوّع المعلم في طرائق التدريس، وخاصّة التي تشمل الاستكشاف وحلّ المشكلات.

نماذج المعلم لتقييم الطلاب تشمل:

- تقييم الأداء في حلّ المسائل.
- التقييم المستمرّ في حلّ المسائل والملاحظة والتعليم التعاوني.
- التقييم الفردي في الملاحظة والمراقبة.
- التقييم العام للطلاب.

تقييم الأداء في حلّ المسائل

الإسم التاريخ

تقييم الأداء في حلّ المسائل

① ضع إشارة ✓ قرب العبارة التي تصف بدقة أداء الطالب .

إفهم

- يقرأ المسألة بتأنّ.
- يقرأ أيّ جدول أو أيّ تمثيل بياني .
- يستطيع أن يصوغ المسألة من جديد وبطريقته وعباراته الخاصّة .
- يستطيع فهم وإدراك المعلومات المعطاة .
- يستطيع فهم وإدراك السؤال الذي يجب الإجابة عليه .

خَطَّط

- يختار الخطّة الأنسب لحلّ المسألة .
- يقدر الإجابة الصحيحة .

حُلّ

- يعمل وفقاً لمنهجية معيّنة .
- يعرض الحلّ بطريقة منظّمة وسليمة .
- يحسب بطريقة صحيحة .
- يعطي الإجابة بجملة كاملة صحيحة، مراعيًا الوحدات .

راجع ولاحظ

- يلاحظ معقولة الإجابة .
- يجرب طرقاً أخرى لحلّ المسألة .

② إتبع المواصفات التالية لتقييم أداء الطالب :

- مستوى ٤ (يتقن الطالب ١١-١٣ من المهمات السابق ذكرها). يُظهر الطالب فهماً عميقاً للمسألة ويفسّرُها بشكل موجز وواضح ويكون قادراً على ربط المسألة بعمل سبق أن أنجزه .
- مستوى ٣ (يتقن الطالب ٨-١٠ من المهمات السابق ذكرها). يفهم الطالب المسألة ويعرض الحلّ الصحيح بطريقة منظّمة وواضحة .
- مستوى ٢ (يتقن الطالب ٤-٧ من المهمات السابق ذكرها). يُظهر الطالب فهماً إجمالياً للمسألة غير أنّه قد يرتكب بعض الأخطاء في تفاصيل معيّنة .
- مستوى ١ (يتقن الطالب ٠-٣ فقط من المهمات السابق ذكرها). لا يُظهر الطالب إلا فهماً سطحيّاً أو جزئياً للمسألة وهو ليس قادراً على إتمام العمل المطلوب أو حتى اعتماد المنهجية الصحيحة، كما أنّه لا يعطي إجابة صحيحة أو تكون خطّته غير مناسبة، وفي أغلب الأحيان لا نجد حلّاً ولا تجاوباً مناسباً أو إجابة صحيحة مرفقةً بجهد ما .

المحتويات

١٣ الوحدة الأولى: التقدير واختبارات الفروض
٣٠ الوحدة الثانية: الارتباط والانحدار
٤٨ الوحدة الثالثة: السلاسل الزمنية

الوحدة الأولى: التقدير واختبارات الفروض

Estimation and Hypotheses Testing

قُسمت الدروس في هذه الوحدة إلى أجزاء.

١-١: التقدير

(١-١-١) التقدير بنقطة.

(١-١-ب) التقدير بفترة الثقة.

أولاً: إذا كان التباين للمجتمع σ^2 معلوم.

ثانياً: إذا كان التباين للمجتمع σ^2 غير معلوم، $n < 30$.

ثالثاً: إذا كان التباين للمجتمع σ^2 غير معلوم، $n \geq 30$.

١-٢: اختبارات الفروض الإحصائية

(١-٢-١) إذا كان الانحراف المعياري لمجتمع σ معلوم.

(١-٢-ب) إذا كان الانحراف المعياري لمجتمع σ غير معلوم، $n < 30$.

(١-٢-ج) إذا كان الانحراف المعياري لمجتمع σ غير معلوم، $n \geq 30$.

مقدمة الوحدة

الوحدة الأولى

التقدير واختبارات الفروض

Estimation and Hypotheses Testing

مشروع الوحدة: ما هي أفضل طريقة لإيجاد وظيفة؟

- 1 مقدمة المشروع: بعد التخرج يواجه الحاصلون على الإجازات والشهادات الجامعية تحدّي جديد هو الانخراط في سوق العمل.
 - 2 الهدف: هو البحث عن فرض عمل من خلال القيام بعدة خطوات ومحاولات متنوعة واستخدام العديد من الوسائل.
 - 3 اللوازم: حاسوب - شبكة الإنترنت.
 - 4 أسئلة حول التطبيق:
 - 1 كيف ستختار عينة عشوائية من الموظفين للاستفسار عن الوسيلة التي استخدموها في إيجاد وظيفتهم؟
 - 2 ما الخيارات التي اكتشفتها؟ نظّمها في استمارة. (إرشاد):
 - من خلال الأصدقاء والمعارف.
 - من خلال الإعلانات في الصحف والمجلات.
 - من خلال الوكالات المختصة في الربط بين سوق العمل وطلبي الوظائف.
 - من خلال البحث عبر شبكة الإنترنت.
 - من خلال التقدم مباشرة لطلب وظيفة من الشركة المختصة أو اعتماد وسيلة أخرى (اذكرها...).
 - 3 حدّد النسب المئوية لكل خيار ممّا سبق.
 - 4 التقرير: اكتب تقريراً مفصلاً يحدّد النسب التي حصلت عليها من خلال العينة العشوائية التي اعتمدها مكوّنًا جدولًا بالنسب المئوية عن كل وسيلة تمّ استخدامها لإيجاد وظيفة.
- القرار: ضمّن تقريرك بعض الاقتراحات والنصائح والاستنتاجات التي نتجت عن تلك الدراسة.

دروس الوحدة

1-1 التقدير	2-1 اختبارات الفروض الإحصائية
(1-1-1) التقدير بنقطة	(2-1-1) σ معلومة
(1-1-1) التقدير بفترّة الثقة	(2-1-1) σ غير معلومة، $n < 30$
	(2-1-1) σ غير معلومة، $n \geq 30$

- غالبًا ما تكون الأسئلة التي تطرح للاستفادة من شيء ما، أسئلة من نوع التقدير. على سبيل المثال:
 - ما هو متوسط توفير الوقود لهذا المحرك؟
 - ما هو متوسط تأثير الدواء الجديد على تأخير انتكاسة المريض؟
 - ما هو متوسط عمر الجنس البشري العاقل؟
- أما في حالة اختبار الفروض فتكون الأسئلة كما يلي:
 - هل متوسط العينة من المجتمع الإحصائي يتفق مع متوسط μ ؟
 - هل الدواء الجديد يؤخر الانتكاسة؟

مشروع الوحدة

إن الهدف الأساسي للمتخرجين من المعاهد والجامعات هو إيجاد فرصة عمل وهنا تكمن المشكلة في الوسيلة الأفضل والأفضل لإيجاد فرصة العمل.

من هنا يعالج مشروع الوحدة بعض الوسائل المتبعة للدخول في سوق العمل.

إجابات «أسئلة حول التطبيق»

(أ) قد تختلف الإجابات بحسب كل طالب.

(ب) تتنوع الاستمارات بحسب كل طالب.

(ج) تتنوع الإجابة بحسب كل طالب لأنه ربما قد يجد وسيلة غير تلك المذكورة سابقاً.

التقرير

إعرض تقريرك أمام الصف ليتم مناقشته وذلك من خلال مقارنة الأرقام والنسب المئوية المرتبطة بكل وسيلة، ثم استخدام هذه الأرقام والنسب في عملية البحث عن فرصة عمل ومقارنتها مع الأرقام المشابهة في تقارير زملائك في الصف ليعمل على اعتمادها أو تصحيحها أو حتى رفضها في حال كان هناك فوارق كبيرة في ما بينها.

الوحدة الأولى

أضف إلى معلوماتك

في الوسائل الإعلامية المرئية والمسموعة والمكتوبة تطلعك نتائج إحصائية تتحدث عن توقعات أحداث معينة تتناول انتخابات نيابية أو رئاسية أو مبيعات أو مباريات... وأكثر ما يستوقفك هو نسبة مئوية معينة مع هامش خطأ محدد والسؤال المهم هو: كيف يتم التقدير وكيف يحسب هامش الخطأ؟ توفر دروس هذه الوحدة فرصة أمام الطلاب للتعرف على التقدير وهامش الخطأ والفروض الإحصائية وكيفية احتسابها.

أين أنت الآن (المعارف السابقة المكتسبة)

- تعلمت مقاييس النزعة المركزية: المتوسط الحسابي - الوسيط - المنوال.
- تعلمت المجتمع الإحصائي.
- تعلمت العينة واستخداماتها.

ماذا سوف تتعلم؟

- يُعرّف المعلمة والإحصاء.
- إيجاد التقدير بنقطة.
- إيجاد التقدير بفترة ثقة.
- استكشاف الفروض الإحصائية.
- يُعرّف الاختبارات الإحصائية.
- اتخاذ القرار المناسب.

المصطلحات الأساسية

المعلمة - الإحصاء - التقدير - التقدير بنقطة - فترة الثقة - الفروض الإحصائية - المقياس الإحصائي - فرض العدم - فرض البديل - القرار - مستوى المعنوية - درجات الحرية.

سلم التقييم

٤	جدول النسب المئوية صحيح بالكامل - الاقتراحات والاستنتاجات ممتازة ومفيدة - التقرير منظم وواضح ويعكس نتائج بحث مميز.
٣	بعض الأخطاء في الجدول - الاقتراحات والاستنتاجات جيدة ومفيدة - التقرير منظم وواضح ولكن ينقصه الدقة في بعض النقاط.
٢	أخطاء كثيرة في الجدول - الاقتراحات والاستنتاجات مقبولة - التقرير غير منظم وينقصه الوضوح في التفاصيل.
١	معظم عناصر المشروع بحاجة إلى إعادة لأنها ناقصة.

١-١: التقدير

١ الأهداف

- يوجد التقدير بنقطة.
- يوجد التقدير بفترة ثقة.

٢ المفردات والمفاهيم الجديدة

التقدير - المعلمة - الإحصاءة - القيمة الحرجة - التقدير بنقطة - التقدير بفترة ثقة - طرقي فترة الثقة - التوزيع الطبيعي - التوزيع ت - الخطأ بالتقدير بنقطة - الخطأ بالتقدير بفترة - درجات الحرية.

٣ الأدوات والوسائل

آلة حاسبة - حاسوب - جهاز إسقاط (Data Show).

٤ التمهيد

اطلب إلى الطلاب الإجابة عن الأسئلة التالية:

(أ) أوجد المتوسط الحسابي للأعداد التالية:

١، ١، ١، ١، ١، ١

٣، ٢، ١، ١، ٢، ٣

(ب) أوجد الوسيط للأعداد التالية:

٨، ٧، ٦، ٥، ٤، ٣، ٢، ١

٦، ٦، ٦، ٦، ٦

(ج) أوجد المنوال للأعداد التالية:

٩، ٨، ١٦، ٧، ٩، ١٠

٥ التدريس

التعامل مع التقديرات يحتاج إلى الكثير من الدقة والانتباه خاصة عند إجراء الحسابات اللازمة، ومعرفة الفرق بين مستوى الثقة، وفترة الثقة، والقيمة الحرجة.

في المثال (١)

يجب التركيز على أن التقدير بنقطة، ما هو إلا المتوسط

الحسابي للأعداد والتي تمثل معدل درجات الحرارة لعينة

مكوّنة من ٤٠ شخصاً بحالة صحية جيدة مأخوذة من مجتمع إحصائي. أخبر الطلاب أن هذا المثال يعطي فكرة واضحة

عن التقدير بنقطة من خلال إيجاد المتوسط الحسابي لعينة عدد مفرداتها كبير إلى درجة تعطي تقديراً معقولاً لدرجة الحرارة.

التقدير Estimation

دعنا نفكر ونتناقش

- متوسط درجات طلاب الصف الثاني عشر في مادة الرياضيات (حيث النهاية العظمى ١٠٠ درجة) في ٥ مدارس بالكويت $\bar{x} = 81$
- هل يمكن استخدام هذه العينة لتقدير متوسط الدرجات في كافة مدارس الكويت؟
- ما هي أفضل وسيلة للتقدير لتقرب من الحقيقة؟

سبق لنا في الصف الحادي عشر تعريف المجتمع الإحصائي والعينة العشوائية والأسباب التي تؤدي إلى أخذ العينات لدراسة المجتمع بدلاً من الحصر الشامل، وذلك لتقدير الوسط الحسابي للمجتمع μ أو الانحراف المعياري σ .

ويعتبر الوسط الحسابي للمجتمع μ والانحراف المعياري للمجتمع σ من معالم المجتمع، وعادة ما تكون هذه المعالم مجهولة.

ولتقدير هذه المعالم نلجأ إلى سحب عينة عشوائية منه، ثم نحسب المتوسط الحسابي للعينة \bar{x} أو الانحراف المعياري s والذي يعتمد على قيم العينة ولا يعتمد على معالم المجتمع.

المعلمة (Parameter):

هي ثابت يصف المجتمع أو يصف توزيع المجتمع كالتوسط الحسابي μ أو الانحراف المعياري σ .

الإحصاءة (Statistic Function):

هو اقتران تعين قيمته من العينة كالتوسط الحسابي \bar{x} أو الانحراف المعياري s .

تقدير المعلمة (Parameter Estimate):

هو إحصاءة تعتمد على قيم العينة وتعكس قيمة قريبة لمعلمة المجتمع ككل وتوزعه.

في هذا الدرس سوف نتعرف طريقتين تساعدان على إيجاد قيم تقديرية لبعض معالم مجتمع معين:

- طريقة أولى: التقدير بنقطة.
- طريقة ثانية: التقدير بفترة ثقة.

١٢

Point Estimate

١-١-٢) التقدير بنقطة

التقدير بنقطة هي قيمة وحيدة محسوبة من العينة تستخدم لتقدير معلمة مجهولة من معالم المجتمع.

فمثلاً المتوسط الحسابي للعينة العشوائية \bar{x} يستخدم كتقدير بنقطة للمتوسط الحسابي للمجتمع μ ، وكذلك الانحراف المعياري للعينة s يستخدم كتقدير بنقطة للانحراف المعياري للمجتمع σ .

مثال (١)

تبين البيانات التالية معدل درجة الحرارة عند ٤٠ شخصاً بحالة صحية جيدة:

٣٧،٤	٣٦،٩	٣٦،٩	٣٦،٩	٣٦،٩	٣٧،٢	٣٦،٧	٣٦،٧	٣٧	٣٧
٣٦،٦	٣٦،٦	٣٧،١	٣٦،٥	٣٦،٤	٣٧،١	٣٦،١	٣٦،١	٣٧	٣٧،١
٣٦،٣	٣٦،٤	٣٧،٥	٣٧	٣٧،٢	٣٦،٣	٣٧	٣٦،٤	٣٦،٩	٣٦،٨
٣٦،٢	٣٧	٣٧	٣٦،٧	٣٦،٨	٣٧،٤	٣٧،١	٣٧،٥	٣٦،٨	٣٦،٤

استخدم هذه العينة لقيم معدل درجة الحرارة لتوجد أفضل تقدير بنقطة للمتوسط الحسابي μ لمعدل درجة حرارة مجتمع أخذت منه هذه العينة.

الحل:

نوجد المتوسط الحسابي \bar{x} لقيم البيانات في العينة التي تمثل

معدل درجة الحرارة عند ٤٠ شخصاً بحالة صحية جيدة.

نوجد المتوسط الحسابي \bar{x} لقيم البيانات

في العينة التي تمثل معدل درجة الحرارة عند

٤٠ شخصاً بحالة صحية جيدة.

$\bar{x} = \frac{\sum x_i}{n}$

$\bar{x} = \frac{1472,8}{40}$

∴ القيمة التقديرية للمتوسط الحسابي μ لمعدل درجة حرارة المجتمع الذي أخذت منه هذه

البيانات هي $\bar{x} = 36,82$

حاول أن تحل

- تبين البيانات التالية درجات ٤٠ طالباً في مادة الرياضيات حيث النهاية العظمى ٢٠ درجة. $16, 14, 15, 17, 18, 19, 14, 15, 14, 13, 12, 10, 9, 14, 12, 11, 10, 14, 16, 18, 17, 16, 14, 15, 11, 10, 14, 19, 12, 10, 8, 9, 11, 10, 18, 16, 15, 14$
- استخدم هذه العينة لقيم الدرجات لتوجد التقدير بنقطة للمتوسط الحسابي للمجتمع μ الذي أخذت منه هذه العينة.

١٣

العمل الأساسي في هذا الدرس هو إيجاد فترة الثقة وهي تتضمن قيم تستخدم لتقدير القيمة الصحيحة لمعلم مجتمع إحصائي.

لهذا يجب البدء بفهم مكوّنات فترة الثقة:

القيمة الحرجة، المتوسط الحسابي، الانحراف المعياري، هامش الخطأ والتركيز على إيجادها.

ومن ثم التأكد من فهم الطلاب لمبدأ القيمة الحرجة واستخدام جدول التوزيع الطبيعي لإيجادها.

في المثال (٢)

شرح مفصّل عن كيفية إيجاد القيمة الحرجة المناظرة لمستوى الثقة والخطوات المتبعة لإيجادها.

أعط أمثلة بديلة للطلاب لإيجاد القيمة الحرجة على جدول التوزيع الطبيعي المعياري مستخدمًا درجات ثقة متعددة مثل ٨٦٪، ٩٠٪، ٩٢٪...

عند احتساب المتوسط الحسابي، والانحراف المعياري،

والقيمة الحرجة، وهامش الخطأ نوجد فترة الثقة التي هي عبارة عن القيمتين $\bar{s} - h$ ، $\bar{s} + h$ اللتين تسميان طرفي فترة الثقة.

والتركيز على أنّ استخدام القيمة الحرجة $t_{\alpha/2}$ ، من جدول التوزيع الطبيعي يكون في حالة σ معلومة.

في المثال (٣)

يبين هذا المثال الخطوات المتبعة لاحتساب القيمة الحرجة $t_{\alpha/2}$ المناظرة لمستوى ثقة ٩٠٪ وذلك باستخدام جدول التوزيع الطبيعي المعياري الموجود في نهاية الوحدة.

أرشد الطلاب إلى وجوب العودة إلى هذا الجدول كلما أردنا احتساب القيمة الحرجة.

في المثالين (٤)، (٥)

يبينان بالتفصيل كيف نوجد هامش الخطأ إذا كانت σ معلومة أو غير معلومة. ثم كيف نحسب فترة الثقة $(\bar{s} - h, \bar{s} + h)$ وكيف نفسّر هذه الفترة.

Confidence Interval Estimation (١-١-١) التقدير بفترة الثقة

علمنا مما سبق أن لكل مجتمع معالم منها المتوسط الحسابي μ والانحراف المعياري σ ، ودرستنا كيفية إيجاد التقدير بنقطة لتلك المعالم. وعلمنا أن التقدير بنقطة لإحدى معالم المجتمع هو قيمة وحيدة محسوبة من العينة وبالتالي فإن احتمال الخطأ في التقدير بنقطة يكون كبيراً. ولذلك فإنه من الأفضل إيجاد فترة معينة يتوقع أن تقع معلمة المجتمع داخلها بنسبة معينة أو احتمال معين. إن مثل هذه الفترة تسمى فترة الثقة.

Confidence Interval فترة الثقة

تعريف: فترة الثقة هي فترة طرفاها متغيران عشوائيان (أي أنها فترة عشوائية) تستخدم لتقدير إحدى معالم المجتمع.

وهذه الفترة تحوي إحدى معالم المجتمع بنسبة معينة تسمى مستوى الثقة، فمثلاً إذا كان مستوى الثقة ٩٥٪ فإن نسبة الخطأ في التقدير تكون ٥٪. يرمز لمستوى الثقة بالرمز $1 - \alpha$ حيث α هو معامل مستوى الثقة وهو نسبة الخطأ في التقدير.

وعلى سبيل المثال:

- إذا كان مستوى الثقة ٩٠٪ فإن مستوى المعنوية $\alpha = 0.10$.
- وإذا كان مستوى الثقة ٩٥٪ فإن مستوى المعنوية $\alpha = 0.05$.
- أيضاً إذا كان مستوى الثقة ٩٩٪ فإن مستوى المعنوية $\alpha = 0.01$.

ومن هذه الخيارات الثلاثة، يجرى مستوى الثقة ٩٥٪ هو الأكثر انتشاراً لأنه يؤمن بالتوازن الأنسب بين الدقة الموضحة من خلال طول فترة الثقة والدقة الموضحة من خلال مستوى الثقة.

Curve of Normal Distribution المنحنى التوزيع الطبيعي

تعرفنا فيما سبق على بيان منحنى التوزيع الطبيعي، وعلمنا من خواص التوزيع الطبيعي ما يلي:

- المتوسط الحسابي = الوسيط = الموال.
- يكون بيان المنحنى على شكل ناقوس (جرس) متماثل حول محوره (μ).
- يمتد المنحنى من طرفه إلى $-\infty$ وإلى $+\infty$.
- (لا يقطع المحور الأفقي).
- المساحة تحت المنحنى تساوي الواحد الصحيح (وحدة مساحة).

المستقيم الرأسي μ يقسم المساحة تحت المنحنى إلى منطقتين متماثلتين مساحة كل منهما تساوي نصف وحدة مساحة كما في الشكل.

منحنى التوزيع الطبيعي المعياري

Curve of Standard Normal Distribution

إذا كان المتوسط الحسابي للتوزيع الطبيعي = صفر والانحراف المعياري $\sigma = 1$ يسمى التوزيع الطبيعي بالتوزيع الطبيعي المعياري. الشكل المرسوم يمثل بيان منحنى التوزيع الطبيعي المعياري. المستقيم $t = 0$ هو محور التماثل للمنحنى. تأخذ t قيم موجبة وتزداد جهة اليمين بينما تأخذ t قيمًا سالبة وتقص جهة اليسار.

القيمة الحرجة

الشكل المرسوم يبين منحنى التوزيع الطبيعي المعياري. تعلم أن المساحة تحت المنحنى الطبيعي تساوي الواحد (وحدة المساحة) ولتمثيل $(1 - \alpha)$ من المساحة الكلية تحت منحنى التوزيع الطبيعي نحصر هذه المساحة بين حدين رأسيين متساويي البعد عن المحور الرأسي كما هو موضح في الشكل. نلاحظ أن المحور الرأسي يقسم المساحة $(1 - \alpha)$ إلى نصفين كل منهما يساوي $\frac{1 - \alpha}{2}$. تكون المساحة المتبقية من المساحة الكلية هي α موزعة على طرفي المنحنى بالتساوي كل منها يساوي $\frac{\alpha}{2}$.

- نعتبر عن الحدين الرأسيين بالرمز $t_{\alpha/2}$ وبالرمز $-t_{\alpha/2}$ حيث $t_{\alpha/2}$ يفصل مساحة $\frac{\alpha}{2}$ من ذيل الطرف الأيمن ومساحة $\frac{1 - \alpha}{2}$ من المستقيم $t = 0$ ، بينما $-t_{\alpha/2}$ يفصل مساحة $\frac{\alpha}{2}$ من ذيل الطرف الأيسر ومساحة $\frac{1 - \alpha}{2}$ من المستقيم $t = 0$.
- تسمى القيمة الموجبة $t_{\alpha/2}$ بالقيمة الحرجة (Critical Value).

إيجاد القيمة الحرجة من جدول التوزيع الطبيعي المعياري لإيجاد قيمة $t_{\alpha/2}$ المناظرة للمناظرة للمساحة تحت المنحنى نحسب المساحة $\frac{1 - \alpha}{2}$ التي تقع على يسار $t_{\alpha/2}$ ويبين الضمير أي الفترة $[t_{\alpha/2}, \infty)$ ثم نكشف عنها في الجدول المرفق في نهاية الوحدة حيث العمود الأول قيم t ابتداءً من ٠.٠ وحتى ٣.٠ وأكثر. والصف الأول يمثل الأجزاء من المئة لقيم t ، ومنه يمكن تحديد قيمة $t_{\alpha/2}$.

في المثال (٦)

يوضح هذا المثال كيفية إيجاد فترة الثقة إذا كان التباين σ^2 غير معلوم وحجم العينة $n < 30$ فنستخدم الجدول التوزيع الطبيعي والانحراف المعياري للعينة مع فنوجد قيمة هامش الخطأ.

في المثال (٧)

يجب تركيز انتباه الطلاب إلى أن حجم العينة $n = 23 < 30$ ، وأن التباين σ^2 للمجتمع الإحصائي غير معلوم لذا يجب إيجاد درجات الحرية أولاً واستخدام جدول التوزيع لمعرفة القيمة الحرجة t_{α} . ساعد الطلاب في التعامل مع جدول التوزيع وكيفية إيجاد القيمة الحرجة.

في المثالين (٨)، (٩)

يبين هذان المثالان كيف نحسب هامش الخطأ وكيف نوجد فترة الثقة لمجتمع إحصائي إذا كان حجم العينة $n \geq 30$ (مثال ٨) أو $n < 30$ (مثال ٩) مستخدمين مستوى ثقة ٩٥٪. ألقت انتباه الطلاب إلى استخدام جدول التوزيع في حالة $n \geq 30$ وفي كل مرة إيجاد درجة الحرية $(n - 1)$ والقيمة الحرجة t_{α} .

هامش الخطأ

Point Estimation Error

أولاً: الخطأ بالتقدير بنقطة

علمنا فيما سبق أنه يمكن استخدام المتوسط الحسابي للعينة \bar{x} كتقدير بنقطة للمتوسط الحسابي للمجتمع μ .

ومن المتوقع أن تكون قيمة المتوسط الحسابي للعينة \bar{x} غير مساوية لقيمة المتوسط الحسابي للمجتمع μ . تسمى القيمة المطلقة للفرق بين القيمتين السابقتين بالخطأ المعياري وتساوي $\frac{\sigma}{\sqrt{n}}$ حيث σ الانحراف المعياري للمجتمع، n عدد قيم العينة (أو حجم العينة).

Interval Estimation Error

ثانياً: الخطأ بالتقدير بفترة

والآن نعرض للخطأ بالتقدير بفترة فعندما نستخدم عينة لتقدير المتوسط الحسابي لمجتمع μ يكون الخطأ في التقدير هو القيمة المطلقة للفرق بين المتوسط الحسابي للعينة \bar{x} ، والمتوسط الحسابي للمجتمع μ ويعرف هامش الخطأ h :

$$h = t_{\alpha} \times \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \text{ باحتمال } (\alpha - 1), \text{ حيث } \alpha \text{ تعبر عن نسبة الخطأ في التقدير.}$$

وحتى يكون هامش الخطأ أقل ما يمكن يجب أن نتحقق المتباينة:


$$|h| > |\mu - \bar{x}|$$

$$\text{أي أن: } |h| > |\mu - \bar{x}|$$

$$-h > \mu - \bar{x} \text{ أو } h > \bar{x} - \mu$$

$$\bar{x} - h > \mu > \bar{x} + h$$

وعليه تكون فترة الثقة هي $(\bar{x} - h, \bar{x} + h)$.



التقدير بفترة الثقة للمتوسط الحسابي للمجتمع الإحصائي μ Confidence Interval Estimation for the Mean Value μ of Statistical Population

أولاً: إذا كان التباين للمجتمع σ^2 معلوم

إذا أخذت عينة عشوائية حجمها n من مجتمع طبيعي $P(\mu, \sigma^2)$ وتباينه σ^2 معلوم فإن تقدير فترة الثقة $100(1 - \alpha)\%$ للمتوسط الحسابي μ هي: $(\bar{x} - h, \bar{x} + h)$

حيث \bar{x} المتوسط الحسابي للعينة، h هامش الخطأ.

وتسمى القيمتان $\bar{x} - h$ ، $\bar{x} + h$ طرفي فترة الثقة.

ملاحظة: عند إيجاد فترة الثقة $100(1 - \alpha)\%$ سنكتفي بمستوى الثقة 95% والتي تناظرها القيمة الحرجة $t_{\alpha} = 1.96$ (من جدول التوزيع الطبيعي المعياري).

تفسير فترة الثقة

عند اختيار عينات عشوائية مختلفة متساوية في الحجم (n) وحساب حدود فترة الثقة لكل عينة فإننا نتوقع أن 95% من فترات الثقة هذه تحوي القيمة الحقيقية للمتوسط الحسابي للمجتمع (μ) .

فمثلاً عند اختيار ١٠٠ عينة عشوائية ذات الحجم نفسه (n) وفي كل مرة نحسب \bar{x} وفترة الثقة فإننا نتوقع أن ٩٥ فترة تحوي μ الحقيقية و ٥ فترات لا تحويها.

الخطوات المتبعة لإيجاد فترة الثقة للمتوسط الحسابي μ

إذا كانت σ^2 معلومة حيث $n < 30$ أو $n \geq 30$

١. نوجد القيمة الحرجة t_{α} في المناظرة لمستوى ثقة 95% وهي 1.96 .

٢. نوجد هامش الخطأ $h = t_{\alpha} \times \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$

٣. نوجد فترة الثقة $(\bar{x} - h, \bar{x} + h)$.

مثال (٢)

أوجد القيمة الحرجة t_{α} في المناظرة لمستوى ثقة 95% باستخدام جدول التوزيع الطبيعي المعياري.

الحل:

$$\therefore \text{مستوى الثقة هو } 95\%$$

$$\therefore \alpha - 1 = 0.95$$

$$\therefore \alpha = 1 - 0.95 = 0.05$$

$$\therefore \frac{\alpha}{2} = \frac{0.05}{2} = 0.025$$

نبحث في جدول التوزيع الطبيعي المعياري عن قيمة n المناظرة للعدد 0.025 .

$$\text{فنجد } t_{\alpha} = 1.96$$

سارول أن نحل

أوجد القيمة الحرجة t_{α} في المناظرة لمستوى ثقة 97% باستخدام جدول التوزيع الطبيعي المعياري.

مثال (٣)

أوجد القيمة الحرجة t_{α} في المناظرة لمستوى ثقة 90% باستخدام جدول التوزيع الطبيعي المعياري.

الحل:

$$\therefore \text{مستوى الثقة هو } 90\%$$

$$\therefore \alpha - 1 = 0.90$$

$$\therefore \alpha = 1 - 0.90 = 0.10$$

$$\therefore \frac{\alpha}{2} = \frac{0.10}{2} = 0.05$$

نبحث في الجدول عن القيمة 0.05 فنجدها تقع بين القيمتين 0.4490 و 0.4500 .

أي أن t_{α} تقع بين 1.65 و 1.66 .

لذا نأخذ المتوسط الحسابي للقيمتين 1.65 و 1.66 كتقدير لقيمة t_{α} .

$$\therefore t_{\alpha} = \frac{1.65 + 1.66}{2} = 1.655$$

سارول أن نحل

أوجد القيمة الحرجة t_{α} في المناظرة لمستوى ثقة 99% باستخدام جدول التوزيع الطبيعي المعياري.

٦ الربط

توفر الأمثلة (١)، (٤)، (٥)، فرصة للطلاب للتعرف على كيفية استخدام التقدير في مواقف حياتية.

٧ أخطاء متوقعة ومعالجتها

قد يخطئ الطلاب في استخدام جدول التوزيع الطبيعي، و جدول التوزيع ت لإيجاد القيم الحرجة، لهذا أعطهم أمثلة أخرى لتخطي هذه المشكلة.

٨ التقييم

من المهم جداً متابعة عمل الطلاب في فقرات «حاول أن تحل» لمعرفة مدى قدرتهم على فهم واستيعاب المطلوب منهم وحلّه.

اختبار سريع

١ أقيمت دراسة على ١٠٠ شخص فتيّن أن معدّل استهلاك العصير هو ٦ لترات في الشهر الواحد. أوجد التقدير بنقطة لمعدل استهلاك العصير للمجتمع.

$$\mu = \bar{س} = ٦ \text{ لترات}$$

٢ أوجد فترة ثقة بدرجة ثقة ٩٥٪ للمعلمة المجهولة μ إذا كان لدينا: $n = ٤٠$ ، أخذت من مجتمع حيث المتوسط الحسابي μ ، والتباين ٢٠، وعلم أن $\bar{س} = ١٥$.

$$\text{فترة الثقة: } (١٦, ٣٨٦, ١٣, ٦١٤)$$

مثال (٤)



أجريت دراسة لعينة من الإناث حول معدل النبض لديهم فإذا كان حجم عينة الإناث $n = ٤٠$ والانحراف المعياري لمجتمع الإناث $\sigma = ٥$ ، $١٢,٥ = \bar{س}$ والمتوسط الحسابي للعينة $\bar{س} = ٣,٧٦$ باستخدام مستوى ثقة ٩٥٪.

- أوجد هامش الخطأ.
- أوجد فترة الثقة للمتوسط الحسابي للمجتمع الإحصائي μ .
- فسّر فترة الثقة.

الحل:

$$\begin{aligned} \text{١} \quad \therefore \text{مستوى الثقة } ٩٥\% \quad \therefore \text{القيمة الحرجة } z_{\alpha/2} &= ١,٩٦ \\ \text{بأن } \sigma \text{ معلومة} \quad \therefore \text{هامش الخطأ } h &= z_{\alpha/2} \times \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \\ \therefore n = ٤٠, \sigma = ٥, \bar{س} = ١٢,٥, \bar{س} = ٣,٧٦ & \\ \therefore h &= ١,٩٦ \times \frac{٥}{\sqrt{٤٠}} \\ &= ٣,٨٧٣٨ \end{aligned}$$

- فترة الثقة هي $(\bar{س} - h, \bar{س} + h)$

$$(٣,٨٧٣٨ - ٣,٧٦, ٣,٨٧٣٨ + ٣,٧٦) = (٨٠, ١٧٣٨, ٧٢, ٤٢٦٢)$$

- عند اختيار ١٠٠ عينة عشوائية ذات الحجم نفسه ($n = ٤٠$) وحساب حدود فترة الثقة لكل عينة فإننا نتوقع أن ٩٥ فترة تحوي القيمة الحقيقية للمتوسط الحسابي للمجتمع μ .

حاول أن تحل

٤ من المثال (٤)، إذا أجريت الدراسة على عينة أخرى من الإناث حجمها ١٠٠ والانحراف المعياري لمجتمع الإناث $\sigma = ٦$ ، $٣,٦ = \bar{س}$ والمتوسط الحسابي للعينة $\bar{س} = ١٨,٤$ باستخدام مستوى ثقة ٩٥٪.

- أوجد هامش الخطأ.
- أوجد فترة الثقة للمتوسط الحسابي للمجتمع الإحصائي μ .
- فسّر فترة الثقة.

١٩

مثال (٥)

أجريت دراسة لعينة من ١٨ طالباً حول متوسط عدد ساعات استخدام الأجهزة الذكية (TABLETS) أسبوعياً. فإذا كان الانحراف المعياري $\sigma = ١,٨$ والمتوسط الحسابي للعينة $\bar{س} = ١٥$ ، باستخدام مستوى ثقة ٩٥٪.

- أوجد هامش الخطأ.
- أوجد فترة الثقة للمتوسط الحسابي للمجتمع الإحصائي μ .
- فسّر فترة الثقة.

الحل:

$$\begin{aligned} \text{١} \quad \therefore \text{مستوى الثقة } ٩٥\% \quad \therefore \text{القيمة الحرجة } z_{\alpha/2} &= ١,٩٦ \\ \therefore \sigma \text{ معلومة} \quad \therefore \text{هامش الخطأ } h &= z_{\alpha/2} \times \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \\ \therefore n = ١٨, \sigma = ١,٨, \bar{س} = ١٥ & \\ \therefore h &= ١,٩٦ \times \frac{١,٨}{\sqrt{١٨}} \\ &= ٠,٨٣١٦ \end{aligned}$$

- فترة الثقة هي $(\bar{س} - h, \bar{س} + h)$

$$(٠,٨٣١٦ + ١٥, ٠,٨٣١٦ - ١٥) = (١٥,٨٣١٦, ١٤,١٦٨٤)$$

- عند اختيار ١٠٠ عينة عشوائية ذات الحجم نفسه ($n = ١٨$) وحساب حدود فترة الثقة لكل عينة فإننا نتوقع أن ٩٥ فترة تحوي القيمة الحقيقية للمتوسط الحسابي للمجتمع μ .

حاول أن تحل

٥ أجريت دراسة لعينة من ٢٤ طالباً حول متوسط عدد ساعات مشاهدة التلفزيون أسبوعياً. فإذا كان الانحراف المعياري $\sigma = ٥$ ، $٢ = \bar{س}$ والمتوسط الحسابي للعينة $\bar{س} = ٢١$ ، باستخدام مستوى ثقة ٩٥٪.

- أوجد هامش الخطأ.
- أوجد فترة الثقة للمتوسط الحسابي للمجتمع الإحصائي μ .
- فسّر فترة الثقة.

٢٠

«دعنا نفكر وتناقش»

- كلا، لا يمكن استخدام هذه العينة لأن نسبة الخطأ كبيرة ولأن العينة صغيرة بالنسبة إلى مجموع مدارس الكويت.
- أفضل وسيلة هي تكبير العينة أو اختيار أكثر من عينة لها نفس الحجم.

«حاول أن تحل»

١) $\bar{س} = 9, 13$ هو تقدير بنقطة للمتوسط الحسابي μ .

٢) $\frac{\alpha}{2} = 2, 17$

٣) $\frac{\alpha}{2} = \frac{2, 58 + 2, 57}{2} = 2, 575$

٤) $هـ = 0, 7056$

(٢) فترة الثقة: (١٩, ١٠٥٦, ١٧, ٦٩٤٤)

(٣) عند اختيار ١٠٠ عينة عشوائية ذات الحجم نفسه

($n = 100$) وحساب حدود فترة الثقة لكل عينة

فإننا نتوقع أن ٩٥ فترة تحوي القيمة الحقيقية

للمتوسط الحسابي μ للمجتمع الإحصائي

حاول أن تحل

١) أخذت عينة عشوائية من مجتمع طبيعي حجمها $n = 81$ ومتوسطها الحسابي $\bar{س} = 50,0$ وانحرافها المعياري $ع = 9$ ، باستخدام مستوى ثقة ٩٥٪.

٢) أوجد هامش الخطأ.

٣) أوجد فترة الثقة للمتوسط الحسابي للمجتمع الإحصائي μ .

٤) فسر فترة الثقة.


نالتاً: إذا كان التباين للمجتمع σ^2 غير معلوم وحجم العينة $n \geq 30$.

إذا أخذت عينة عشوائية حجمها n من مجتمع طبيعي تباينه σ^2 غير معلوم وحجم العينة $n \geq 30$ فإن توزيع العينة لا يؤول إلى التوزيع الطبيعي وفي هذه الحالة يلزمنا استخدام توزيع آخر هو توزيع ت للعينات الصغيرة التي حجمها $n \geq 30$ ويكون تقدير فترة الثقة $(\alpha - 1) \%$ للمتوسط الحسابي μ هي $(\bar{س} - هـ, \bar{س} + هـ)$ حيث $\bar{س}$ المتوسط الحسابي للعينة، هـ هامش الخطأ.

Properties of t Distribution


خواص التوزيع ت

- ١) توزيع متماثل حول متوسطه الحسابي والذي يساوي صفراً، ويمتد إلى ∞ من جهة اليمين وإلى $-\infty$ من جهة اليسار ويزداد قريباً من الصفر في الجهتين.
- ٢) الانحراف المعياري أكبر من الواحد.
- ٣) يعتمد هذا التوزيع على درجات الحرية والتي تساوي (حجم العينة - ١) أي $(n - 1)$.
- ٤) التوزيع ت يشبه التوزيع الطبيعي إلا أن قمته أكثر انخفاضاً من التوزيع الطبيعي.
- ٥) كلما زادت درجات الحرية اقترب هذا التوزيع من التوزيع الطبيعي ويقرب انحرافه المعياري إلى الواحد الصحيح.



إيجاد القيمة المرجحة من جدول توزيع ت.

- لإيجاد القيمة المرجحة من جدول توزيع ت حيث يبين العمود الأول قيم درجات الحرية ($n - 1$) وتبدأ من ١ إلى ٣٠ وأكثر والصف الأول يمثل قيم $\frac{\alpha}{2}$ ومنه يمكن تحديد $ت = \frac{\alpha}{2} - ١$.



مثال (٧)

أخذت عينة عشوائية بسيطة حجمها $n = 23$ من مجتمع طبيعي. أوجد القيمة المرجحة $ت$ في المناظرة لمستوى الثقة ٩٥٪ باستخدام جدول توزيع ت.

الحل:

$\therefore n = 23$

\therefore درجات الحرية $(n - 1) = 23 - 1 = 22$

\therefore مستوى الثقة هو ٩٥٪

$\therefore \alpha = 1 - 0,95 = 0,05$

$\therefore \frac{\alpha}{2} = 0,025$

ومن جدول التوزيع ت تكون قيمة $ت = 2,074$.

حاول أن تحل

١) أخذت عينة عشوائية بسيطة حجمها $n = 20$ من مجتمع طبيعي. أوجد القيمة المرجحة $ت$ في المناظرة لمستوى الثقة ٩٥٪ باستخدام جدول توزيع ت.

نالتاً: إذا كان التباين للمجتمع σ^2 غير معلوم وحجم العينة $n < 30$

الخطوات المتبعة لإيجاد فترة الثقة للمتوسط الحسابي μ

إذا كانت σ^2 غير معلومة حيث $n < 30$

- ١) توجد القيمة المرجحة $ت$ في المناظرة لمستوى ثقة ٩٥٪ وهي ١,٩٦
- ٢) توجد هامش الخطأ $هـ = ت \times \frac{ع}{\sqrt{n}}$
- ٣) توجد فترة الثقة $(\bar{س} - هـ, \bar{س} + هـ)$.

مثال (٦)

عينة عشوائية حجمها ٣٦، فإذا كان المتوسط الحسابي للعينة ٦٠ وتباينها ١٦، باستخدام مستوى ثقة ٩٥٪.

- ١) أوجد هامش الخطأ.
- ٢) أوجد فترة الثقة للمتوسط الحسابي للمجتمع الإحصائي μ .
- ٣) فسر فترة الثقة.

الحل:

١) مستوى الثقة ٩٥٪ \therefore القيمة المرجحة $ت = 1,96$

$\therefore \sigma^2$ غير معلوم، $n < 30$ \therefore هامش الخطأ $هـ = ت \times \frac{ع}{\sqrt{n}}$

\therefore التباين $ع = 16$

\therefore الانحراف المعياري $ع = 4$

$\bar{س} = 60, n = 36$

$هـ = 1,96 \times \frac{4}{\sqrt{36}} = 1,3066$

٢) فترة الثقة هي $(\bar{س} - هـ, \bar{س} + هـ)$

$(60 - 1,3066, 60 + 1,3066) = (58,6934, 61,3066)$

٣) عند اختيار ١٠٠ عينة عشوائية ذات الحجم نفسه ($n = 36$) وحساب حدود فترة الثقة لكل عينة فإننا نتوقع أن ٩٥ فترة تحوي القيمة الحقيقية للمتوسط الحسابي للمجتمع μ .

٥ (١) هـ $\approx 1,0002$

(٢) فترة الثقة: (٢٢, ٠٠٠٢ ، ١٩, ٩٩٩٨)

(٣) عند اختيار ١٠٠ عينة عشوائية ذات الحجم نفسه

(ن = ٢٤) وحساب حدود فترة الثقة لكل عينة

فإننا نتوقع أن ٩٥ فترة تحوي القيمة الحقيقية

للمتوسط الحسابي μ للمجتمع الإحصائي.

٦ (١) هـ = ١,٩٦

(٢) فترة الثقة: (٥١, ٩٦ ، ٤٨, ٠٤)

(٣) عند اختيار ١٠٠ عينة عشوائية ذات الحجم نفسه

(ن = ٨١) وحساب حدود فترة الثقة لكل عينة

فإننا نتوقع أن ٩٥ فترة تحوي القيمة الحقيقية

للمتوسط الحسابي μ للمجتمع الإحصائي.

٧ ت $\frac{\alpha}{2} = 2,093$

٨ (١) هـ $\approx 1,39$

(٢) فترة الثقة: (٩, ٧٩ ، ٧, ٠١)

٩ (١) هـ $\approx 2,1528$

(٢) فترة الثقة: (٣٨, ١٥٢٨ ، ٣٣, ٨٤٧٢)

مثال (٨)
أخذت عينة عشوائية من مجتمع طبيعي حجمها $n = 25$ ، فإذا كان الانحراف المعياري للعينة (ع) يساوي ١٠ ومتوسطها الحسابي (\bar{x}) يساوي ١٥، استخدم مستوى ثقة ٩٥٪ لإيجاد:
١ هامش الخطأ.
٢ فترة الثقة للمتوسط الحسابي للمجتمع الإحصائي μ .

الحل:
١ σ غير معلوم، $n \geq 30$
∴ نستخدم توزيع ت.
∴ $n = 25$
∴ درجات الحرية (ن - ١) = $25 - 1 = 24$
∴ مستوى الثقة $1 - \alpha = 95\%$
∴ $1 - \alpha = 0,95 \Rightarrow \alpha = 0,05$
∴ $\frac{\alpha}{2} = 0,025$
من جدول توزيع ت تكون قيمة ت $\frac{\alpha}{2}$ = $2,064$
هامش الخطأ هـ = $t_{\frac{\alpha}{2}} \times \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$
هـ = $2,064 \times \frac{10}{\sqrt{25}}$
هـ = $4,128$
٢ فترة الثقة = ($\bar{x} - \text{هـ}$ ، $\bar{x} + \text{هـ}$)
= $(15 - 4,128 + 15,04, 128 + 15,04, 128) = (19, 128, 10, 872)$

حاول أن تحل

٨ أوجد فترة ثقة ٩٥٪ للمتوسط الحسابي للمجتمع الإحصائي μ علمًا أن العينة أخذت من مجتمع طبيعي.
إذا كان لدينا $\bar{x} = ٤$ ، $s = ٨$ ، $n = ٣$ ، $٣ = n$

والآن، بعد أن علمنا كيف توجد القيم الحرجة ت، يمكننا أن نجد هامش الخطأ هـ وفترة الثقة.

هامش الخطأ للمتوسط الحسابي للمجتمع الإحصائي μ (في حالة σ^2 غير معلوم، $n \geq 30$)
Margin of Error for Mean Value of Statistical Population
Where σ^2 is not known and $n \geq 30$
هـ = $t_{\frac{\alpha}{2}} \times \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$ حيث σ الانحراف المعياري للعينة

فترة الثقة للمتوسط الحسابي للمجتمع الإحصائي μ (في حالة σ^2 غير معلوم، $n \geq 30$)
Confidence Interval for Mean Value of Statistical Population where σ^2 is not known and $n \geq 30$
($\bar{x} - \text{هـ}$ ، $\bar{x} + \text{هـ}$)

الخطوات المتبعة لإيجاد فترة الثقة للمتوسط الحسابي μ
١ إذا كانت σ غير معلومة، $n \geq 30$
٢ توجد درجات الحرية (ن - ١).
٣ توجد القيمة الحرجة ت في المناظرة لدرجة ثقة ٩٥٪ من جدول توزيع ت.
٤ توجد هامش الخطأ هـ = $t_{\frac{\alpha}{2}} \times \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$
٥ توجد فترة الثقة ($\bar{x} - \text{هـ}$ ، $\bar{x} + \text{هـ}$).

ويمكن تلخيص الحالات الثلاث السابقة كما في الجدول التالي:

الانحراف المعياري (σ)	حجم العينة (ن)	هامش الخطأ (هـ)	فترة الثقة ($\bar{x} - \text{هـ}$ ، $\bar{x} + \text{هـ}$)
معلوم	$30 < n$ $30 \geq n$	$\frac{\sigma}{\sqrt{n}} \times t_{\frac{\alpha}{2}}$ $\frac{\sigma}{\sqrt{n}} \times z_{\frac{\alpha}{2}}$	$(\bar{x} - \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \times t_{\frac{\alpha}{2}}$ ، $\bar{x} + \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \times t_{\frac{\alpha}{2}}$) $(\bar{x} - \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \times z_{\frac{\alpha}{2}}$ ، $\bar{x} + \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \times z_{\frac{\alpha}{2}}$)
غير معلوم (تستبدل σ بـ s)	$30 < n$ $30 \geq n$	$\frac{s}{\sqrt{n}} \times t_{\frac{\alpha}{2}}$ $\frac{s}{\sqrt{n}} \times z_{\frac{\alpha}{2}}$	$(\bar{x} - \frac{s}{\sqrt{n}} \times t_{\frac{\alpha}{2}}$ ، $\bar{x} + \frac{s}{\sqrt{n}} \times t_{\frac{\alpha}{2}}$) $(\bar{x} - \frac{s}{\sqrt{n}} \times z_{\frac{\alpha}{2}}$ ، $\bar{x} + \frac{s}{\sqrt{n}} \times z_{\frac{\alpha}{2}}$)

مثال (٩)
أخذت عينة عشوائية حجمها $n = 60$ ، فإذا كان الانحراف المعياري للعينة (ع) يساوي ١٨ ومتوسطها الحسابي (\bar{x}) يساوي ٣٦، استخدم مستوى ثقة ٩٥٪ لإيجاد:
١ هامش الخطأ.
٢ فترة الثقة للمتوسط الحسابي للمجتمع الإحصائي μ .

الحل:
١ σ غير معلوم، $n \geq 30$
∴ القيمة الحرجة ت في المناظرة لمستوى ثقة ٩٥٪ = $1,96$
∴ $n = 60$
∴ $\frac{\sigma}{\sqrt{n}} \times t_{\frac{\alpha}{2}}$
هـ = $1,96 \times \frac{18}{\sqrt{60}}$
هـ = $4,5546$
٢ فترة الثقة = ($\bar{x} - \text{هـ}$ ، $\bar{x} + \text{هـ}$)
= $(36 - 4,5546 + 36, 4, 5546) = (40, 5546, 31, 4454)$

حاول أن تحل

٨ أخذت عينة عشوائية من ٢٠ نيتة لدراسة نموها. فإذا كان متوسط النمو = ٣٦ سم خلال عام والانحراف المعياري للعينة = ٤ سم، استخدم مستوى ثقة ٩٥٪ لإيجاد:
١ هامش الخطأ.
٢ فترة الثقة للمتوسط الحسابي للمجتمع الإحصائي μ .

٢-١: اختبارات الفروض الإحصائية

اختبارات الفروض الإحصائية

Statistical Hypotheses Testing



دعنا نفكر ونتناقش
يتبع مصنع نوعاً معيناً من المعالبات مسجّل على العلبة أن الوزن الصافي ٢٠٠ جرام.
فإذا تمّ أخذ عينة حجمها ١٠٠ علبة وتمّ حساب المتوسط الحسابي لأوزان هذه العينة فوجد أنه ١٩٧,٣ جراماً، فهل يمكن الحكم على هذا المصنع بأنه يقوم بغش تجاري؟ ما هي حثيات هذا الحكم؟

نحن نعلم أنه في كثير من الأحيان وفي مواقف معينة نحتاج إلى اتخاذ قرار بناء على معلومات محددة وحيثيات معقولة لها مبررها، لذلك دعنا ندرس ما يسمى بالفرض الإحصائي واختبارات الفروض الإحصائية.

Statistic Hypothesis

تعريف: الفرض الإحصائي

هو ادعاء معيّن مبني على حيثيات معقولة حول معلمة من معالم المجتمع مثل المتوسط الحسابي μ أو الانحراف المعياري σ .

تعريف: المقياس الإحصائي

هو قيمة وحيدة محسوبة من العينة تحت شروط معينة.

تعريف: اختبارات الفروض الإحصائية (اختبار المعنوية)

هي طريقة معيارية لاختبار ادعاء ما حول معلمة من معالم المجتمع.

ملاحظة: سنكتفي في هذا الموضوع بدراسة معلمة واحدة من معالم المجتمع وهي المتوسط الحسابي μ . إليك بعض الأمثلة عن الفروض التي يمكن اختبارها من خلال الطرق التي سنتطرقها في هذا الدرس. على سبيل المثال:

- في إدارة الأعمال: تدعي إحدى الصحف في مقالها أنّ معظم الموظفين يجدون عملاً عن طريق وكالات التوظيف.
- في الطب: يدعي باحثون في الطب أنّ متوسط درجة حرارة جسم أي بالغ معاف ليست ٣٧ سيليزية.
- في سلامة الطيران المدني: تدعي إدارة الطيران المدني في الكويت أنّ متوسط وزن المسافرين (مع حقائبه) يتعدى الوزن المسموح منذ عشرين سنة والبالغ ٨٤ كجم.

سوف نتعلم

- القيمة الحرجة.
- مستوى المعنوية.
- درجات الحرية.
- الفروض.
- الاختبار الفروض.
- فرض العدم.
- الفرض البديل.

١ الأهداف

- يوجد القيمة الحرجة، مستوى المعنوية، درجة الحرية.
- يضع فرض العدم والفرض البديل.
- يتخذ القرارات المناسبة بالقبول أو الرفض.

٢ المفردات والمفاهيم الجديدة

الفرض - الفرض الإحصائي - المقياس الإحصائي - اختبار الفروض الإحصائية - فرض العدم - الفرض البديل.

٣ الأدوات والوسائل

آلة حاسبة - حاسوب - جهاز إسقاط (Data Show).

٤ التمهيد

اطلب إلى الطلاب الإجابة عن الأسئلة التالية:

(أ) ما القيمة الحرجة α لمستويات الثقة: ٩٥٪، ٩٠٪، ٨٠٪؟

(ب) ما الفرق بين مستوى الثقة ومستوى المعنوية؟

(ج) متى يستخدم التوزيع t ؟ ومتى يستخدم التوزيع الطبيعي؟

(د) ما هي درجات الحرية؟

Null and Alternative Hypotheses

فرض العدم والفرض البديل

- فرض العدم (ف): يفيد بأن قيمة معلمة المجتمع (مثل المتوسط الحسابي μ) تساوي قيمة مزعومة. نختبر فرض العدم مباشرة أي نفترض بأنه صحيح وتتوصل إلى خلاصة برفض أو عدم رفض ف.
- الفرض البديل (ف): يفيد بأن للمعلمة قيمة تختلف نوعاً ما عن فرض العدم (ف).
- يضم الشكل الرمزي للفرض البديل أحد هذه الرموز: $>$ أو $<$ أو \neq .

وستقتصر دراستنا على الحالة (ف). فمثلاً: $\mu = 98,6$ ، $\mu < 98,6$ ، $\mu \neq 98,6$.

الخطوات المتبعة لإجراء اختبار الفروض الإحصائية:

- 1 صياغة الفروض الإحصائية (فرض العدم ف، والفرض البديل ف).
- 2 التحقق من الانحراف المعياري للمجتمع σ (معلوم أم غير معلوم) وتحديد حجم العينة (ن) ومن ثم إيجاد المقياس الإحصائي للاختبار (ت أو ت)، (مسترشداً بالجدول التالي):


حجم العينة (ن)	المقياس الإحصائي (ت أو ت)	الانحراف المعياري (σ)
لا يشترط حجم معين للعينة	$\frac{\bar{x} - \mu}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}}$	معلوم
$n < 30$	$\frac{\bar{x} - \mu}{\frac{s}{\sqrt{n}}}$	غير معلوم
$n \geq 30$	$\frac{\bar{x} - \mu}{\frac{s}{\sqrt{n}}}$	(تستبدل σ بـ s)

3 تحديد مستوى المعنوية α وحساب القيمة الجدولية t_{α} من جدول التوزيع الطبيعي المعياري أو القيمة الجدولية t_{α} من جدول ت ذي درجات حرية.

4 تحديد منطقة القبول: (t_{α} ، t_{α}) أو ($-t_{\alpha}$ ، t_{α}) كما هو موضح بالشكل.

5 اتخاذ القرار الإحصائي (قبول فرض العدم) أو (رفض فرض العدم وقبول الفرض البديل).

ملاحظة: ستقتصر دراستنا على مستوى ثقة ٩٥٪.



٥ التدريس

في هذا الدرس يتعلّم الطالب كيفية وضع فروض واتخاذ القرارات المناسبة على ضوء نتائج الحسابات التي سيقوم بها. ابدأ بتفسير أنّ في الإحصاء، الفرض هو ادّعاء أو تصريح حول خاصية ما للمجتمع. لا اختبار صوابية هذا الادّعاء علينا القيام بعدة خطوات متسلسلة:

- وضع الفروض H_0 ، H_1 المناسبة.
- احتساب القيمة U أو T (الاختبار الإحصائي).
- إيجاد الفترة المناسبة.

- اتخاذ قرار:
 - رفض فرض العدم
 - قبول فرض العدم

في المثال (١)

في هذا المثال يدرك الطالب متى عليه استخدام المقياس U أو المقياس T (عند معرفة الانحراف المعياري σ نستخدم U)، وأن القيمة الجدولية U_{α} تستخرج من الجدول للتوزيع الطبيعي المعياري كما في الدرس السابق.

شدد للطلاب على ضرورة الانتباه ما إذا كانت القيمة المعطاة هي تباين أو انحراف معياري.

ذكّرهم بأن الانحراف المعياري \sqrt{v} التباين.

في الأمثلة (٢)، (٣)، (٤)

ترتكز هذه الأمثلة على قبول فرض العدم أو الفرض البديل. يطبّق الطلاب فيها الخطوات اللازمة بالتسلسل. شدّد لهم على ضرورة الانتباه إلى الفرق بين مستوى المعنوية ومستوى الثقة، وأن حدّي الفترة ما هما إلا القيمة الجدولية (القيمة الحرجة) ومعكوسها الجمعي، وأن القيمة T أو U يمكن أن تكون سالبة، عندما يكون المتوسط الحسابي للعينة أصغر من قيمة الفرض.

شدّد على أن صياغة الإجابة النهائية يمكن أن تتم بعدة طرق، مع ضرورة ذكر: رفض فرض العدم أو عدم رفض فرض العدم.

نبّه الطلاب إلى ضرورة استخدام المقياس الإحصائي T في المثال (٤) لأن حجم العينة $n = 10 > 30$ والانحراف المعياري σ للمجتمع الإحصائي غير معلوم.

(١-٢) إذا كان الانحراف المعياري للمجتمع σ معلوم

مثال (١)

ترزم شركة أن متوسط رواتب موظفيها يساوي ٤٠٠٠ دينار كويتي. إذا أخذت عينة من ٢٥ موظفًا، ووجد أن متوسط رواتب العينة هو ٣٩٥٠ دينارًا كويتيًا فإذا علمت أن الانحراف المعياري للمجتمع $\sigma = 120$ دينارًا، وضّح كيفية إجراء الاختبار الإحصائي بمستوى ثقة ٩٥٪.

١ صياغة الفروض

$$H_0: \mu = 4000 \text{ مقابل } H_1: \mu \neq 4000$$


٢

$$\sigma = 120 \text{ (معلومة)}$$

$$n = 25 \text{ (معلومة)}$$

$$\alpha = 0.05 \text{ (معلومة)}$$

$$U = \frac{\bar{x} - \mu}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}} = \frac{3950 - 4000}{\frac{120}{\sqrt{25}}} = -2.08$$



$$U_{\alpha/2} = 1.96$$

$$\alpha = 0.05$$

$$U = -2.08 < -1.96$$

$$\therefore \text{القرار: نرفض فرض العدم } \mu = 4000 \text{ ونقبل الفرض البديل } \mu \neq 4000$$

حاول أن تحل

١ يزعم صانع إطارات أن متوسط عمر الإطارات التي يصنعها $\mu = 25000$ كم. إذا أخذت عينة عشوائية من ١٥ إطارًا وأظهرت أن متوسطها الحسابي $\bar{x} = 27000$ كم. إذا علمت أن الانحراف المعياري للمجتمع $\sigma = 5000$ كم فوضّح كيفية إجراء الاختبار الإحصائي لمستوى ثقة ٩٥٪.

مثال (٢)

بيّنت الدراسة أن قوة تحمل أسلاك معدنية لها متوسط حسابي $\mu = 1800$ كجم مع انحراف معياري $\sigma = 150$ كجم. ويؤكد الأخصائيون في المصنع المنتج لهذه الأسلاك أن بإمكانهم زيادة قوة تحمل هذه الأسلاك، وتأكيدًا على ذلك تم اختبار عينة من ٤٠ سلكًا فتمّ أن متوسط تحمل هذه الأسلاك يساوي ١٨٤٠ كجم.



هل يمكن قبول مثل هذا الفرض بمستوى معنوية $\alpha = 0.05$ ؟

١ صياغة الفروض:

$$H_0: \mu = 1800 \text{ مقابل } H_1: \mu > 1800$$

٢

$$\sigma = 150 \text{ (معلومة)}$$

$$n = 40 \text{ (معلومة)}$$

$$\alpha = 0.05 \text{ (معلومة)}$$

$$U = \frac{\bar{x} - \mu}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}} = \frac{1840 - 1800}{\frac{150}{\sqrt{40}}} = 1.6865$$

$$U_{\alpha} = 1.645$$

$$U = 1.6865 > 1.645$$

$$\therefore \text{القرار يقبل فرض العدم } \mu = 1800$$

حاول أن تحل

٢ متوسط العمر لعينة من ١٥٠ مصباحًا كهربائيًا مصنعة في أحد المصانع هو $\bar{x} = 1580$ ساعة بالتحرف معياري $\sigma = 120$ ساعة. يقول صاحب المصنع أن متوسط العمر $\mu = 1620$ ساعة.

اختبر الفرض $H_0: \mu = 1620$ ساعة مقابل الفرض $H_1: \mu < 1620$ ساعة باختبار مستوى معنوية $\alpha = 0.05$

٦ الربط

الأمثلة (١-٤)، تسمح للطالب التعرف على مجالات استخدام اختبارات الفروض الإحصائية في المواقف الحياتية.

٧ أخطاء متوقعة ومعالجتها

من الأخطاء الشائعة جدًا التي يقع فيها الطلاب في اتخاذ القرار إن كان من جهة رفض أو عدم رفض فرض العدم. شدد للطلاب على ضرورة الانتباه دائمًا إلى هذه الفروض والعودة إلى فقرة «معيار القرار» وفقرة «ملخص الخطوات» في كتاب الطالب لتجنب الوقوع بها وارتكابها.

٨ التقسيم

تابع عمل الطلاب في فقرات «حاول أن تحل»، للتأكد من أنهم يتبعون الخطوات جميعها وبالتسلسل الصحيح للوصول إلى النتيجة النهائية.

(١-٢-ب) إذا كان الانحراف المعياري للمجتمع σ غير معلوم، $n < 30$

(مثال (٣))

إذا كانت $n = 80$ ، $\bar{x} = 37$ ، $s = 1,79$ ،
اختبر الفرض بأن $\mu = 37$ عند مستوى معنوية $\alpha = 0,05$.

الحل:

١ صياغة الفروض

ف: $\mu = 37$ مقابل ف: $\mu \neq 37$

٢ σ غير معلومة، $n < 30$

٣ نستخدم المقياس الإحصائي t : $\frac{\bar{x} - \mu}{\frac{s}{\sqrt{n}}}$

٤ $n = 80$ ، $\bar{x} = 37$ ، $s = 1,79$

٥ $t = \frac{\bar{x} - \mu}{\frac{s}{\sqrt{n}}}$

٦ $t = \frac{37 - 37,2}{\frac{1,79}{\sqrt{80}}} = -0,999$

٧ $\alpha = 0,05$ ← $\frac{\alpha}{2} = 0,025$

٨ $t_{\alpha/2, n-1} = 1,96$

٩ منطقة القبول هي $(-1,96, 1,96)$

١٠ $-0,999 \in (-1,96, 1,96)$

١١ القرار بقبول فرض العدم $\mu = 37$.

حاول أن تحل

١٢ متوسط العمر لعينة من ١٠٠ مصباح كهربائي مصنعة في أحد المصانع $\bar{x} = 1570$ ساعة بانحراف معياري $s = 120$ ساعة. يقول صاحب المصنع إن متوسط العمر $\mu = 1600$ ساعة للمصابيح المصنعة في المصنع. اختبر صحة الفرض $\mu = 1600$ ساعة مقابل الفرض $\mu \neq 1600$ ساعة وباختيار مستوى معنوية $\alpha = 0,05$.
(إرشاد: ف: $\mu = 1600$ ، ف: $\mu \neq 1600$).



(مثال (٤))

يعتقد مدير شركة دراسات إحصائية أن متوسط الإنفاق الشهري على الطعام في منازل مدينة معينة يساوي ٢٩٠ دينارًا كويتيًّا. فإذا أخذت عينة عشوائية من ١٠ منازل تبين أن متوسطها الحسابي $\bar{x} = 283$ دينارًا وانحرافها المعياري $s = 32$ دينارًا.

فهل يمكن الاعتماد على هذه العينة لتأكيد ما افترضه؟ استخدم مستوى ثقة ٩٥٪ (علمًا بأن المجتمع يتبع توزيعًا طبيعيًّا).

الحل:

١ صياغة الفروض

ف: $\mu = 290$ مقابل ف: $\mu \neq 290$

٢ σ غير معلومة، $n = 10$ ($n < 30$)

٣ نستخدم المقياس الإحصائي t : $\frac{\bar{x} - \mu}{\frac{s}{\sqrt{n}}}$

٤ $n = 10$ ، $\bar{x} = 283$ ، $s = 32$

٥ $t = \frac{\bar{x} - \mu}{\frac{s}{\sqrt{n}}}$

٦ $t = \frac{283 - 290}{\frac{32}{\sqrt{10}}} = -0,6917$

٧ مستوى الثقة ٩٥٪، درجات الحرية $(n - 1) = 10 - 1 = 9$

٨ $\alpha = 0,05$ ← $\frac{\alpha}{2} = 0,025$

٩ $t_{\alpha/2, n-1} = 2,262$

١٠ منطقة القبول هي $(-2,262, 2,262)$

١١ $-0,6917 \in (-2,262, 2,262)$

١٢ القرار بقبول فرض العدم $\mu = 290$.

١٣ يمكن الاعتماد على هذه العينة.

حاول أن تحل

١٤ في المثال (٤)، إذا أجريت دراسة إحصائية أخرى على المدينة ذاتها وتبين من خلالها أن $\bar{x} = 296$ ، $s = 5$ لعينة من ١٠ منازل مع استخدام درجة الثقة نفسها. فهل يبقى افتراض المدير عند الشركة صحيحًا أم لا؟ وضح إجابتك.

اختبار سريع

لدينا: $n = 400$ ، $\bar{x} = 18$ ، $s = 36$ ، $\mu = 16,6$

١ ما قيمة t ؟

$$t = \frac{\bar{x} - \mu}{\frac{s}{\sqrt{n}}} = \frac{16,6 - 18}{\frac{36}{\sqrt{400}}} = -0,46$$

٢ مستوى ثقة ٩٥٪، ضع فرض العدم، والفرض البديل، واتخذ القرار المناسب.

ف: $\mu = 16,6$ مقابل ف: $\mu \neq 16,6$

$$t_{\alpha/2, n-1} = 1,96$$

إذا نرفض فرض العدم، $\mu = 16,6$

ونقبل الفرض البديل $\mu \neq 16,6$

٩ إجابات وحلول

«دعنا نفكر ونتناقش»

لا يمكن الحكم لعدم كفاية المعطيات.

«حاول أن تحل»

١ ف. $\mu = 25000$

ف. $\mu \neq 25000$

$$u = \frac{27000 - 25000}{150} \approx 1,0492$$

فترة الثقة هي: $(-1,96, 1,96)$ و $1,0492$ تقع

داخل الفترة، إذًا نقبل فرض العدم

ف. $\mu = 25000$

٢ ف. $\mu = 1620$ مقابل ف. $\mu \neq 1620$

$u = -3,9192$

فترة الثقة: $(-1,96, 1,96)$

$-3,9192$ لا تقع على الفترة $(-1,96, 1,96)$

إذًا نرفض فرض العدم ف. $\mu = 1620$

٣ ف. $\mu = 1600$

ف. $\mu \neq 1600$

$u = -2,5$

فترة الثقة: $(-1,96, 1,96)$

$-2,5$ لا تقع على الفترة $(-1,96, 1,96)$

إذًا نرفض فرض العدم ف. $\mu = 1600$

٤ ف. $\mu = 290$ مقابل ف. $\mu \neq 290$

$t = 3,7948$

فترة القبول: $(-2,262, 2,262)$

$3,7948$ فترة القبول

∴ القرار برفض فرض العدم $\mu = 290$

مُؤَرَّن

١-١

التقدير

Estimation

المجموعة ١ تمارين أساسية

- (١) أوجد القيمة الحرجة $z_{\alpha/2}$ المناظرة لكل مستويات الثقة التالية ، وذلك باستخدام جدول التوزيع الطبيعي المعياري:
- (أ) $z_{0,05}$ (ب) $z_{0,1}$
- (ج) $z_{0,01}$ (د) $z_{0,05}$
- (٢) عينة عشوائية حجمها $n = 64$ أخذت من مجتمع إحصائي تباينه $\sigma^2 = 16$ ، فإذا علم أن المتوسط الحسابي للعينة $\bar{x} = 13$ ، باستخدام مستوى ثقة 95%
- (أ) أوجد هامش الخطأ.
- (ب) أوجد فترة الثقة للمتوسط الحسابي للمجتمع الإحصائي μ .
- (ج) فسر فترة الثقة.
- (٣) قامت شركة عالمية بدراسة لمعرفة كفاءة أداء سيارتها، فأخذت عينة من 1000 سيارة. استنتجت أن السيارة تبقى في حالة جيدة عند متوسط حسابي $\bar{x} = 5$ سنوات. علمًا بأن الانحراف المعياري للمجتمع $\sigma = 0,5$ ، باستخدام مستوى ثقة 95%
- (أ) أوجد هامش الخطأ.
- (ب) أوجد فترة الثقة للمتوسط الحسابي للمجتمع الإحصائي μ .
- (ج) فسر فترة الثقة.
- (٤) أخذت عينة عشوائية حجمها $n = 25$ ، ومتوسطها الحسابي $\bar{x} = 8$ ، فإذا علمت أن التباين للمجتمع $\sigma^2 = 1,25$ ، باستخدام مستوى ثقة 95%
- (أ) أوجد هامش الخطأ.
- (ب) أوجد فترة الثقة للمتوسط الحسابي للمجتمع الإحصائي μ .
- (ج) فسر فترة الثقة.
- (٥) في دراسة للمدة الزمنية المطلوبة من طلاب جامعيين لإنهاء دراستهم، اختبر عشوائيًا 80 طالبًا، فكان متوسط السنوات لهذه العينة $\bar{x} = 4,8$ سنوات ، والانحراف المعياري لهذه العينة $\sigma = 2,2$ ، باستخدام مستوى ثقة 95%
- (أ) أوجد هامش الخطأ.
- (ب) أوجد فترة الثقة للمتوسط الحسابي للمجتمع الإحصائي μ .
- (ج) فسر فترة الثقة.

٨

- (٦) عينة عشوائية حجمها $n = 13$ ، ومتوسطها الحسابي $\bar{x} = 30$ ، وانحرافها المعياري $\sigma = 3,5$ ، باستخدام مستوى ثقة 95%
- (أ) أوجد هامش الخطأ.
- (ب) أوجد فترة الثقة للمتوسط الحسابي للمجتمع الإحصائي μ .

المجموعة ب تمارين تعزيزية

- (١) أخذت عينة عشوائية حجمها $n = 64$ ، فوجد أن متوسط العينة $\bar{x} = 160$ ، والانحراف المعياري للمجتمع $\sigma = 50$ ، باستخدام مستوى ثقة 95%
- (أ) أوجد هامش الخطأ.
- (ب) أوجد فترة الثقة للمتوسط الحسابي للمجتمع الإحصائي μ .
- (ج) فسر فترة الثقة.
- (٢) أخذت عينة عشوائية حجمها $n = 11$ من مجتمع تباينه $\sigma^2 = 44$ ، فوجد أن $\bar{x} = 30,5$ ، عند مستوى ثقة 95% أوجد :
- (أ) هامش الخطأ.
- (ب) فترة الثقة للمتوسط الحسابي للمجتمع الإحصائي μ .
- (٣) أخذت عينة عشوائية حجمها $n = 32$ فإذا كان متوسطها الحسابي $\bar{x} = 14,3$ وانحرافها المعياري $\sigma = 0,8$ ، عند مستوى ثقة 95%
- (أ) أوجد هامش الخطأ.
- (ب) أوجد فترة الثقة للمتوسط الحسابي للمجتمع الإحصائي μ .
- (ج) فسر فترة الثقة.
- (٤) يعتبر الخفاش الطئان من أصغر الثدييات في العالم ويبلغ حجمه تقريبًا حجم نحلة طنانة كبيرة. أخذت عينة عشوائية حجمها $n = 15$ فإذا كان متوسطها الحسابي $\bar{x} = 1,7$ ، والانحراف المعياري $\sigma = 0,2$ ، عند مستوى ثقة 95% أوجد :
- (أ) هامش الخطأ.
- (ب) فترة الثقة للمتوسط الحسابي للمجتمع الإحصائي μ .
- (٥) أثناء التدخين ، يتحوّل النيكوتين إلى كورتينين، وهي مادة من السهل قياسها. إذا كان المتوسط الحسابي لعينة من 40 مدخنًا تعطي مستوى كورتينين قدره $\bar{x} = 172,5$ ، فإذا علمت أن $\sigma = 119,5$ ، عند مستوى ثقة 95%
- (أ) أوجد هامش الخطأ.
- (ب) أوجد فترة الثقة للمتوسط الحسابي للمجتمع الإحصائي μ لمستوى الكورتينين لدى جميع المدخنين.
- (ج) فسر فترة الثقة.

٩

المرشد لحل المسائل

إجابة «مسألة إضافية»

الفروض: $F: \mu = 2000$ مقابل $F: \mu \neq 2000$

$$n = \frac{\bar{x} - \mu}{\frac{s}{\sqrt{n}}} = \frac{1,25 - 2000}{\frac{800}{\sqrt{100}}} = 1,25$$

فترة الثقة: $(-1,96, 1,96)$


$1,25$ تقع على الفترة

إذاً نقبل فرض العدم

$F: \mu = 2000$

إذاً كانت حملة هذه المؤسسة ناجحة.

مخطط تنظيمي للوحدة الأولى



٣٤

المرشد لحل المسائل

نظراً لأهمية المياه بالنسبة إلى صحة الإنسان وحياته، قررت مؤسسة تعنى بذلك، القيام بحملة تهدف إلى التأكد من أن كل شخص يستهلك متوسط قدره ٢٠٠٠ ملل يومياً من مياه الشرب. في دراسة سابقة لعينة من ١٠٠ شخص، لاحظت المؤسسة أن المتوسط الحسابي للاستهلاك: $\bar{x} = 1850$ ملل مع انحراف معياري $s = 900$ ملل. وفي دراسة جديدة لعينة من ١٠٠ شخص، وبعد القيام بحملتها، لاحظت أن المتوسط الحسابي للاستهلاك: $\bar{x} = 1900$ ملل مع انحراف معياري $s = 300$ ملل. اعتقدت المؤسسة أن حملتها قد نجحت بما أن المتوسط الحسابي للاستهلاك قد ازداد ٥٠ ملل وقد اقرب كثيراً من هدفها وهو ٢٠٠٠ ملل يومياً للشخص الواحد. هل المؤسسة على حق؟ اشرح.

الحل:
وضع يوسف جدولاً ليختبر فرضية الشركة من خلال اختبارات إحصائية مع:

$F: \mu = 2000$ مقابل $F: \mu \neq 2000$ ، ومستوى الثقة ٠,٩٥

المعايير	الدراسة السابقة	الدراسة الجديدة
القيمة الجدولية	$\bar{x} = 1850, n = 100, s = 900$	$\bar{x} = 1900, n = 100, s = 300$
قيمة الاختبار الإحصائي	$t = \frac{\bar{x} - \mu}{\frac{s}{\sqrt{n}}} = \frac{1850 - 2000}{\frac{900}{\sqrt{100}}} = -1,66$	$t = \frac{\bar{x} - \mu}{\frac{s}{\sqrt{n}}} = \frac{1900 - 2000}{\frac{300}{\sqrt{100}}} = -3,33$
الفترة	$(-1,96, 1,96)$	$(-1,96, 1,96)$
القرار	قبول $F: \mu = 2000$ ملل يومياً	رفض $F: \mu = 2000$ ملل يومياً

الاستنتاج:

لم تكن الحملة ضرورية، والحصول على قيمة متوسطة أكبر لا يعني الاقتراب من الهدف المنشود.

مسألة إضافية


قامت مؤسسة أخرى بحملة على عينة من ١٠٠ شخص تهدف إلى التأكد من أن المتوسط الحسابي للاستهلاك كل شخص لمياه الشرب $\mu = 2000$ ملل يومياً. فأتت النتائج على الشكل التالي:
 $\bar{x} = 2100$ ملل، $s = 800$ ملل. برأيك، هل كانت حملة هذه المؤسسة ناجحة؟

ملخص

- المعلمة هي ثابت يصف المجتمع أو يصف توزيع المجتمع كالتوسط الحسابي μ أو الانحراف المعياري σ .
- الإحصاءة هو اقتران تتعزّن قيمته من العينة تستخدم لتقدير معلمة مجهولة من معالم المجتمع.
- التقدير بنقطة هي قيمة وحيدة محسوبة من العينة تستخدم لتقدير معلمة مجهولة من معالم المجتمع.
- فترة الثقة هي فترة طرفاها متغيران عشوائيان (أي أنها فترة عشوائية) تحوي إحدى معالم المجتمع بنسبة معينة تسمى درجة الثقة (مستوى الثقة).
- α هي درجة (نسبة) الخطأ في التقدير.
- مستوى الثقة ١٠٠٪ $(1 - \alpha)$ ويسمى $(1 - \alpha)$ معامل مستوى الثقة.
- t_p هي القيمة الحرجة المستخرجة من جدول التوزيع الطبيعي المعياري.
- \bar{x} هو المتوسط الحسابي للعينة.
- s هو الانحراف المعياري للعينة.
- t_p هي القيمة الحرجة المستخرجة من جدول التوزيع ت.
- هامش الخطأ $h = t_p \cdot \frac{s}{\sqrt{n}}$ في حالة الانحراف المعياري σ معلوم والتوزيع الطبيعي.
- هامش الخطأ $h = t_p \cdot \frac{s}{\sqrt{n}}$ في حالة الانحراف المعياري σ غير معلوم و $n > 30$ والتوزيع الطبيعي.
- هامش الخطأ $h = t_p \cdot \frac{s}{\sqrt{n}}$ إذا كانت σ غير معلوم و $n \geq 30$ والتوزيع طبيعي.
- الفرض الإحصائي: هو ادعاء معين ينبغي على حثيثا معقولة حول معلمة من معالم المجتمع مثل المتوسط الحسابي μ أو الانحراف المعياري σ .
- المقياس الإحصائي هو قيمة وحيدة محسوبة من العينة تحت شروط معينة.
- اختبارات الفروض الإحصائية (اختبار المعنوية) هي طريقة معيارية لاختبار ادعاء ما حول معلمة من معالم المجتمع.

٣٥


٣٣



القيمة الحرجة α ت

جدول التوزيع ت

جدول التوزيع ت				
α				
درجات الحرية (ن - 1)				
٠,٠٥	٠,١٠	٠,٠٥	٠,٠٢٥	٠,٠١
١	١,٠٠٠	٣,٠٧٨	٦,٣١٤	١٢,٧٠٦
٢	٠,٨١٦	١,٨٨٦	٢,٩٢٠	٤,٣٠٣
٣	٠,٧٦٥	١,٦٣٨	٢,٣٥٣	٣,١٨٢
٤	٠,٧٤١	١,٥٣٣	٢,١٣٢	٢,٧٧٦
٥	٠,٧٢٧	١,٤٧٦	٢,٠١٥	٢,٥٧١
٦	٠,٧١٨	١,٤٤٠	١,٩٤٣	٢,٤٤٧
٧	٠,٧١١	١,٤١٥	١,٨٩٥	٢,٣٦٥
٨	٠,٧٠٦	١,٣٩٧	١,٨٦٠	٢,٣٠٦
٩	٠,٧٠٣	١,٣٨٣	١,٨٣٣	٢,٢٦٢
١٠	٠,٧٠٠	١,٣٧٢	١,٨١٢	٢,٢٢٨
١١	٠,٦٩٧	١,٣٦٣	١,٧٩٦	٢,٢٠١
١٢	٠,٦٩٦	١,٣٥٦	١,٧٨٢	٢,١٧٩
١٣	٠,٦٩٤	١,٣٥٠	١,٧٧١	٢,١٦٠
١٤	٠,٦٩٢	١,٣٤٥	١,٧٦١	٢,١٤٥
١٥	٠,٦٩١	١,٣٤١	١,٧٥٣	٢,١٣٢
١٦	٠,٦٩٠	١,٣٣٧	١,٧٤٦	٢,١٢٠
١٧	٠,٦٨٩	١,٣٣٣	١,٧٤٠	٢,١٠٧
١٨	٠,٦٨٨	١,٣٣٠	١,٧٣٤	٢,١٠١
١٩	٠,٦٨٨	١,٣٢٨	١,٧٢٩	٢,٠٩٣
٢٠	٠,٦٨٧	١,٣٢٥	١,٧٢٥	٢,٠٨٦
٢١	٠,٦٨٦	١,٣٢٣	١,٧٢١	٢,٠٨٠
٢٢	٠,٦٨٦	١,٣٢١	١,٧١٧	٢,٠٧٤
٢٣	٠,٦٨٥	١,٣٢٠	١,٧١٤	٢,٠٦٩
٢٤	٠,٦٨٥	١,٣١٨	١,٧١١	٢,٠٦٤
٢٥	٠,٦٨٤	١,٣١٦	١,٧٠٨	٢,٠٦٠
٢٦	٠,٦٨٤	١,٣١٥	١,٧٠٦	٢,٠٥٦
٢٧	٠,٦٨٤	١,٣١٤	١,٧٠٢	٢,٠٥٢
٢٨	٠,٦٨٣	١,٣١٣	١,٧٠١	٢,٠٤٨
٢٩	٠,٦٨٣	١,٣١١	١,٦٩٩	٢,٠٤٥
٣٠ وأكثر	٠,٦٨٥	١,٢٨٢	١,٦٤٥	٢,٠٢٧



جدول التوزيع الطبيعي المعياري (ت)

ت	٠,٠٠	٠,٠١	٠,٠٢	٠,٠٣	٠,٠٤	٠,٠٥	٠,٠٦	٠,٠٧	٠,٠٨	٠,٠٩
٠,٠	٠,٠٠٠٠	٠,٠٠٤٠	٠,٠٠٨٠	٠,٠١٢٠	٠,٠١٦٠	٠,٠١٩٩	٠,٠٢٣٨	٠,٠٢٧٩	٠,٠٣١٩	٠,٠٣٥٩
٠,١	٠,٠٣٥٨	٠,٠٤٣٨	٠,٠٥١٧	٠,٠٥٩٧	٠,٠٦٥٧	٠,٠٧١٦	٠,٠٧٧٦	٠,٠٨٣٦	٠,٠٨٩٤	٠,٠٩٥٣
٠,٢	٠,٠٧٩٣	٠,٠٨٣٢	٠,٠٨٧١	٠,٠٩١٠	٠,٠٩٤٨	٠,٠٩٨٧	٠,١٠٢٦	٠,١٠٦٤	٠,١١٠٣	٠,١١٤١
٠,٣	٠,١١٧٩	٠,١٢١٧	٠,١٢٥٥	٠,١٢٩٣	٠,١٣٣١	٠,١٣٦٨	٠,١٤٠٦	٠,١٤٤٣	٠,١٤٨٠	٠,١٥١٧
٠,٤	٠,١٥٥٤	٠,١٥٩١	٠,١٦٢٨	٠,١٦٦٤	٠,١٧٠٠	٠,١٧٣٦	٠,١٧٧٢	٠,١٨٠٨	٠,١٨٤٤	٠,١٨٧٩
٠,٥	٠,١٩١٥	٠,١٩٥٠	٠,١٩٨٥	٠,٢٠١٩	٠,٢٠٥٤	٠,٢٠٨٨	٠,٢١٢٣	٠,٢١٥٧	٠,٢١٩١	٠,٢٢٢٤
٠,٦	٠,٢٢٩٧	٠,٢٣٣٤	٠,٢٣٧١	٠,٢٤٠٧	٠,٢٤٤٢	٠,٢٤٧٧	٠,٢٥١٢	٠,٢٥٤٦	٠,٢٥٨١	٠,٢٦١٥
٠,٧	٠,٢٥٨٠	٠,٢٦١١	٠,٢٦٤٢	٠,٢٦٧٣	٠,٢٧٠٤	٠,٢٧٣٤	٠,٢٧٦٤	٠,٢٧٩٤	٠,٢٨٢٤	٠,٢٨٥٤
٠,٨	٠,٢٨١١	٠,٢٨٤١	٠,٢٨٧١	٠,٢٩٠١	٠,٢٩٣١	٠,٢٩٦١	٠,٢٩٩١	٠,٣٠٢١	٠,٣٠٥١	٠,٣٠٨١
٠,٩	٠,٣١٥٩	٠,٣١٨٦	٠,٣٢١٢	٠,٣٢٣٨	٠,٣٢٦٤	٠,٣٢٩٠	٠,٣٣١٥	٠,٣٣٤٠	٠,٣٣٦٥	٠,٣٣٩٠
١,٠	٠,٣٤٣٣	٠,٣٤٦١	٠,٣٤٨٧	٠,٣٥١٤	٠,٣٥٤٠	٠,٣٥٦٦	٠,٣٥٩٢	٠,٣٦١٨	٠,٣٦٤٤	٠,٣٦٦٩
١,١	٠,٣٧٢٧	٠,٣٧٥٥	٠,٣٧٨٣	٠,٣٨١١	٠,٣٨٣٩	٠,٣٨٦٦	٠,٣٨٩٤	٠,٣٩٢١	٠,٣٩٤٩	٠,٣٩٧٦
١,٢	٠,٣٨٤٩	٠,٣٨٧٦	٠,٣٩٠٣	٠,٣٩٣٠	٠,٣٩٥٧	٠,٣٩٨٤	٠,٣٩٩١	٠,٣٩٩٨	٠,٣٩٩٩	٠,٣٩٩٩
١,٣	٠,٤٠٤٩	٠,٤٠٧٦	٠,٤١٠٣	٠,٤١٣٠	٠,٤١٥٧	٠,٤١٨٤	٠,٤٢١١	٠,٤٢٣٨	٠,٤٢٦٥	٠,٤٢٩٢
١,٤	٠,٤٢٩٢	٠,٤٣١٩	٠,٤٣٤٦	٠,٤٣٧٣	٠,٤٣٩٩	٠,٤٤٢٦	٠,٤٤٥٣	٠,٤٤٨٠	٠,٤٥٠٦	٠,٤٥٣٣
١,٥	٠,٤٥٣٣	٠,٤٥٦٠	٠,٤٥٨٧	٠,٤٦١٤	٠,٤٦٤١	٠,٤٦٦٨	٠,٤٦٩٥	٠,٤٧٢٢	٠,٤٧٤٩	٠,٤٧٧٦
١,٦	٠,٤٧٧٦	٠,٤٨٠٣	٠,٤٨٣٠	٠,٤٨٥٧	٠,٤٨٨٤	٠,٤٩١١	٠,٤٩٣٨	٠,٤٩٦٥	٠,٤٩٩٢	٠,٥٠١٩
١,٧	٠,٥٠١٩	٠,٥٠٤٦	٠,٥٠٧٣	٠,٥١٠٠	٠,٥١٢٧	٠,٥١٥٤	٠,٥١٨١	٠,٥٢٠٨	٠,٥٢٣٥	٠,٥٢٦٢
١,٨	٠,٥٢٦٢	٠,٥٢٨٩	٠,٥٣١٦	٠,٥٣٤٣	٠,٥٣٧٠	٠,٥٣٩٧	٠,٥٤٢٤	٠,٥٤٥١	٠,٥٤٧٨	٠,٥٥٠٥
١,٩	٠,٥٥٠٥	٠,٥٥٣٢	٠,٥٥٥٩	٠,٥٥٨٦	٠,٥٦١٣	٠,٥٦٤٠	٠,٥٦٦٧	٠,٥٦٩٤	٠,٥٧٢١	٠,٥٧٤٨
٢,٠	٠,٥٧٧٦	٠,٥٨٠٣	٠,٥٨٣٠	٠,٥٨٥٧	٠,٥٨٨٤	٠,٥٩١١	٠,٥٩٣٨	٠,٥٩٦٥	٠,٥٩٩٢	٠,٦٠١٩
٢,١	٠,٥٨٦١	٠,٥٨٨٨	٠,٥٩١٥	٠,٥٩٤٢	٠,٥٩٦٩	٠,٥٩٩٦	٠,٦٠٢٣	٠,٦٠٥٠	٠,٦٠٧٧	٠,٦١٠٤
٢,٢	٠,٥٩٣٣	٠,٥٩٦٠	٠,٥٩٨٧	٠,٦٠١٤	٠,٦٠٤١	٠,٦٠٦٨	٠,٦٠٩٥	٠,٦١٢٢	٠,٦١٤٩	٠,٦١٧٦
٢,٣	٠,٦٠١٩	٠,٦٠٤٦	٠,٦٠٧٣	٠,٦١٠٠	٠,٦١٢٧	٠,٦١٥٤	٠,٦١٨١	٠,٦٢٠٨	٠,٦٢٣٥	٠,٦٢٦٢
٢,٤	٠,٦٢٦٢	٠,٦٢٨٩	٠,٦٣١٦	٠,٦٣٤٣	٠,٦٣٧٠	٠,٦٣٩٧	٠,٦٤٢٤	٠,٦٤٥١	٠,٦٤٧٨	٠,٦٥٠٥
٢,٥	٠,٦٥٠٥	٠,٦٥٣٢	٠,٦٥٥٩	٠,٦٥٨٦	٠,٦٦١٣	٠,٦٦٤٠	٠,٦٦٦٧	٠,٦٦٩٤	٠,٦٧٢١	٠,٦٧٤٨
٢,٦	٠,٦٧٧٦	٠,٦٨٠٣	٠,٦٨٣٠	٠,٦٨٥٧	٠,٦٨٨٤	٠,٦٩١١	٠,٦٩٣٨	٠,٦٩٦٥	٠,٦٩٩٢	٠,٧٠١٩
٢,٧	٠,٧٠١٩	٠,٧٠٤٦	٠,٧٠٧٣	٠,٧١٠٠	٠,٧١٢٧	٠,٧١٥٤	٠,٧١٨١	٠,٧٢٠٨	٠,٧٢٣٥	٠,٧٢٦٢
٢,٨	٠,٧٢٦٢	٠,٧٢٨٩	٠,٧٣١٦	٠,٧٣٤٣	٠,٧٣٧٠	٠,٧٣٩٧	٠,٧٤٢٤	٠,٧٤٥١	٠,٧٤٧٨	٠,٧٥٠٥
٢,٩	٠,٧٥٠٥	٠,٧٥٣٢	٠,٧٥٥٩	٠,٧٥٨٦	٠,٧٦١٣	٠,٧٦٤٠	٠,٧٦٦٧	٠,٧٦٩٤	٠,٧٧٢١	٠,٧٧٤٨
٣,٠	٠,٧٧٤٨	٠,٧٧٧٦	٠,٧٨٠٣	٠,٧٨٣٠	٠,٧٨٥٧	٠,٧٨٨٤	٠,٧٩١١	٠,٧٩٣٨	٠,٧٩٦٥	٠,٧٩٩٢

ملاحظة: استخدم ٠,٤٩٩٩ عندما تزيد قيمة ت عن ٣,٠٩

تمرن

٢-١

اختبارات الفروض الإحصائية

Hypotheses Testing

المجموعة ١ تمارين أساسية

- أخذت عينة عشوائية من مجتمع قيد الدراسة حجمها $n = 100$ ، فوجد أن المتوسط الحسابي للعينة $\bar{x} = 30,3$ ، انحرافها المعياري $\sigma = 6,5$.
اختبر الفرض إذا كان المتوسط الحسابي للمجتمع هو $\mu = 30$ ، مقابل الفرض البديل $\mu \neq 30$ عند مستوى ثقة 95%.
- في دراسة لعدد ساعات استخدام الحاسوب، أخذت عينة من 1000 شخص يعملون في مختلف المجالات، فوجد أن المتوسط الحسابي لعدد ساعات استخدام الحاسوب هو $\bar{x} = 4,5$ ساعة، والانحراف المعياري $\sigma = 1$ ساعة.
اختبر الفرض إذا كان متوسط عدد الساعات للمجتمع $\mu = 5$ ، مقابل الفرض البديل $\mu \neq 5$ عند مستوى المعنوية $\alpha = 0,05$.
- يزعم مسؤول في متجر لبيع الأدوات الكهربائية، أن متوسط الأسعار هو 300 دينار. أخذت عينة من 20 فوجد أن المتوسط الحسابي $\bar{x} = 280$ ديناراً والانحراف المعياري $\sigma = 32,2$ ديناراً. اختبر فرضية المسؤول عند مستوى المعنوية $\alpha = 0,05$.
- في مجتمع إحصائي إذا كانت $\sigma = 40$ ، $\gamma = \sigma$ ، وحجم المجتمع $n = 50$ ، اختبر الفرض $\mu = 35$ مقابل الفرض البديل $\mu \neq 35$ عند مستوى المعنوية $\alpha = 0,05$.
- المتوسط الحسابي للراتب السنوي لموظف حكومي في دولة الكويت هو 9600 دينار، أما المتوسط الحسابي لعينة من 64 موظفًا حكوميًا في إحدى الدول الخليجية $\bar{x} = 9420$ ديناراً بانحراف معياري $\sigma = 640$ ديناراً. اختبر إذا كان بالإمكان اعتبار الراتب السنوي للموظف الحكومي في هذه الدولة الخليجية هو الراتب ذاته الذي يحصل عليه الموظف الحكومي في الكويت، مستخدمًا مستوى الثقة 95%.
- يزعم معلم مادة الرياضيات أن المتوسط الحسابي لدرجات الطلاب في مادته هو 16 درجة حيث النهاية العظمى 20 درجة. إذا أخذت عينة من 10 طلاب فوجد أن المتوسط الحسابي $\bar{x} = 15$ درجة، والانحراف المعياري $\sigma = 1,4$ درجة، فاختر فرضية المعلم عند مستوى المعنوية $\alpha = 0,05$.

المجموعة ب تمارين تعزيرية

- (١) تملك شركة عالمية فروعاً لها في عدة بلدان كبيرة. هدفها هو ربح صاف متوسطه الحسابي $\mu = 200.000$ دينار لكل فرع. عند دراسة عينة من 100 فرع، كان المتوسط الحسابي $\bar{x} = 195.000$ دينار وانحرافها المعياري $\sigma = 8.000$ دينار.
تأكد من خلال الاختبار ما إذا كانت الشركة تحقق هدفها عند مستوى المعنوية $\alpha = 0,05$.
- (٢) مجتمع إحصائي قيد الدراسة، حجمه $n = 200$ ، ومتوسطه الحسابي $\bar{x} = 3,3$ ، فإذا كان الانحراف المعياري $\sigma = 0,7$.
اختر الفرض H_0 مقابل الفرض البديل $H_1 \neq 3,5$ مع مستوى المعنوية $\alpha = 0,05$.
- (٣) (أ) إذا كانت قيمة $\bar{x} = 11$ ، $\sigma = 3,1$ ، $n = 10$ ، فاختبر الفرض $H_0: \mu = 12$ مقابل الفرض البديل $H_1: \mu \neq 12$ عند مستوى المعنوية $\alpha = 0,05$.
(ب) كزّر الاختبار نفسه أخذاً $n = 25$ ، $\bar{x} = 12$ عند مستوى المعنوية $\alpha = 0,05$.
- (٤) افترض أحد خبراء التغذية أن المتوسط الحسابي لاستهلاك الشخص الواحد للحم هو ٤٢,١ كجم سنوياً في دول منطقة الخليج العربي. وقد أعطت عينة من ٨٠ شخصاً من منطقة الخليج العربي أن المتوسط الحسابي لاستهلاك اللحم السنوي للشخص الواحد هو $\bar{x} = 45,2$ كجم مع انحراف معياري $\sigma = 12$ كجم. هل فرارك سيكون رفضاً أم عدم رفض لما افترضه خبير التغذية عند استخدامك مستوى المعنوية $\alpha = 0,05$ لإجراء اختبار الفرضية الإحصائية؟

(٣) المعلومة هي ثابت يصف العينة أو يصف توزيع العينة كالوسط الحسابي

Ⓐ ①

(٤) التقدير بنقطة هي قيمة وحيدة محسوبة من العينة تستخدم لتقدير معلمة من معالم المجتمع المجهولة.

Ⓐ ①

(٥) إذا كان توزيع المجتمع طبيعي و σ غير معلومة وكان حجم العينة $n < 30$ فإن المقياس الإحصائي المستخدم لقبول أو رفض فرض العدم للمعلمة μ هو $t = \frac{(\bar{x} - \mu)}{\frac{s}{\sqrt{n}}}$

Ⓐ ①

(٦) $(\alpha - 1)$ هي معامل مستوى الثقة.

Ⓐ ①

(٧) لتعين فترة ثقة للمعلمة μ إذا كان المجتمع يتبع التوزيع الطبيعي وتباينه σ^2 غير معلوم وكان حجم العينة العشوائية $n = 16$ فإن درجة الحرية للتوزيع t تساوي 15

Ⓐ ①

(٨) إذا كانت فترة الثقة للمتوسط الحسابي للمجتمع (μ) هي: $37,8 \leq \mu \leq 38,956$ فإن $\bar{x} = 37,8$

Ⓐ ①

(٩) إذا كانت درجات الحرية هي 30 فإن حجم العينة هو 29

Ⓐ ①

(١٠) الإحصاء هو اقران تعين قيمته من العينة كالتوسط الحسابي

Ⓐ ①

س أو الانحراف المعياري σ .

Ⓐ ①

الاختبار من متعدد

في البود (١١-٣٠) لكل بند 4 اختيارات واحد فقط منها صحيح. ظلل دائرة الرمز الدال على الاختيار الصحيح.

استخدم المعطيات التالية للإجابة عن البود (١١-١٣).

أخذت عينة من مجتمع طبيعي حجمها $n = 49$ ومتوسطها الحسابي $\bar{x} = 30$ وانحرافها المعياري $\sigma = 14$ باستخدام مستوى ثقة 95% فإن:

(١١) القيمة الحرجة $t_{\alpha/2}$ تساوي:

Ⓐ 1,69 Ⓑ 1,96

Ⓒ ليس أي مما سبق Ⓓ 1,66

(١٢) هامش الخطأ يساوي:

Ⓐ 1,96 Ⓑ 3,92

Ⓒ ليس أي مما سبق Ⓓ 1,69

(١٣) فترة الثقة للمتوسط الحسابي هي:

Ⓐ (٣٣,٩٢ ، ٢٦,٠٨) Ⓑ (٣٣,٢٦ ، ٢٦)

Ⓒ (٣١,٩٦ ، ٢٨,٠٤) Ⓓ ليس أي مما سبق

اختبار الوحدة الأولى

أسئلة المقال

- (١) عينة عشوائية حجمها $n = 25$ ، أخذت من مجتمع إحصائي حيث تباينه $\sigma^2 = 16$ علماً أن المتوسط الحسابي للعينة $\bar{x} = 8$
أوجد فترة الثقة عند مستوى ثقة 95% للمعلمة المجهولة μ .
- (٢) أخذت عينة عشوائية حجمها $n = 100$ فإذا كان $\bar{x} = 7,5$ وانحرافها المعياري $\sigma = 1,1$ أوجد فترة الثقة عند درجة ثقة 95% للمعلمة μ .
- (٣) أخذت عينة عشوائية حجمها $n = 160$ شخصاً إذا كان تباين المجتمع هو $\sigma^2 = 4$ ، والمتوسط الحسابي $\bar{x} = 9,3$ ، فأوجد فترة الثقة عند درجة ثقة 95% للمعلمة μ .
- (٤) يريد رجل افتتاح متجر خاص به في الوسط التجاري، فإذا تم أخذ عينة من المتاجر عددها 50 متجرًا، وكان المتوسط الحسابي لربح هذه المتاجر $\bar{x} = 95.000$ دينار وإذا علمت أن التباين $\sigma^2 = 10.000$ اختبر الفرض $H_0: \mu = 100.000$ مقابل الفرض البديل $H_1: \mu \neq 100.000$ مع مستوى المعنوية $\alpha = 0,05$.
- (٥) يساعد بنك الدم بفروعه المختلفة المستشفيات على تأمين كمية الدم المطلوبة للمرضى. فإذا أخذت عينة $n = 10$ فروع، وكان المتوسط الحسابي لكمية الدم هي $\bar{x} = 20$ ليترًا مع انحراف معياري $\sigma = 4$ اختبر الفرض $H_0: \mu = 22$ مقابل الفرض البديل $H_1: \mu \neq 22$ مع مستوى المعنوية $\alpha = 0,05$.
- (٦) أخذت عينة عشوائية من مجتمع قيد الدراسة حجمها $n = 35$ ، فإذا كان المتوسط الحسابي $\bar{x} = 47$ وتباين المجتمع $\sigma^2 = 9$ اختبر الفرض $H_0: \mu = 50$ مقابل الفرض البديل $H_1: \mu \neq 50$ عند مستوى المعنوية $\alpha = 0,05$.
- (٧) (أ) في عينة عشوائية، إذا كان $\bar{x} = 40$ ، $\sigma = 3$ ، $n = 35$ ، فاختبر الفرض $H_0: \mu = 42$ مقابل الفرض البديل $H_1: \mu \neq 42$ عند مستوى المعنوية $\alpha = 0,05$.
(ب) كزّر الاختبار نفسه أخذاً $n = 25$

الصح والخطأ

في البود (١٠-١١) عبارات ظلل (أ) إذا كانت العبارة صحيحة و(ب) إذا كانت خاطئة.

- (١) إذا سحبت عينة عشوائية حجمها $n = 9$ من مجتمع طبيعي متباينة $\sigma^2 = 9$ وكان $\bar{x} = 7,96$ فإن فترة الثقة للمعلمة μ بمستوى ثقة 95% (٦، ٩,٩٢) Ⓐ ①
Ⓑ ①
- (٢) إذا كانت μ تقع في الفترة (٢٤,٣٥٩ ، ٢٥,٦٤١) فإن $\mu = 30$ Ⓐ ①
Ⓑ ①

استخدم المعطيات التالية للإجابة عن البود (١٤-١٦).

أخذت عينة من مجتمع طبيعي حيث $n = 25$ ، $\bar{x} = 50$ ، $\sigma = 15$ ، بمستوى ثقة 95% فإن:

(١٤) القيمة الحرجة هي:

Ⓐ $t_{\alpha/2} = 1,96$ Ⓑ $t_{\alpha/2} = 2,064$

Ⓒ $t_{\alpha/2} = 1,96$ Ⓓ $t_{\alpha/2} = 2,064$

(١٥) هامش الخطأ يساوي:

Ⓐ 2,064 Ⓑ 2,128

Ⓒ 6,192 Ⓓ 5,88

(١٦) فترة الثقة للمتوسط الحسابي للمجتمع (μ) هي:

Ⓐ (٥٢,٠٦٤ ، ٤٧,٩٣٢) Ⓑ (٥٦,١٩٢ ، ٤٣,٨٠٨)

Ⓒ (٥٦,١٢٨ ، ٤٥,٨٧٢) Ⓓ ليس أي مما سبق

(١٧) أخذت عينة من مجتمع طبيعي حجمها $n = 36$ فإذا علم أن $\bar{x} = 10$ ، $\sigma = 2$ فإن عند مستوى ثقة 90% تكون القيمة الحرجة هي:

Ⓐ 1,65 Ⓑ 1,64

Ⓒ 2,746 Ⓓ 1,65

استخدم المعطيات التالية للإجابة عن البود (١٨-١٩).

أخذت عينة من مجتمع طبيعي حجمها $n = 100$ ومتوسطها الحسابي $\bar{x} = 40$ وانحرافها المعياري $\sigma = 10$ باستخدام جدول التوزيع الطبيعي عند مستوى ثقة 97% تكون:

(١٨) القيمة الحرجة $t_{\alpha/2}$ هي:

Ⓐ 2,16 Ⓑ 2,18

Ⓒ 2,17 Ⓓ ليس أي مما سبق

(١٩) هامش الخطأ يساوي:

Ⓐ 2,17 Ⓑ 2,16

Ⓒ 4,34 Ⓓ 6,01

(٢٠) القيمة الحرجة $t_{\alpha/2}$ المناظرة لمستوى ثقة 99% تساوي:

Ⓐ 2,٥٨ Ⓑ ٢,٥٧

Ⓒ ٢,٥٧٥ Ⓓ ٢,٥

تمارين إحصائية

- (١) أخذت عينة عشوائية من مجتمع إحصائي حجمها $n = 130$ ، وكان المتوسط الحسابي $\bar{x} = 28$ ، إذا كان تباين المجتمع $\sigma^2 = 9$ ، فأوجد فترة الثقة عند مستوى الثقة 95% للمعلمة المجهولة μ .
- (٢) ينتظر زبائن شركة التأمين على السيارات مدة طويلة قبل التمكن من التواصل مع مندوب خدمة الزبائن حين يتصلون ليتقدموا بشكاوى مختلفة. تعطي عينة عشوائية من 25 اتصالاً مماثلاً متوسطاً حسابياً $\bar{x} = 22$ دقيقة وانحرافاً معيارياً من 6 دقائق.
- أوجد فترة الثقة عند مستوى ثقة 95% للمتوسط الحسابي الإحصائي μ لأوقات الانتظار.
- (٣) تم بيع عينة من 1500 منزل مؤخرًا حيث إن المتوسط الحسابي لسعر المنزل الواحد 30000 دينار. الانحراف المعياري σ معلوم وهو 7000 دينار. اختبر الفرض القائل إن متوسط الأسعار 29000 مع مستوى معنوية $\alpha = 0.05$.
- (٤) تزعم وزارة التربية أن متوسط سنوات الخبرة للمعلمين في كل المدارس هو 10 سنوات. تأكد من هذا الفرض عند مستوى معنوية $\alpha = 0.05$ ، علمًا بأن العينة من 40 معلمًا وكان متوسطها الحسابي $\bar{x} = 9$ سنوات والانحراف المعياري $\sigma = 4$.
- (٥) (أ) إذا كانت قيمة $\bar{x} = 143$ ، $\sigma = 10$ ، $n = 40$ ، فأختبر الفرض $\mu = 150$ مقابل الفرض البديل $\mu \neq 150$ عند مستوى معنوية $\alpha = 5\%$.
- (ب) اختبر الفرض نفسه مع عينة حجمها $n = 8$ ، عند مستوى المعنوية $\alpha = 0.05$.
- (٦) إذا كانت الدرجة العظمى في اختبار مادة الرياضيات هي 20 درجة، فأوجد فترة ثقة عند مستوى ثقة 95% للمتوسط الحسابي μ ، بناءً على نتائج عينة من 36 طالبًا خضعوا للاختبار حيث المتوسط الحسابي للعينة هو $\bar{x} = 11.6$ وانحراف معياري $\sigma = 2.5$.
- (٧) في مجتمع الزائرين لمجمع تجاري كبير إذا كان الانحراف المعياري $\sigma = 20$ دينارًا مما ينفقه كل زائر على مشترياته في الزيارة الواحدة. أوجد حجم العينة n اللازم أخذها من مجتمع الزائرين للمجمع التجاري عند مستوى ثقة 95% بحيث يكون هامش الخطأ $= 3.92$ دينار.
- (٨) يزعم مزارب فريق كرة سلة أن المتوسط الحسابي لنقاط لاعبيه هو 15 نقطة في المباراة الواحدة. إذا كان الفريق مؤلفًا من 5 لاعبين أساسيين و 10 بدلاء، والنتائج عند 5 لاعبين منهم قد أعطت القيم التالية: المتوسط الحسابي $\bar{x} = 9$ والانحراف المعياري $\sigma = 11$ ، فأختبر فرضية المذبذب عند مستوى المعنوية $\alpha = 5\%$
- (٩) لدى مزارع أرض واسعة مزروعة بمختلف أنواع الأشجار. يقول هذا المزارع إن المتوسط الحسابي لعدد الأشجار في كل 10 أمتار مربعة هو $\mu = 4$ أشجار. أخذت عينة من 10 قطع أرض، كل واحدة مساحتها 10 أمتار مربعة، فأعطت متوسطاً حسابياً $\bar{x} = 3.5$ أشجار وانحرافاً معيارياً $\sigma = 1.2$ ، تأكد من صحة كلام المزارع مع مستوى المعنوية $\alpha = 5\%$.

(٢١) القيمة الحرجة $t_{\alpha/2}$ المناظرة لمستوى ثقة 94% تساوي:

- (أ) 1.885 (ب) 1.88
(ج) 1.890 (د) 3.29

(٢٢) إذا كانت فترة الثقة عند مستوى ثقة 95% لعينة أخذت من مجتمع يتبع التوزيع الطبيعي هي $(17.8, 3.2)$ فإن \bar{x} :

- (أ) 21 (ب) 10.5
(ج) 1.96 (د) 0.475

(٢٣) إذا كانت فترة الثقة عند مستوى ثقة 95% لعينة عشوائية أخذت من مجتمع طبيعي هي $(38, 12)$ فإن التقدير بنقطة لمعلمة المجتمع المجهولة μ يساوي:

- (أ) 12 (ب) 38
(ج) 25 (د) 50

(٢٤) أخذت عينة حجمها $n = 9$ ، $\bar{x} = 30$ من مجتمع طبيعي تباينه $\sigma^2 = 9$ فإن الحد الأدنى لفترة الثقة عند مستوى ثقة 95% هو:

- (أ) 30 (ب) $30 - 1.96 \times 2$
(ج) $30 + 1.96$ (د) $30 - 1.96$

(٢٥) أخذت عينة عشوائية من مجتمع إحصائي حجمها $n = 30$ ، وتباين المجتمع $\sigma^2 = 9$ فإذا كان الحد الأعلى لفترة الثقة عند مستوى ثقة 95% يساوي 31.96 فإن n :

- (أ) 16 (ب) 9
(ج) 30 (د) 150

(٢٦) من جدول التوزيع الطبيعي المعياري $N(0, 1)$:

- (أ) 2.3 (ب) 2.32
(ج) 2.31 (د) 2.33

استخدم المعطيات التالية للإجابة عن البندين (٢٧-٢٨).

إذا كانت $n = 16$ ، $\bar{x} = 35$ ، $\sigma = 8$ عند اختبار الفرض بأن $\mu = 30$ عند مستوى معنوية $\alpha = 0.05$ فإن المقياس الإحصائي هو:

- (أ) $t = 2.5$ (ب) $t = 2.5 - 0$
(ج) $t = 2.5$ (د) $t = 2.5 - 0$

(٢٨) منطقة القبول هي:

- (أ) $(1.96, 1.96)$ (ب) $(2.5, 2.5)$
(ج) $(2.132, 2.132)$ (د) ليس أي مما سبق

استخدم المعطيات التالية للإجابة عن البندين (٢٩-٣٠).

إذا كانت $n = 16$ ، $\bar{x} = 70$ ، $\sigma = 5$ عند اختبار الفرض بأن $\mu = 72$ عند مستوى معنوية $\alpha = 0.05$ فإن المقياس الإحصائي هو:

- (أ) $t = 1.6$ (ب) $t = 1.6$
(ج) $t = 1.6$ (د) $t = 1.6$

(٣٠) منطقة القبول هي:

- (أ) $(1.96, 1.96)$ (ب) $(2.132, 2.132)$
(ج) $(2.120, 2.120)$ (د) $(1.703, 1.703)$

الوحدة الثانية: الارتباط والانحدار

(١-٢): الارتباط

(٢-١-٢) المخطط الانتشاري

(٢-١-٢) ب) مُعامل الارتباط الخطي.

(٢-٢): الانحدار

مقدمة الوحدة

الوحدة الثانية

الارتباط والانحدار

Correlation and Regression

مشروع الوحدة: ضغط الدم

1 مقدمة المشروع: يعتبر ضغط الدم عند الإنسان من أهم العوامل المؤثرة في حياة كل شخص. إن قياس ضغط الدم لجهة ارتفاعه أو انخفاضه عن معدله العام يساعد على المعالجة المبكرة وبالتالي التخفيف قدر الإمكان من حدوث التغيرات القلبية المفاجئة. علماً أن وزارة الصحة في دولة الكويت قد نهت إلى عوارض ارتفاع ضغط الدم وخصوصاً لدى المسنين وأصحاب السمنة.

2 الهدف: دراسة العلاقة بين وزن عدد من الأفراد (بالكيلوجرام) ومعدل ضغط الدم لديهم وذلك بتنفيذ ما يلي:

1 زيارة إحدى العيادات الطبية لتكوين جدول يبين وزن عدد من الأشخاص (ذكور) ومعدل ضغط الدم المقابل لكل وزن.

2 زيارة إحدى المستشفيات لتكوين جدول يبين وزن عدد من الأشخاص (إناث) ومعدل ضغط الدم المقابل لكل وزن.

3 اللوازم: آلة حاسبة - ورق رسم بياني.

4 أسئلة حول التطبيق:

1 كم عدد الأشخاص في العينة التي سوف تختارها في العيادة أو في المستشفى؟ احرص على أن يكون العدد نفسه في الحالتين.

2 مثل على ورق رسم بياني مخطط انتشار لنتائج جدول العيادة وعلى ورق رسم بياني آخر مخطط انتشار لنتائج جدول المستشفى.

3 هل يوجد لكل مخطط انتشار علاقة تصاعدية أو تنازلية بين الوزن ومعدل ضغط الدم؟ اشرح.

4 من كل جدول لتأخذ (عدد الأشخاص)، س (الوزن)، ص (معدل ضغط الدم).

أوجد: س، كس، ص، كص، س، ص، كس، كص، كص، كص.

5 لكل جدول استنتج قيمة ما يلي: $\frac{ن كص - كص كص}{ن كص - كص كص}$

6 ماذا تلاحظ لكل قيمة وجدتها؟ اشرح.

7 التقرير: اكتب تقريراً مفضلاً يوضح النتائج التي توصلت إليها عارضاً اقتراحاتك وتصانحك عن علاقة الوزن بمعدل ضغط الدم. هل ترى أي ترابط بين كل مخطط انتشار والقيمة المقابلة التي وجدتها؟

دروس الوحدة

1-2 الارتباط	2-12 الانحدار
2-1-2) المخطط الانتشاري	
2-1-2) معامل الارتباط الخطي	

38

في هذه الوحدة سوف نحدد العلاقات التي تربط بين المتغيرات، على سبيل المثال:

- كيف تعتمد مبيعات منتج ما على السعر الذي يدفعه المستهلك؟
- كيف يمكن لمادة ما أن تتأثر بدرجات الحرارة المعرضة لها؟
- إلى أي مدى تتضرر المعادن من جراء التلوث؟
- ما مدى قوة العلاقة بين التضخم ومعدلات التوظيف؟
- كيف يمكننا توقع المحاصيل الزراعية من خلال كمية الأسمدة المستخدمة؟

وبالتالي، نجد نوعين من المسائل التي سوف نعالجها في هذه الوحدة:

- الارتباط حيث المسائل تتضمن قياس قوة العلاقة.
- الانحدار حيث المسائل تعنى بشكل العلاقة وطبيعتها.

مشروع الوحدة

شجّع الطلاب للقيام بدراسة عن عوارض ضغط الدم عند المسنين وأصحاب السمنة المرتفعة. اطلب إليهم قبل البدء بالمشروع الاجتماع مع معلم علم الأحياء لمناقشة وإستيضاح نقاط تتعلق بضغط الدم.

إجابات «أسئلة حول التطبيق»

تنوع الإجابات وذلك بحسب حجم العينة التي سيختارها الطلاب.

التقرير

يجب أن يتضمن التقرير تفاصيل واضحة عن أوزان الأشخاص ومعدلات ضغط الدم لكل واحد والحسابات المتعلقة بالقوانين الموضوعية ومخططات الانتشار مع الإقتراحات والنصائح.

الوحدة الثانية

أضف إلى معلوماتك

يعتقد بعض الناس أنه بإمكانهم توقع طول العمر ومعرفته بالنظر إلى طول خط الحياة في كف يدهم. لكن إحدى الدراسات الطويلة أثبتت أنه لا وجود لرابط أو علاقة بين طول خط الحياة في كف الإنسان وطول عمره، وأن ما اعتقده وما زال يعتقد البعض عار عن الصحة.

أين أنت الآن (المعارف السابقة المكتسبة)

- التقدير بنقطة.
- التقدير بفترة ثقة.
- الفروض الإحصائية.
- الاختبارات الإحصائية.

ماذا سوف تتعلم؟

- الارتباط.
- مخطط الانتشار.
- مُعامل الارتباط (بيرسون).
- تحلل مُعامل الارتباط.
- الانحدار ومعادلتها.
- توقع قيمة أحد المتغيرين.

المصطلحات الأساسية

الارتباط - مخطط الانتشار - مُعامل ارتباط بيرسون - ارتباط طردي (موجب) تام - ارتباط عكسي (سالب) تام - ارتباط منعدم - ارتباط طردي (موجب) قوي - ارتباط طردي (موجب) متوسط - ارتباط طردي (موجب) ضعيف - ارتباط عكسي (سالب) ضعيف - ارتباط عكسي (سالب) متوسط - ارتباط عكسي (سالب) قوي - الانحدار - معادلة خط الانحدار.

سَلْمُ التَّقْيِيمِ

٤	مخططات الانتشار واضحة وسليمة بالكامل الحسابات دقيقة - التقرير مفصل وموضوعي.
٣	مخططات الانتشار بمعظمها واضحة قليل من الأخطاء في الحسابات - معظم التقرير مفصل ومعبر.
٢	معظم مخططات الانتشار غير سليمة أخطاء كثيرة في الحسابات - التقرير غير مفصل وبحاجة إلى إعادة صياغة.
١	معظم عناصر المشروع ناقصة ويجب إعادةتها.

٢-١: الارتباط

١ الأهداف

- يعرف الارتباط.
- يرسم مخطط الانتشار.
- يوجد مُعامل ارتباط بيرسون.
- يحلل قيمة مُعامل الارتباط.

٢ المفردات والمفاهيم الجديدة

الارتباط - مخطط الانتشار - مُعامل الارتباط - مُعامل ارتباط بيرسون - نزعات الاتجاه.

٣ الأدوات والوسائل

آلة حاسبة - حاسوب - جهاز إسقاط (Data Show).

٤ التمهيد

اطلب إلى الطلاب الإجابة عن الأسئلة التالية:

ارسم مخطط الانتشار الذي يوضح البيانات التالية:

س	٣	٤	٥	٦	٧	٨
ص	١,١	١,٥	٢	٢,٢	٢,٣	٢,٨

س	١٥	١٤	١٥	١٣	١٤	١٥
ص	١	٦	٤	٢	٣	٥

ماذا تلاحظ في العلاقة بين س، ص على كل مخطط انتشار؟

الارتباط

Correlation

دعنا نفكر ونتناقش

هل تساوت يوماً: كيف تحسب العلاقة بين الطول والوزن؟
ما الذي يربط بين التدخين والإصابة بمرض السرطان؟
كيف نجد رابطاً بين وزن سيارة واستهلاكها للوقود؟
كيف يتغير سعر الذهب مع تغير قيمة الدولار الأمريكي؟
وما هي أفضل وسيلة للتقدير لتقرب من الحقيقة؟

سوف نتعلم

- مفهوم الارتباط.
- رسم مخطط الانتشار.
- إيجاد مُعامل ارتباط بيرسون.
- تحليل قيمة مُعامل الارتباط.
- توقع قيمة أحد المتغيرين.

Correlation

الارتباط

من دراستنا السابقة تم عرض بعض المقاييس الإحصائية، مثل: مقاييس النزعة المركزية (المتوسط الحسابي - الوسيط - المنوال) ومقاييس التشتت (المدى - التباين - الانحراف المعياري). نلاحظ أن هذه المقاييس كانت تصف شكل البيانات التي تم جمعها من ظاهرة إحصائية واحدة أي من متغير واحد والذي يمكن الحصول عليه من العينة. بينما يقابلنا في حياتنا العملية مواقف كثيرة تتضمن متغيرين (ظاهرتين) أو أكثر ويكون تساؤلنا: هل هناك علاقة بين هذه المتغيرات؟ وما هو شكل هذه العلاقة؟ وأيضاً كيف يمكن التنبؤ بقيمة أحد هذين المتغيرين إذا علم قيمة المتغير الآخر؟ وكثيراً ما يرى الباحثون ضرورة دراسة العلاقة بين متغيرين (ظاهرتين) كما يتضح من الأمثلة التالية:

- الطول والوزن.
- التدخين والإصابة بمرض السرطان.
- وزن سيارة واستهلاكها للوقود.
- الإنفاق والدخل.
- سعر السلعة والكمية المعروضة منها.
- العمر وضغط الدم.
- والأمثلة في هذا المجال كثيرة ومتعددة، ولدراسة العلاقة بين هذه الظواهر ندرس ما يسمى الارتباط.

تعريف: الارتباط

هو العلاقة بين متغيرين.

٤٠

تمنؤن

١-٢

الارتباط

Correlation

المجموعة ١ تمارين أساسية

(١) ارسم مخطط الانتشار الذي يوضح البيانات التالية، ثم حدّد نوع العلاقة.

(س) عدد ساعات العمل في الأسبوع	٢٠	٢٥	٣٠	٣٥	٣٨	٤٢	٤٥
(ص) عدد ساعات مشاهدة التلفاز في اليوم	٤	٤	٢,٥	٣	٣	٢	٠,٥

(٢) أوجد قيمة مُعامل الارتباط r بين المتغيرين مستخدماً الجدول التالي:

العمر (س) بالأشهر	٤	٥	٦	٧	٨
الوزن (ص) بالكيلوجرام	٧,٥	٨	٨,٨	٩,٢	٩,٥

(س) تمثل عمر الطفل بالأشهر، ص وزن الطفل بالكيلوجرام.

(٣) أوجد قيمة مُعامل الارتباط r للبيانات التالية، ثم حدّد نوع وقوة العلاقة بين س، ص.

س	١,٥	٢,٣	٢,٨	٣,٤	٤	٤,٨
ص	٢٠	١٧	١٥	١٧	١١	١٠

(٤) أوجد مُعامل الارتباط r وحدّد نوعه وقوته للمتغيرين س، ص حيث:

س	١	٢	٣	٤	٥
ص	٦٠	٥٥	٤٥	٢٥	١٨

(٥) أوجد مُعامل الارتباط r وحدّد نوعه وقوته للمتغيرين س، ص حيث:

س	٨	١٠	١٢	١٤	١٦
ص	١٧	٣٢	٢٤	١٦	٢٠

(٦) أوجد مُعامل الارتباط r وحدّد نوعه وقوته للمتغيرين س، ص حيث:

س	٢	٤	٦	٨	١٠	١٢	١٤
ص	٩	١٣	١٧	٢١	٢٥	٢٩	٣٣

(٧) أوجد مُعامل الارتباط r وحدّد نوعه وقوته للمتغيرين س، ص حيث:

س	٧	٩	١١	١٣	١٥	١٧
ص	١٢	١٥	٩	١٧	١٥	١٦

٢٠

يجب البدء بتعريف الارتباط على أنه نوع العلاقة بين متغيرين إن وجدت والتوضيح للطلاب أنه لا يجب الاكتفاء بالقول إنه يوجد ارتباط بل يجب قياسه ورؤيته باستخدام قواعد موضحة في هذا الدرس. ذكر الطلاب بأنهم في هذا الدرس سوف يتعلمون فقط الارتباط الخطي.

في الأمثلة (٢)، (٣)

تبيّن مخططات الانتشار المختلفة كيف يكون توزيع البيانات عندما تكون العلاقة خطية، طردية، غير خطية أو غير موجودة.

في الأمثلة من (٤) إلى (٩)

توضّح هذه الأمثلة عملية إيجاد مُعامل ارتباط بين متغيرين من خلال احتساب جميع مكوّنات المُعامل، ومن ثمّ استبدال قيمها في القانون. نبّه الطلاب أنه لا يكفي فقط رسم مخطط الانتشار، بل عليهم قياس مُعامل الارتباط r (مُعامل ارتباط بيرسون) وبأنه يجب الانتباه جيّدًا إلى الفرق بين r^2 و r (س٢).

يجب على المعلم أن يفسّر للطلاب قيمة مُعامل الارتباط r ، حيث: $-1 \leq r \leq 1$ ويدعوهم لقراءة خواص مُعامل الارتباط الخطي r في صفحة ٤٥ من كتاب الطالب.

سنرمز للمتغير الأول بالرمز «س»، وهو المتغير الذي يتم تحديده من قبل الباحث القائم بالدراسة ويسمى «المتغير المستقل». ورمز للمتغير الثاني بالرمز «ص»، وهذا المتغير غير مستقل بذاته لأن نتيجته مرتبطة بالمتغير المستقل ولذلك يسمى «المتغير التابع».

Scatter Plot (١-٢) المخطط الانتشاري

تعريف: المخطط الانتشاري هو عبارة عن تمثيل بياني لعدد من الأزواج المرتبة (س، ص) تستخدم لوصف العلاقة بين المتغيرين.


مثال (١)

الجدول التالي يوضح العلاقة بين طول اللاعب (س) ومعدّل المتابعات (ص)، لسبعة لاعبين في مباراة كرة السلة.

طول اللاعب (بالستيمتر) (س)	١٧٠	١٧٥	١٨٠	١٨٥	١٩٠	١٩٥	٢٠٠
معدّل المتابعات (ص)	٣	٤	٥	٥	٧	١٠	١١

المطلوب: ارسم المخطط الانتشاري.

الحل:



حاول أن تفعل

١ ارسم مخطط الانتشار الذي يوضّح البيانات التالية:

س	١٠٠	١١٠	١٢٠	١٣٠	١٤٠	١٦٠	١٧٠	١٨٠	١٩٠
ص	٢٢	٢٠	٢٠	٢٠	٢٠	١٧	١٥	١٦	١٤

أنواع الارتباط

١ ارتباط طردي (موجب):

هو علاقة بين متغيرين س، ص بحيث إذا تغير المتغير المستقل (س) فإن المتغير التابع (ص) يتبعه في نفس الاتجاه.


أي أنه كلما زادت قيمة س تزداد تبعًا لها قيمة ص.

٢ ارتباط عكسي (سالب):

هو علاقة بين متغيرين س، ص بحيث إذا تغير المتغير المستقل (س) فإن المتغير التابع (ص) يتبعه في الاتجاه المضاد.

أي أنه كلما زادت قيمة س تتناقص تبعًا لها قيمة ص.

بعض الأشكال التي توضح أنواع الارتباط



في المثال (١٠)

يوضح هذا المثال بعد احتساب قيمة $r = -0.884$ ، كيف يمكن القول بأن العلاقة بين درجات مادة الإحصاء ودرجات مادة التاريخ هي علاقة عكسية قوية.

٦ الربط

الأمثلة (١)، (٣)، (٧)، (١٠) وفقرات «حاول أن تحل» تبين المواقف الحياتية التي يمكن أن يستخدم فيها الارتباط وقياسه.

٧ أخطاء متوقعة ومعالجتها

من المهم ألا يخلط الطلاب بين r و r^2 (س٣)، لذا يجب إعطاء الطلاب أمثلة حسابية متعددة لتخطي هذه المشكلة.

٨ التقييم

تابع الطلاب وهم يحلون فقرات «حاول أن تحل»، وركز على تفسيرهم للإجابات.

الحل:

١ من مخطط الانتشار نلاحظ أنه إذا زادت قيمة x تنخفض قيمة y ، ∴ الارتباط عكسي (سالب) العلاقة خطية

حاول أن تحل

٢ ارسم مخطط الانتشار للبيانات التالية وحدد نوع العلاقة التي تعبر عنها:

س	٧	٦	٥	٤	٣	٢	١
ص	١	٢	٣	٤	٥	٦	٧

١-٢) معامل الارتباط الخطي Linear Correlation Coefficient
تعلم أن الاستنتاجات المبنيّة على المعايير البصريّة لمخطط الانتشار هي نسبيّة بامتياز، لذا فنحن بحاجة إلى قياسات أكثر دقة وموضوعية بالتالي نستخدم لمعامل الارتباط الخطي (r).
تعريف: لمعامل الارتباط الخطي (r)
هو عبارة عن مقياس عددي لقوة العلاقة بين متغيرين يتمثلان ببيانات كمية، حيث $-1 \leq r \leq 1$.

خواص لمعامل الارتباط (r)

١ $-1 \leq r \leq 1$ أو $r \in [-1, 1]$.

٢ إذا كانت $r = 1$ يكون الارتباط طردي (موجب) تام.

٣ إذا كانت $r = -1$ يكون الارتباط عكسي (سالب) تام.

٤ إذا كانت $r = 0$ ينعدم الارتباط.

٥ إذا كانت $r \in (0, 0.7]$ يكون الارتباط طردي (موجب) قوي.

٦ إذا كانت $r \in (0, 0.5]$ يكون الارتباط طردي (موجب) متوسط.

٧ إذا كانت $r \in (0, 0.3]$ يكون الارتباط طردي (موجب) ضعيف.

٨ إذا كانت $r \in (-0.5, 0)$ يكون الارتباط عكسي (سالب) ضعيف.

٩ إذا كانت $r \in (-0.7, 0)$ يكون الارتباط عكسي (سالب) متوسط.

١٠ إذا كانت $r \in (-1, -0.7]$ يكون الارتباط عكسي (سالب) قوي.

معامل ارتباط بيرسون Pearson Correlation Coefficient
 $r = \frac{\sum (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sqrt{\sum (x_i - \bar{x})^2 \sum (y_i - \bar{y})^2}}$ حيث: $\bar{x} = \frac{\sum x_i}{n}$ حيث \bar{x} (الانحراف المعياري للمتغير x)
 $\bar{y} = \frac{\sum y_i}{n}$ حيث \bar{y} (الانحراف المعياري للمتغير y)
 $r = \frac{\sum (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sqrt{\sum (x_i - \bar{x})^2 \sum (y_i - \bar{y})^2}}$

مثال (٢)
ارسم مخطط الانتشار للبيانات التالية وحدد نوع العلاقة التي تعبر عنها.

س	١٠	٩	٨	٧	٦	٥	٤
ص	٩	٦	٣	٣.٥	٧	٧.٥	١٠

الحل:
لا توجد علاقة.

حاول أن تحل

٢ ارسم مخطط الانتشار للبيانات التالية وحدد نوع العلاقة التي تعبر عنها.

س	٧	٦	٥	٤	٣	٢	١
ص	١٤	١٢	١٠	٨	٦	٤	٢

مثال (٣)
البيانات التالية تبين العلاقة بين عمر الشخص وعدد ساعات التمرينات الرياضية التي يقوم بها:
العمر (س) | ٥٢ | ٤٦ | ٤٠ | ٣٤ | ٢٨ | ٢٢ | ١٦
عدد ساعات التمرينات (ص) | ١ | ١.٥ | ٣ | ٢ | ٥ | ٧ | ٨

١ ارسم مخطط الانتشار.
٢ حدّد نوع العلاقة.

اختبار سريع

ادرس العلاقة بين المتغيرين س، ص التالين:

س	١٣	١٥	١١	١٢	١٤	١٣,٥
ص	٧	١٠	٤	٦	٧,٥	٧

$$١٠٣٧,٢٥ = ٢ \text{ س} \quad ٧٨,٥ = \text{س}$$

$$٦١٦٢,٢٥ = ٢ (\text{س})$$


$$٣٠٦,٢٥ = ٢ \text{ ص} \quad ٤١,٥ = \text{ص}$$

$$١٧٢٢,٢٥ = ٢ (\text{ص})$$

$$٣٥٦,٥ = \text{س ص} \quad ٦ = \text{ن}$$

$$٠,٩٦٧٣ \approx \text{ر} \quad \text{الارتباط طردي موجب قوي.}$$

مخطط الانتشار



مثال (٤)

س	١	١	٣	٤	٧
ص	٤	٥	٨	١٥	٢٣

من الجدول المقابل:
 ١ أوجد مُعامل الارتباط س.
 ٢ حدّد نوع وقوة الارتباط.

الحل:

$$\text{١} \text{ مُعامل الارتباط: } r = \frac{\sum (ص - \bar{ص})(س - \bar{س})}{\sqrt{\sum (ص - \bar{ص})^2 \sum (س - \bar{س})^2}}$$

س	ص	س - \bar{س}	ص - \bar{ص}	(س - \bar{س})^2	(ص - \bar{ص})^2	(س - \bar{س})(ص - \bar{ص})
١	٤	-٣	-٣	٩	٩	٩
١	٥	-٣	-٢	٩	٤	٦
٣	٨	-١	١	١	١	-١
٤	١٥	٠	٨	٠	٦٤	٠
٧	٢٣	٣	١٦	٩	٢٥٦	٤٨
المجموع	٥٥	٠	٣٦	٢٦	٢٨٤	٨١

$$\therefore \bar{س} = \frac{١٥}{٥} = ٣, \quad \bar{ص} = \frac{٥٥}{٥} = ١١$$

$$\therefore \text{مُعامل الارتباط} = \frac{٨١}{\sqrt{٢٥٤ \times ٢٦}} \approx ٠,٩٩٦٨$$

نوع الارتباط: طردي موجب قوي.

حاول أن تحل

١ بيّن الجدول التالي العلاقة بين وزن مولود جديد وطوله خلال فترة محددة من الزمن.

الوزن (كجم)	٢,١	٢,٩	٣,٢	٣,٨	٤,١
الطول (سم)	٥٨	٦٥	٦٨	٧١	٧٥

١ أوجد مُعامل الارتباط س.

٢ حدّد نوع وقوة الارتباط.

المجموعة ب تمارين تعزيرية

(١) توضح البيانات في الجدول التالي درجات مادة الرياضيات، ودرجات مادة الفلسفة لستة طلاب في إحدى المدارس، حيث النهاية العظمى ١٠ درجات لكل مادة.

(س) درجات الرياضيات	٦	٤	٨	٥	٣,٥	٧
(ص) درجات الفلسفة	٦,٥	٤,٥	٧	٥	٤	٦,٧

(أ) ارسم مخطط الانتشار المناسب.

(ب) احسب مُعامل الارتباط س، ثم حدّد نوع العلاقة.

(٢) عندما تمّ تخدير عيّنة من ثمانية دبة ذكور، قام الباحثون بقياس محيط الصدر بالسنتيمتر ووزن الدبة بالكيلوجرام. فجاءت النتائج كما هو موضح في الجدول أدناه.

محيط الصدر (سم)	٦٦	١١٤	١٣٧	١٢٤	١٠٤	١١٢	٤٨
وزن الدبة (كجم)	٤١	١٥٦	١٨٩	١٥٨	١١٩	١٦٣	١٥٠

بناءً على هذه النتائج، هل وزن الدبة متعلّق بمحيط الصدر؟

(٣) يوضّح الجدول أدناه أوزان السيارات الجديدة (بمئات الكيلوجرامات)، ومعدلات استهلاكها للوقود على الطرقات السريعة (بالكيلومتر/لتر).

وزن السيارة (بمئات الكيلوجرامات)	١٣	١٦	٢٠	١٢,٥	١١	١٥,٥	١٣,٥	١٥	١٣	١١
معدل استهلاك الوقود (بالكيلومتر/لتر)	١١٧	١٠٢	٩٥	١١٠	١١٧	١١٠	١١٠	١٠٦	١٠٦	١٠٦

استناداً إلى النتائج، هل كمية استهلاك الوقود مرتبطة بقل السيارة؟

(٤) حدّد نوع العلاقة بين المتغيرين التالين مستخدماً الطريقة التي تريدها.


س	٣	٢,١	٢,٥	٤,٥	٦,١	٥,٤
ص	١١٠	١٢٠	١١٥	١٠٧	٨٧	٩٠

(٥) أوجد قيمة مُعامل الارتباط س، ثم حدّد نوعه وقوته.


(س) عدد أفراد الأسرة الواحدة	٣	٤	٥	٦	٧	٨
(ص) مصروف المنزل أسبوعياً	٢٥٠	٢٦٥	٢٧٣	٢٩٥	٣١٥	٣٣٠

«حاول أن تحل»

١



٢ علينا رسم مخطط الانتشار.



نلاحظ من خلال شكل المخطط الانتشاري أن العلاقة خطية والارتباط طردي (موجب).

مثال (٥)

أوجد مُعامل الارتباط وحدّد نوعه وقوته للمتغيرين س ، ص حيث:

س	١	٢	٣	٤	٥
ص	١	١-	٤-	٦-	٥-

الحل:

$$\text{مُعامل الارتباط: } r = \frac{\sum (ص-ص̄)(س-س̄)}{\sqrt{\sum (ص-ص̄)^2 \sum (س-س̄)^2}}$$

س	س	ص	ص	ص	ص	ص	ص
١	١	١	١	١	١	١	١
٢	١-	١	١	١	١	١	١
٣	١	١	١	١	١	١	١
٤	١	١	١	١	١	١	١
٥	١	١	١	١	١	١	١
٦	١	١	١	١	١	١	١
٧	١	١	١	١	١	١	١
٨	١	١	١	١	١	١	١
٩	١	١	١	١	١	١	١
١٠	١	١	١	١	١	١	١
١١	١	١	١	١	١	١	١
١٢	١	١	١	١	١	١	١
١٣	١	١	١	١	١	١	١
١٤	١	١	١	١	١	١	١
١٥	١	١	١	١	١	١	١
١٦	١	١	١	١	١	١	١
١٧	١	١	١	١	١	١	١
١٨	١	١	١	١	١	١	١
١٩	١	١	١	١	١	١	١
٢٠	١	١	١	١	١	١	١
٢١	١	١	١	١	١	١	١
٢٢	١	١	١	١	١	١	١
٢٣	١	١	١	١	١	١	١
٢٤	١	١	١	١	١	١	١
٢٥	١	١	١	١	١	١	١
٢٦	١	١	١	١	١	١	١
٢٧	١	١	١	١	١	١	١
٢٨	١	١	١	١	١	١	١
٢٩	١	١	١	١	١	١	١
٣٠	١	١	١	١	١	١	١
٣١	١	١	١	١	١	١	١
٣٢	١	١	١	١	١	١	١
٣٣	١	١	١	١	١	١	١
٣٤	١	١	١	١	١	١	١
٣٥	١	١	١	١	١	١	١
٣٦	١	١	١	١	١	١	١
٣٧	١	١	١	١	١	١	١
٣٨	١	١	١	١	١	١	١
٣٩	١	١	١	١	١	١	١
٤٠	١	١	١	١	١	١	١
٤١	١	١	١	١	١	١	١
٤٢	١	١	١	١	١	١	١
٤٣	١	١	١	١	١	١	١
٤٤	١	١	١	١	١	١	١
٤٥	١	١	١	١	١	١	١
٤٦	١	١	١	١	١	١	١
٤٧	١	١	١	١	١	١	١
٤٨	١	١	١	١	١	١	١
٤٩	١	١	١	١	١	١	١
٥٠	١	١	١	١	١	١	١

$$\therefore \bar{س} = \frac{١٥}{١٠} = ١.٥, \bar{ص} = \frac{١٥}{١٠} = ١.٥$$

$$\therefore \text{مُعامل الارتباط: } r = \frac{١٧-}{٣٤ \sqrt{١٠} \sqrt{١٠}} = ٠.٩٢٢٠$$

نوع الارتباط: عكسي سالب قوي.

حاول أن تحل

١ أوجد مُعامل الارتباط وحدّد نوعه وقوته للمتغيرين س ، ص حيث:

س	٨	١٠	٦	٤	١٥	١٣	٥	١١	٩
ص	١٥٠	١٦٠	١٦٠	١٥٠	١٣٠	١٦٠	١٨٠	١٢٠	١٦٠

(٦) أوجد مُعامل الارتباط وحدّد نوعه وقوته، للمتغيرين س ، ص حيث:


س	٢	٦	١٠	١٤	١٨	٢٢	٢٦	٣٠
ص	٣	٧	١١	١٥	١٩	٢٣	٢٧	٣١

(٧) أوجد مُعامل الارتباط وحدّد نوعه وقوته، للمتغيرين س ، ص حيث:

س	٢	٣	٤	٥	٦	٧	٨	٩
ص	٢	٣	٤	٥	٦	٧	٨	٩

(٨) أوجد مُعامل الارتباط وحدّد نوعه وقوته، للمتغيرين س ، ص حيث:

س	٤	١٠	١٠	١٢	١٤
ص	٥	٢	١٨	٤	١٠



ارتباط عكسي (سالب)
العلاقة خطية

نلاحظ من خلال شكل المخطط الانتشاري أن العلاقة خطية والارتباط عكسي (سالب).

مثال (٦)

احسب مُعامل الارتباط الخطي للبيانات التالية وحدد نوعه وقوته.

س	١	٢	٣	٤	٥
ص	٣	٥	٧	٩	١١

الحل:

$$r = \frac{\sum (S - \bar{S})(V - \bar{V})}{\sqrt{\sum (S - \bar{S})^2 \sum (V - \bar{V})^2}}$$

س	١	٢	٣	٤	٥
ص	٣	٥	٧	٩	١١
س - ص	-٣	-٢	-١	٠	١
ص - ص	-١٦	-٤	٠	٤	٨
(س - ص)²	٩	٤	١	٠	١
(ص - ص)²	٢٥٦	١٦	٠	١٦	٦٤
المجموع	١٥	٣٥	١٠٠	٤٠	٢٠

$$r = \frac{20}{\sqrt{40 \times 107}} = \frac{20}{\sqrt{4280}} = \frac{20}{65.4} = 0.306$$

نوع الارتباط: طردي (موجب) تام.

حاول أن تحل

٦ احسب مُعامل الارتباط الخطي للبيانات التالية وحدد نوعه وقوته.

س	١	٢	٣	٤	٥
ص	٤	٣	٢	١	٠

صيغة أخرى لمعامل ارتباط بيرسون

$$r = \frac{\sum (S - \bar{S})(V - \bar{V})}{\sqrt{\sum (S - \bar{S})^2 \sum (V - \bar{V})^2}}$$

مثال (٧)

بيّن الجدول التالي العلاقة بين أطوال عدد من الدببة وأوزانها، وذلك ضمن فترة محددة من أعمارها.

الطول (سم)	١٣٥	١٧٠	١٨٠	١٨٢	١٨٧	١٧٤	١٨٥	٩٤
الوزن (كجم)	٣٦	١٥٦	١٨٨	١٥٨	١١٩	١٦٣	١٥٠	١٥

استخدم الجدول أعلاه لإيجاد مُعامل الارتباط الخطي r والذي يحدّد العلاقة بين أطوال الدببة وأوزانها ثم بيّن نوعه وقوته.

الحل:

$$r = \frac{\sum (S - \bar{S})(V - \bar{V})}{\sqrt{\sum (S - \bar{S})^2 \sum (V - \bar{V})^2}}$$

س (الطول)	ص (الوزن)	س - ص	ص - ص
١٣٥	٣٦	٤٨٦٠	١٨٢٢٥
١٧٠	١٥٦	٢٦٥٢٠	٢٨٩٠٠
١٨٠	١٨٨	٣٣٨٤٠	٣٢٤٠٠
١٨٢	١٥٨	٢٨٧٥٦	٣٣١٢٤
١٨٧	١١٩	٢٢٢٥٣	٣٤٩٦٩
١٧٤	١٦٣	٢٨٣٦٢	٣٠٢٧٦
١٨٥	١٥٠	٢٧٧٥٠	٣٤٢٢٥
٩٤	١٥	١٤١٠	٨٨٣٦
المجموع	١٣٠٧	٩٨٥	٢٢٠٩٥٥

$$\frac{20,06}{\sqrt{165,27} \times \sqrt{2,4687}} = r \quad (أ)$$

$$r \approx 0,9935$$

(ب) نوع الارتباط: طردي (موجب) قوي

$$\frac{430}{\sqrt{24897} \times \sqrt{1087}} = r$$

$$r \approx \frac{430}{518,47} \approx 0,829376$$

نوع الارتباط: طردي (موجب) قوي

$$r = \frac{10-}{10} = \frac{10-}{10\sqrt{1} \times 10\sqrt{1}} = 1-$$

نوع الارتباط: عكسي (سالب) تام

$$\frac{\sum (x_1 - \bar{x}_1)(x_2 - \bar{x}_2)}{\sqrt{\sum (x_1 - \bar{x}_1)^2} \sqrt{\sum (x_2 - \bar{x}_2)^2}} = r$$

$$r \approx \frac{36}{\sqrt{29607} \times \sqrt{1057}} \approx \frac{36}{557,4944} \approx 0,0645$$

نوع الارتباط: طردي (موجب) ضعيف.

$$r = \frac{(985)(1307) - (173751)8}{\sqrt{(985)^2 - (149395)8} \sqrt{(1307)^2 - (220955)8}}$$

$$r = \frac{102213}{115582} \approx 0,8878$$

نوع الارتباط: طردي (موجب) قوي.

حاول أن تحل

احسب مُعامل الارتباط الخطي للمغيرين التاليين وبين نوعه وقوته.

س	١	٢	٣	٤	٥	٦
ص	٥٩	٦٥	٧٠	٧٢	٨٠	٥٢

مثال (٨)

احسب مُعامل الارتباط الخطي للمغيرين التاليين وبين نوعه وقوته.

س	١	٢	٣	٤	٥	٦
ص	٤	٧	٨	٣	٥	٥

الحل:

$$r = \frac{\sum (x_1 - \bar{x}_1)(x_2 - \bar{x}_2)}{\sqrt{\sum (x_1 - \bar{x}_1)^2} \sqrt{\sum (x_2 - \bar{x}_2)^2}}$$

س	ص	س	ص	س	ص
١	٤	٤	١	١٦	١٦
٢	٧	١٤	٤	٤٩	٤٩
٣	٨	٢٤	٩	٦٤	٦٤
٤	٣	١٢	١٦	٩	٩
٥	٥	٢٥	٢٥	٢٥	٢٥
٦	٥	٣٠	٣٦	٢٥	٢٥
المجموع	٢١ = $\sum x_1$	٣٢ = $\sum x_2$	١٠٩ = $\sum x_1^2$	٩١ = $\sum x_2^2$	١٨٨ = $\sum x_1 x_2$

٥٠

$$r = \frac{32 \times 21 - 109 \times 6}{\sqrt{(32)^2 - 188 \times 6} \sqrt{(21)^2 - 91 \times 6}}$$

$$r = \frac{18-}{104\sqrt{1057}} \approx 0,1723$$

نوع الارتباط: عكسي (سالب) ضعيف.

حاول أن تحل

احسب مُعامل الارتباط الخطي للبيانات التالية وبين نوعه وقوته:

س	٢	٣	٤	٥	٦
ص	٩٨	٩٩	٧٥	٤٠	١٠٠

مثال (٩)

احسب مُعامل الارتباط الخطي للبيانات التالية وبين نوعه وقوته.

س	٨	١٥	١٠	١٤	٩	١٢	١٣	١١
ص	٨	١	٦	٢	٧	٤	٣	٥

الحل:

$$r = \frac{\sum (x_1 - \bar{x}_1)(x_2 - \bar{x}_2)}{\sqrt{\sum (x_1 - \bar{x}_1)^2} \sqrt{\sum (x_2 - \bar{x}_2)^2}}$$

س	ص	س	ص	س	ص
٨	٨	٦٤	٦٤	٦٤	٦٤
١٥	١	١٥	٢٢٥	١	١
١٠	٦	٦٠	١٠٠	٣٦	٣٦
١٤	٢	٢٨	١٩٦	٤	٤
٩	٧	٦٣	٨١	٤٩	٤٩
١٢	٤	٤٨	١٤٤	١٦	١٦
١٣	٣	٣٩	١٦٩	٩	٩
١١	٥	٥٥	١٢١	٢٥	٢٥
المجموع	٩٢ = $\sum x_1$	٣٦ = $\sum x_2$	٣٧٢ = $\sum x_1^2$	١١٠٠ = $\sum x_2^2$	٢٠٤ = $\sum x_1 x_2$

٥١

$$٨ \quad r \approx ٠,٤١٢٢$$

نوع الارتباط: طردي (موجب) ضعيف

$$٩ \quad r = ١$$

نوع الارتباط: طردي (موجب) تام

$$١٠ \quad r \approx -٠,٥١٠٧$$

نوع الارتباط: عكسي (سالب) متوسط

$$r = \frac{36 \times 92 - 372 \times 8}{\sqrt{(36-20.4 \times 8) \times (92-1100 \times 8)}} = \frac{336}{336 \sqrt{336}} = \frac{336}{336} = 1$$

نوع الارتباط: عكسي (سالب) تام

حاول أن تحل

١ حسب مُعامل الارتباط الخطي للبيانات التالية وبين نوعه وقوته.

س	٨	٥	١١	٧	٩	١٢	٦
ص <td>٤ <td>١ <td>٧ <td>٣ <td>٥ <td>٨ <td>٢ </td></td></td></td></td></td></td>	٤ <td>١ <td>٧ <td>٣ <td>٥ <td>٨ <td>٢ </td></td></td></td></td></td>	١ <td>٧ <td>٣ <td>٥ <td>٨ <td>٢ </td></td></td></td></td>	٧ <td>٣ <td>٥ <td>٨ <td>٢ </td></td></td></td>	٣ <td>٥ <td>٨ <td>٢ </td></td></td>	٥ <td>٨ <td>٢ </td></td>	٨ <td>٢ </td>	٢

مثال (١٠)

في ما يلي درجات عدد من الطلاب في مادتي الإحصاء (س) والتاريخ (ص)

الإحصاء (س)	٥	١٠	٦	١٥	١١	١٣	١٧	١٢
التاريخ (ص)	١٧	١٧	١٥	٩	١٠	١٠	٦	١٢

١ أوجد مُعامل الارتباط r .

٢ حدّد نوع وقوة الارتباط.

الحل:

$$١ \quad r = \frac{n(\sum s)(\sum v) - (\sum sv)}{\sqrt{n(\sum s^2 - (\sum s)^2/n) \times n(\sum v^2 - (\sum v)^2/n)}}$$

س	٥	١٧	٩	١٣	١١	١٣	٢٥	٢٨٩
ص	١٠	١٧	١٥	٩	١٠	١٠	٦	٢٨٩
س	٨٩	١١٠	١٣٠	١٣٠	١٣٠	١٣٠	٢٢٥	٢٨٩
ص	١٢	١٢	١٢	١٢	١٢	١٢	١٢	١٤٤
المجموع	٨٩ = $\sum s$	١١٠ = $\sum v$	٩٦٦ = $\sum sv$	٩٦ = $\sum s^2$	١١٠٩ = $\sum v^2$	١٢٦٤ = $\sum sv$		

$$r = \frac{(96)(89) - (966)8}{\sqrt{(96 - (1264)8/89) \times (1109 - (110)8/89)}}$$

$$r = \frac{816 - 8544}{896 \sqrt{896 \times 901}} = \frac{816 - 8544}{896 \sqrt{801856}} = \frac{-7728}{896 \times 896} = -0.8841$$

نوع الارتباط: عكسي (سالب) قوي.

حاول أن تحل

١ أوجد مُعامل الارتباط الخطي للبيانات التالية وحدّد نوعه وقوته.

س	١	٣	٨	٧	٦	٥	٧	٨
ص	١٩	١٦	١٦	١٦	١٩	١٨	١٧	١١

٢-٢: الانحدار

١ الأهداف

- يوجد معادلة خط الانحدار.
- يتنبأ باستخدام معادلة خط الانحدار.
- يوجد مقدار الخطأ.

٢ المفردات والمفاهيم الجديدة

الانحدار - معادلة خط الانحدار - هامش الخطأ - التنبؤ.

٣ الأدوات والوسائل

آلة حاسبة - حاسوب - جهاز إسقاط (Data Show).

٤ التمهيد

اطلب من الطلاب احتساب مُعامل الارتباط للبيانات التالية:

(أ)

س	١٢	١٠	١١	٤٠	٣٣	٢٣
ص	٢٤	٢٠	٢٢	٨٠	٦٦	٤٦

(ب)

س	٣-	٢-	١-	٠	١	٢	٣
ص	٩	٤	١	٠	١	٤	٩

اسألهم: هل كان بالإمكان تنبؤ هذه القيم للمُعامل؟

الانحدار Regression

٢-٢

سوف نتعلم

- إيجاد معادلة خط الانحدار.
- التقدير باستخدام معادلة خط الانحدار.
- إيجاد مقدار الخطأ.

دعنا نفكر ونتناقش

في الجدول التالي قيم لمتغيرين: طول الأم (س) وطول ابنتها (ص) بالستيمتر.

طول الأم (س)	١٦٠	١٦٨	١٦٩	١٦٤	١٧٤	١٦٦	١٦٦	١٥٨
طول الابنة (ص)	١٥٨	١٦٧	١٧٠	١٦٣	١٧١	١٦٥	١٧٢	١٥٧

لدينا $r \approx 0.844$ ، إذاً يوجد علاقة خطية طردية قوية بين طول الأم وطول ابنتها. أضفنا زوج المتغيرين (س، ص) = (١٦٥، ٣٧٥) إلى الجدول حيث $\bar{s} = 165$ هو المتوسط الحسابي لأطوال الأمهات، $\bar{v} = 165$ هو المتوسط الحسابي لأطوال البنات فلاحظنا أن قيمة r لم تتغير.

نريد أن نقدر طول الابنة من خلال العلاقة مع طول أمها، لذا افترضنا زوج المتغيرين (١٧٠، ١٥٠) وأضافناه إلى الجدول.

- هل يتوافق زوج المتغيرين الذي أضفناه مع الجدول علماً أنّ قيمة r تصبح 0.216 ؟
- هل يمكن التنبؤ بقيمة إحدى الظاهرتين إذا علمت قيمة الظاهرة الأخرى؟ وكيف؟

Regression

الانحدار

لقد تعلمنا في الدرس السابق مفهوم الارتباط والارتباط الخطي، وعرفنا كيف يمكن حساب قيمة مُعامل الارتباط الخطي بين متغيرين، وعليه تمّ تحديد قوة العلاقة الخطية بين المتغيرين ونوع هذه العلاقة فيما إذا كانت طردية أم عكسية.

وفي هذا الدرس سوف نتعلم وصف العلاقة بين متغيرين بإيجاد معادلة الخط المستقيم الممثل لهذه العلاقة.

يسمى هذا الخط المستقيم بخط الانحدار، وتسمى معادلته بمعادلة خط الانحدار.

تعريف: الانحدار

هو وصف العلاقة بين متغيرين.

٥٤

تمرين
٢-٢

الانحدار Regression

المجموعة أ تمرين أساسية

(١) أجرت شركة دراسة لقياس العلاقة بين القوة المبدولة على عجلة منتج ما وقدرة تحملها. فأنت النتائج كما هو موضح في الجدول التالي.

س (س) القوة المبدولة	٠.١	٠.٣	٠.٥	٠.٨	١	١.٢	١.٥
ص (ص) قدرة التحمل	١	٤	٦	٨	١٠	١١	١٧

أوجد معادلة خط الانحدار.

(٢) تمثّل البيانات في الجدول التالي العدد ص من السلع المنتجة وفق ساعات العمل س.

س	٨٠	٧٩	٨٣	٨٤	٧٨	٦٠	٧٢	٨٥
ص	٣٠٠	٣٠٢	٣١٥	٣٣٠	٣٠٠	٢٥٠	٣٠٠	٣٤٠

(أ) أوجد معادلة خط الانحدار.

(ب) قدر عدد السلع المنتجة (ص)، بفرض أن عدد ساعات العمل س = ٩٠.

(٣) يوضّح الجدول التالي نتائج اختبار الكفاءة لمسؤولي المبيعات (س) في متجر معيّن وقيمة المبيعات (ص) بالددينار لكل موظّف.

س	٢٥	٤٢	٣٣	٥٤	٢٩	٣٦
ص	٤٢	٧٢	٥٠	٩٠	٤٥	٤٨

(أ) أوجد معادلة خط الانحدار.

(ب) قدر قيمة مبيعات موظّف قد حصل على س = ٥٠.

(ج) أوجد مقدار الخطأ في قيمة المبيعات، عند س = ٤٢.

٢٣

٥ التدريس

وضّح للطلاب أن في الدراسات الإحصائية، لا يكفي تبيان العلاقة بين متغير وآخر، لأن الأهم هو إمكانية تنبؤ قيم لا نعرفها لمتغير، من خلال البيانات المعطاة.

والمعادلة التي تسمح تنبؤ هذه القيم تسمى معادلة الانحدار وتتمثل بـ $\hat{ص} = ب + م س$.

تستخدم فقط هذه المعادلة إذا ما كانت العلاقة الخطية موجودة بين المتغيرين.

ذكّر الطلاب بأن الميل ب يعطى بـ:

$$ب = \frac{ن(كس ص) - (كس ص)(ص)}{ن(كس) - (كس)^2}$$

والجزء المقطوع من المحور الصادي

$$هو م = ص - ب \bar{س} حيث \bar{س} = \frac{كس}{ن} ، \bar{ص} = \frac{كص}{ن}$$

مقدار خطأ بين القيمة المتوقعة والقيمة الجدولية:

$$مقدار الخطأ = |صس - \hat{صس}|$$


Equation of Linear Regression

معادلة خط الانحدار

تعريف: معادلة خط الانحدار


هي المعادلة الخطية التي يمكن من خلالها التنبؤ بقيمة أحد المتغيرين إذا علمت قيمة المتغير الآخر.

سبق لنا دراسة معادلة الخط المستقيم على الصورة: $ص = م س + ج$ ، حيث م ترمز إلى ميل هذا المستقيم، $|ج|$ ترمز إلى طول الجزء المقطوع من محور الصادات.



شكل (١)

أما في الإحصاء معادلة خط الانحدار مستقيم تكتب على الصورة: $\hat{ص} = ب + م س$ ، حيث $|ب|$ ترمز إلى طول الجزء المقطوع من محور الصادات، ب ترمز إلى ميل المستقيم.



شكل (٢)

حيث: $ب = \frac{ن(كس ص) - (كس ص)(ص)}{ن(كس) - (كس)^2}$

$م = \frac{ص - \bar{ص}}{س - \bar{س}}$

حيث: $\bar{ص} = \frac{كص}{ن}$ ، $\bar{س} = \frac{كس}{ن}$

المجموعة ب تمارين تعزيرية

(١) يقاس نجاح مجتمع تجاري بالمسافة التي يقطعها رواده للوصول إليه. يبين الجدول التالي عدد ص من الرواد والمسافة س بالكيلومتر التي قطعوها للوصول إليه.

س المسافة (بالكيلومتر)	ص عدد الرواد
١	٤٠
٢	٣٤
٤	٢٣
٦	٢٥
٧	١٩
٨	١٥

(أ) أوجد معادلة خط الانحدار.

(ب) إذا كان المجتمع على بعد ٣ كم من مكان السكن، فكم عدد الرواد المتوقع أن يقصده؟

(٢) يوضّح الجدول التالي الطول (س) والوزن (ص) لعشرة لاعبي كرة سلة.

س	ص
٢٠٥	١٠١
٢٠٣	١٠٠
٢٠١	١٠٣
١٩٨	٩٣
١٩٣	٩١
١٩٣	٨٧
١٩٢	٩٠
١٩٠	٨٦
١٨٩	٨٥
١٨٦	٨٥

(أ) أوجد معادلة خط الانحدار.

(ب) قنّر قيمة ص إذا كان س = ١٩٥

(ج) أوجد مقدار الخطأ إذا كان س = ٢٠١ ثم إذا كان س = ١٩٠

في التمرين (٣-٤)، استخدم البيانات المعطاة لإيجاد المعادلة الخاصة بخط الانحدار.

س	ص
١٠	٣٠
٥	١٦
٥	١٤
٣	٩
٢	٦

س	ص
١٠	٢
٥	٥
٥	١٥
٣	٠
٢	٦

(٥) يبين الجدول أدناه وزن النفايات (س) بالكيلوجرام الذي تتخلص منه أسرة وعدد أفرادها (ص).

وزن النفايات س (كجم)	عدد أفراد الأسرة ص
١٦	٤
١٥	٦
٢٢	٥
٩,٩٩	١
١٠	٢
١٣	٤
١٧,٣	٦
١٢,٥	٣
٩	٣
٤,٩	٢

(أ) أوجد معادلة خط الانحدار، وليكن المتغير الأول المتغير المستقل (س).

(ب) ما هو أفضل توقع لعدد أفراد أسرة تتخلص من ٢٣ كجم من النفايات؟

في المثال (١)

يوضح هذا المثال أنه لإيجاد معادلة الانحدار الخطي نبدأ باحتساب جميع عناصر المعادلة \hat{p} ، b ونعوّض في $\hat{v} = b + \hat{p}$ فالقيمة \hat{v} تعطي مسافة أكبر من ٥٠ مترًا لهذا تكون الكرة قد وصلت إلى الأرض.

ومقدار الخطأ $\approx 0,2845$ ، عند القيمة $s = 2,5$ ، بين القيمة الجدولية والقيمة التي تحقق معادلة خط الانحدار.

في المثالين (٢)، (٣)

تطبيق مباشر لخطوات إيجاد معادلة خط الانحدار، والتنبؤ بقيمة v بمعلومية s ، وتحديد مقدار الخطأ في التنبؤ.

٦ الربط

يبين المثال (١) أهمية الحساب والانحدار في مجال الفيزياء.

- خطوات إيجاد معادلة خط الانحدار: $\hat{v} = b + \hat{p}$ س
١. تعيين قيمة b
 ٢. تعيين قيمة \hat{p}
 ٣. نكتب معادلة خط الانحدار: $\hat{v} = b + \hat{p}$ س
 ٤. التنبؤ بقيمة v إذا علمت قيمة s
 ٥. تحديد مقدار الخطأ في التنبؤ.
- مقدار الخطأ = |القيمة الجدولية - القيمة التي تحقق معادلة الانحدار|
 $= |ص - \hat{ص}|$

مثال (١)

سقطت كرة من ارتفاع ٥٠ مترًا، وتم تسجيل المسافات (بالمتر) التي قطعها هذه الكرة كل ٠,٥ ثانية لمدة ثلاث ثوان.

فأنت النتائج كما يوضح الجدول التالي:

الوقت (س)	٠	٠,٥	١	١,٥	٢	٢,٥	٣
المسافة (ص)	٠	١,٢	٤,٩	١١	١٩,٥	٣٠,٥	٤٤

١. أوجد معادلة خط الانحدار.
٢. قدر قيمة المسافة v عندما $s = 4$
٣. أوجد مقدار الخطأ في المسافة عندما $s = 2,5$ ثانية.

٥٦

اختبار الوحدة الثانية

أسئلة المقال

(١) يبين الجدول التالي درجات بعض الطلاب في مادة اللغة العربية (س) وفي اللغة الفرنسية (ص) حيث النهاية العظمى ١٠ درجات لكل مادة.

مادة اللغة العربية (س)	٧	٦	٨	٧,٥	٥	٩
مادة اللغة الفرنسية (ص)	٧	٥	٧	٥	٥	٥

- (أ) ارسم مخطط الانتشار للبيانات، ماذا تلاحظ؟
- (ب) احسب معامل الارتباط r للتأكد من صحة إجابتك.
- (٢) يبين الجدول التالي عدد الكيلومترات التي تقطعها كل سيارة لكل جالون من الوقود (س) وثمان السيارة (ص).

عدد الكيلومترات لكل جالون (س)	١٠٠	١١٠	١٣٠	١٣٥	١٥٠	١٧٠
ثمان السيارة (ص)	١٠٠٠٠	١٠٦٠٠	١١٥٠٠	١٢٤٠٠	١٢٩٠٠	١٣٥٠٠

- (أ) احسب معامل الارتباط r .
 - (ب) أوجد معادلة خط الانحدار.
 - (ج) كم سيكون ثمن السيارة المتوقع إذا قطعت ١٤٠ كيلومتر/جالون؟
 - (د) أوجد مقدار الخطأ عندما $s = 135$
- (٣) من الجدول التالي:

س	٢٥	٢٧	٣١	٣٢	٥٠	٦٥
ص	٥٠	٥٥	٥٥	٥٥	٦٠	٧٠

- (أ) ارسم مخطط الانتشار للبيانات، ماذا تلاحظ؟
- (ب) احسب معامل الارتباط r .
- (ج) قدر v عندما $s = 40$
- (د) أوجد مقدار الخطأ عند $s = 50$

٢٥

٧ أخطاء متوقعة ومعالجتها

ذُكر الطلاب ضرورة الانتباه عند اختيار المتغير المستقل س والمتغير التابع ص. مثال على ذلك الطول لا يتأثر بالوزن، بل الوزن ص يتأثر بالطول س.

٨ التقويم

تابع الطلاب في فقرات «حاول أن تحل» لمعرفة مدى قدرتهم وسرعتهم في حساب المعامل، والمعادلات، وشرح الإجابات.

اختبار سريع

أوجد، إذا ممكناً، معادلة الانحدار الخطي للبيانات التالية واحسب مقدار الخطأ عند $s = 10$

س	ص
9	25
10	25
14	33
15,5	35
15	33
12	3

أولاً نوجد r لتتأكد من وجود ارتباط خطي بين s, v .

$$r = -0,4534$$

إذاً يوجد ارتباط خطي عكسي (سالِب) ضعيف

$$\hat{v} = 1 + b s$$

$$\hat{v} = -2,007 s + 412,0$$

$$\hat{v}_{10} = -30,517 + 412,0$$

$$\text{مقدار الخطأ} = |30,517 + 33 - 412,0| = 2,483$$

٩ إجابات وحلول

«دعنا نفكر وتناقش»

• زوج المتغيرين (150، 170) لا يتناسب مع قيم الجدول، لأن قيمة مُعامل الارتباط الخطي r شهدت تغييراً ملحوظاً.

• إذا وجدنا العلاقة الخطية بين طول الأم وطول ابنتها يمكننا التنبؤ بقيمة إحدى الظاهرتين إذا علمت قيمة الظاهرة الأخرى.

الحل: ب $\hat{v} = \frac{(10 - \bar{s})(s - \bar{s})}{(10 - \bar{s})^2}$

س	ص	ص	س
0	0	0	0
0,25	0,6	1,2	0,5
1	4,9	4,9	1
2,25	16,5	11	1,5
4	39	19,5	2
6,25	71,25	30,5	2,5
9	132	44	3
المجموع	10,5 = \bar{s}	111,1 = \bar{v}	22,75 = \bar{s}^2

$$v = \frac{10 - \bar{s}}{\bar{s} - \bar{s}} = 1, s = \frac{111,1 - \bar{v}}{\bar{v} - \bar{v}} = 10,8714$$

$$b = \frac{111,1 \times 10,5 - 22,75 \times 7}{(10,5)^2 - 22,75 \times 7}$$

$$b = \frac{718,2}{49}$$

$$b \approx 14,6571$$

$$\hat{v} = b s + \bar{v}$$

$$10,8714 = 14,6571 s + 10,8714$$

$$s \approx 0,1143$$

معادلة خط الانحدار هي: $\hat{v} = 14,6571 s + 0,1143$

∴ $\hat{v}_{10} = 14,6571 + 0,1143 = 14,7714$ س

∴ المسافة ص عندما $s = 4$ هي:

$$\hat{v}_4 = 14,6571 + 0,1143 \times 4$$

$$\hat{v}_4 \approx 0,5214 \text{ مترًا.}$$

عند $s = 2,5$ ثانية من المعادلة $\hat{v} = 14,6571 s + 0,1143$ س

$$\hat{v}_{2,5} = 14,6571 \times 2,5 + 0,1143$$

$$\hat{v}_{2,5} \approx 30,5285$$

من الجدول عند $s = 2,5$ ثانية نجد أن $v = 30,5$

∴ مقدار الخطأ = $|v - \hat{v}|$

$$|30,5 - 30,5285| =$$

$$0,0285$$

حلول أن تحل

1 في الجدول التالي: المتغير س هو تكلفة إنتاج فيلم سينمائي (بملايين الدولارات) والمتغير ص هو مردود هذا الفيلم.

التكلفة (س)	62	90	50	35	200	100	95
المردود (ص)	65	74	48	57	601	146	47

1 أوجد معادلة خط الانحدار.

2 قَدِّر مردود فيلم بلغت تكلفته 55 مليون دولار.

3 أوجد مقدار الخطأ لفيلم بلغت تكلفته 90 مليون دولار.

مثال (2)

من الجدول التالي:

س	43	48	56	61	67	70
ص	128	120	135	143	141	152

أوجد:

1 معادلة خط الانحدار.

2 قيمة ص عندما $s = 52$

3 مقدار الخطأ عندما $s = 67$

«حاول أن تحل»

١ (أ) $\hat{ص} = - = ١٦٣, ٦٠٨٣ + ٤٣٨٧, ٣$ س

(ب) يبلغ المردود حوالي ٥, ٢٥ مليون دولار

(ج) مقدار الخطأ = $٦٤ - ١٤٥, ٨٧٤٧$

$٨١, ٨٧٤٧ =$

٢ (أ) $\hat{ص} = ٩٤, ٦٩٠٧ + ٠, ٠١٧٨$ س

(ب) $\hat{ص} = ٩٨, ٢٥٠٧$ س

(ج) مقدار الخطأ عند س = ١٩٢

$|٩٨, ١٠٨٣ - ٩٧| =$

$١, ١٠٨٣ =$

٣ (أ) $\hat{ص} = - = \frac{٣٨}{٢٣} + \frac{٢٢}{٢٣}$ س

أو $\hat{ص} = - = ١, ٦٥٢٢ + ٠, ٩٥٦٥$ س

(ب) $\hat{ص} = ٧, ٩١٣٠$ أو $\frac{٢١}{٢٣}$ س

(ج) مقدار الخطأ = $٦ - ٧, ٩١٣٠$

$١, ٩١٣٠ =$

الحل:

ب = $\frac{ن(٣س - ص) - (٣س)(ص)}{ن(٣س) - (٣س)(ص)}$

س	ص	س	س
١٨٤٩	٥٥٠٤	١٢٨	٤٣
٢٣٠٤	٥٧٦٠	١٢٠	٤٨
٣١٣٦	٧٥٦٠	١٣٥	٥٦
٣٧٢١	٨٧٢٣	١٤٣	٦١
٤٤٨٩	٩٤٤٧	١٤١	٦٧
٤٩٠٠	١٠٦٤٠	١٥٢	٧٠
المجموع	٤٧٦٣٤	٨١٩	٣٤٥

١

$١٣٦, ٥ = \frac{٨١٩}{٦} = \hat{ص}$ ، $٥٧, ٥ = \frac{٣٤٥}{٦} = \hat{س}$ ، $٦ = ن$

ب = $\frac{٨١٩ \times ٣٤٥ - ٤٧٦٣٤ \times ٦}{(٣٤٥) - ٢٠٣٩٩ \times ٦}$

$\approx ٠, ٩٦٤٤$

أ = $\hat{ص} - \hat{س}$

$٥٧, ٥ \times ٠, ٩٦٤٤ - ١٣٦, ٥ =$

$٨١, ٠٤٧٠ =$

∴ معادلة خط الانحدار هي: $\hat{ص} = ٠, ٩٦٤٤ + ٨١, ٠٤٧٠$

عندما س = ٥٢

$\hat{ص} = ٥٢ \times ٠, ٩٦٤٤ + ٨١, ٠٤٧٠$

$١٣١, ١٩٥٨ \approx$

من الجدول نجد ص = ١٤١

$\hat{ص} = ٥٢ \times ٠, ٩٦٤٤ + ٨١, ٠٤٧٠$

$١٤٥, ٦٦١٨ \approx$

٥٩

∴ مقدار الخطأ = |ص - $\hat{ص}$ |

$٤, ٦٦١٨ = |١٤٥, ٦٦١٨ - ١٤١| =$

حاول أن تحل

من الجدول التالي:

س	ص	س	ص	س	ص	س	ص
١٨٤	١٩٧	٢٠٣	١٨٩	١٩٢	١٩٧	٢٠٥	١٨٠
١٢٢	١١٠	٨٠	٩٢	٩٧	٨٢	١١٧	٨٥

أوجد:

١ معادلة خط الانحدار.

٢ قيمة ص عندما س = ٢٠٠

٣ مقدار الخطأ عندما س = ١٩٢

مثال (٣)

باستخدام البيانات التالية لقيم س ، ص.

س	ص	س	ص	س	ص
٩	٧	٥	٣	١	١
١٤	١٠	٩	٥	٢	٣

أوجد:

١ معادلة خط الانحدار.

٢ قيمة ص عندما س = ١٠

٣ مقدار الخطأ عندما س = ٥

الحل:

ب = $\frac{ن(٣س - ص) - (٣س)(ص)}{ن(٣س) - (٣س)(ص)}$

س	ص	س	ص	س	ص
١	٢	٢	١	١	١
٩	١٥	٥	٣	١	١
٢٥	٤٥	٩	٥	٢	٣
٤٩	٧٠	١٠	٧	١	١
٨١	١٢٦	١٤	٩	١	١
المجموع	٢٥٨	٤٠	٢٥	٢٥	١٦٥

١

٦٠

المرشد لحل المسائل

المرشد لحل المسائل

في متجر للأدوات الكهربائية، تختلف أسعار آلات التصوير الرقمية بحسب نقاوة صورتها التي تقاس بالميجابكسل. يوضح الجدول التالي أسعار إحدى هذه الآلات ومدى نقاوة صورتها:

(س) نقاوة الصورة بالميجابكسل	١٨	١٦	١٤	١٠	٨	٥
(ص) السعر بالدينار الكويتي	١٤٠	١٢٠	٨٥	٥٠	٣٥	٢٥

أراد جاسم تقدير سعر آلة نقاوتها ٢٠ ميغابكسل، علمًا أنه سمع من صاحب المتجر أنه يوجد علاقة بين السعر والنقاوة. ففكر جاسم:


إذا رسمت مخطط الانتشار للأسعار والنقاوة، أتعرف على طبيعة هذه العلاقة. فلاحظ أن هذه العلاقة هي خطية طردية، لذا أراد إيجاد قيمة مُعامل الارتباط الخطي ومعادلة خط الانحدار. أوجد القيم التالية التي ستساعده على ذلك:

$$\begin{aligned} \bar{ن} &= ٦, \bar{ص} = ٧١, \bar{صص} = ٤٥٥, \bar{صن} = ٤٥٣٥, \\ \bar{صصص} &= ٩٦٥, \bar{صصصص} = ٤٥٥٧٥, \bar{صصصصص} = ٥٠٤١, \bar{صصصصصص} = ٢٠٧٠٢٥, \\ \bar{صصصصصصص} &= ١١,٨, \bar{صصصصصصصص} = ٧٥,٨ \end{aligned}$$

قيمة مُعامل الارتباط الخطي $r \approx ٩٧٨٨$ ، وهذا يدل على علاقة خطية قوية بين السعر والنقاوة.

معادلة خط الانحدار: $\hat{ص} = ٩,٢٢ + ٣٣ن$

لتقدير سعر آلة مع ٢٠ ميغابكسل، نعوض $ن = ٢٠$ ونحصل على $\hat{ص} \approx ١٥١$ دينارًا كويتيًّا.



مسألة إضافية

أجري في المتجر نفسه تخفيض على الأسعار بنسبة ١٥٪.

برأيك، كيف يتغير تقدير جاسم؟ أعد الحل مستخدمًا السعر المخفض للتأكد من إجابتك.

(ملاحظة: استخدم الجدول نفسه من المسألة السابقة إنَّما بتخفيض قدره ١٥٪ على الأسعار)

إجابة «مسألة إضافية»

سيتميّز مخطّط الانتشار فقط في قيم المحور الصادي.

الجدول الجديد:

س	١٨	١٦	١٤	١٠	٨	٥
ص	١١٩	١٠٢	٧٢,٢٥	٤٢,٥	٢٩,٧٥	٢١,٢٥


$$\hat{ص} = ٧,٨٣٦١ + ٢٨,٢٦٨٦ن$$

$\hat{ص} \approx ١٢٨,٤٥٣٤$ ، وهو قريب جدًا من التقدير في

المسألة إذا أُجري عليه تخفيض بقيمة ١٥٪.

$$١٢٨,٣٥ = ((١٥ - ١) \times ١٥١)$$

مخطط تنظيمي للوحدة الثانية



ملخص

- الارتباط هو طريقة إحصائية يمكن من خلالها تحديد العلاقة بين متغيرين.
- مخطط الانتشار هو شكل بياني لعدد من الأزواج المرتبة (س، ص) يستخدم لوصف العلاقة الموجودة بين متغيرين. العلاقة بين متغيرين تكون:
 - علاقة خطية طردية: تنتشر النقاط على جانبي خط مستقيم تصاعدي.
 - علاقة خطية عكسية: تنتشر النقاط على جانبي خط مستقيم تنازلي.
 - علاقة غير خطية: تنتشر النقاط على جانبي خط منحني.
 - لا توجد علاقة: لا يوجد نمط محدد لانتشار النقاط في الشكل البياني.
- مُعامل الارتباط الخطي يقيس قوة العلاقة الخطية بين متغيرين متصلين ونوعها،

$$r = \frac{\bar{صصص} - \bar{ص} \bar{صص}}{\sqrt{(\bar{صصصص} - \bar{ص}^2)(\bar{صصصص} - \bar{ص}^2)}} \quad \text{أو} \quad r = \frac{\bar{صصص} - \bar{ص} \bar{صص}}{\sqrt{(\bar{صصصص} - \bar{ص}^2)(\bar{صصصص} - \bar{ص}^2)}}$$

- الانتشار هو طريقة إحصائية تستخدم لوصف طبيعة العلاقة بين متغيرين س، ص من حيث كونها خطية أو غير خطية.
- معادلة خط الانحدار $\hat{ص} = أ + ب ن$ ، حيث:

$$ب = \frac{\bar{صصص} - (\bar{ص} \bar{صص})}{\bar{صصص} - (\bar{ص} \bar{صص})}$$

$$أ = \bar{ص} - ب \bar{ن}$$

- التقدير يتم بالتعويض لقيمة س في معادلة خط الانحدار.
- مقدار الخطأ = |القيمة الجدولية - القيمة من معادلة الانحدار| = |ص - ص̂|

$$\begin{aligned} \bar{ن} &= ٥, \bar{ص} = ٣٥, \bar{صص} = ٢٥٠, \\ \bar{صصص} &= ٤٠ \times ٢٥ - ٢٥٨ \times ٥ = ١,٤٥ \\ \bar{صصصص} &= ٢٥ \times ٢٥ - ١٦٥ \times ٥ = ١٠,٧٥ \\ \bar{صصصصص} &= ٥ \times ١,٤٥ - ٨ = ٠,٧٥ \end{aligned}$$

∴ معادلة خط الانحدار هي: $\hat{ص} = ١ + ١٠ن$

عندما $ن = ١٠$ فإن:

$$\hat{ص} = ١٠ + ١٠ \times ١ = ٢٠$$

من الجدول $ص = ٩$

$$\text{من المعادلة } \hat{ص} = ١٠ + ١٠ \times ١ = ٢٠$$

∴ مقدار الخطأ = |ص - ص̂|

$$= |٩ - ٢٠| = ١١$$

حاول أن تحل

من الجدول التالي:

س	٤	٥	٨	٩	١٠	١٢
ص	٢	٤	٥	٨	٦	١١

أوجد:

١ معادلة خط الانحدار.

٢ قيمة ص عندما $ن = ١٠$

٣ أوجد مقدار الخطأ عندما $ن = ١٠$

(٤) توضح البيانات المزدوجة في الجدول أدناه وزن الأوراق المستهلكة (س) بالكيلوجرام وعدد أفراد الأسرة (ص) في فترة محددة.

وزن الأوراق المستهلكة (س) (كجم)	٥,٢	٣,١	٣	٣,٩	٤	٤,٣	٣,٤	١,١
عدد أفراد الأسرة ص	٥	١	٢	٤	٦	٣	٣	٢

(١) أوجد معادلة الخط الانحدار.

(ب) ما هو عدد أفراد أسرة استهلكت ٨ كجم من الورق؟

في التمرين (٦-٥)، استخدم البيانات المعطاة لإيجاد المعادلة الخاصة بخط الانحدار.

س	٥	٤	٢	١
ص	١١	٩	٥	٣

بنود الصحح والخطأ

في البنود (٥-١) عبارات ظلل الرمز (١) إذا كانت العبارة صحيحة (ب) إذا كانت خاطئة

- (١) الارتباط هو علاقة بين متغيرين. (١) (ب)
- (٢) إذا كان r معامل الارتباط بين متغيرين فإن $r > 1$. (١) (ب)
- (٣) إذا كان معامل الارتباط بين متغيرين $r = 1$ كان الارتباط تاماً. (١) (ب)
- (٤) الانحدار هو وصف العلاقة بين متغيرين. (١) (ب)
- (٥) إذا كان معامل الارتباط $r = 0$ فإن الارتباط منعدم. (١) (ب)

بنود الاختيار من متعدد

في البنود (٦-١٥) لكل بند ٤ خيارات واحد فقط منها صحيح. ظلل دائرة الرمز الدال على الإجابة الصحيحة.

(٦) قيمة معامل الارتباط (r) التي تجعل الارتباط طردي تام بين المتغيرين s ، v هي:

- (١) -1
- (ب) $-0,5$
- (ج) $0,5$
- (د) 1

(٧) إذا كانت قيمة معامل الارتباط (r) بين متغيرين s و v هي $[-0,7, 1-]$ فإن العلاقة:

- (١) عكسية تامة
- (ب) عكسية قوية
- (ج) طردية تامة
- (د) طردية قوية

تمارين إثرائية

لكل من الجدولين ١ و ٢ التاليين:

س	٢	٣	٤	٥	٦	٧
ص	١	١,٥	٢	٢,٥	٣	٣,٥

س	١	٢	٣	٤
ص	٩	٨	٧	٦

(١) أوجد مُعامل الارتباط r .

(ب) ارسم مخطط الانتشار للبيانات.

(ج) أوجد معادلة خط الانحدار.

(د) قَدِّر في الجدول (١) قيمة v إذا كانت $s = 6,5$.

(هـ) قَدِّر في الجدول (٢) قيمة s إذا كانت $v = 6,5$.

(٦) أوجد مقدار الخطأ في نقطتين مختلفتين لكل من المعادلتين.

(٧) يبيِّن الجدول التالي قيم المتغيرين (s) و (v)

س	١	١	٢	٢	٣	٣	٤	٤	٥	٥	٦	٦	٧	٧	٨	٨
ص	٦	٦	٦	٦	٦	٦	٦	٦	٦	٦	٦	٦	٦	٦	٦	٦

(١) ارسم مخطط الانتشار للبيانات.

(ب) احسب مُعامل الارتباط r ، ثم أوجد معادلة خط الانحدار.

(ج) أوجد مقدار الخطأ عند $s = 3$.

(د) إذا قسمنا الجدول إلى قسمين حيث كل منهما حجمه $n = 8$ ، ارسم مخطط الانتشار لكل منهما. ماذا تلاحظ؟

(هـ) أوجد مُعامل الارتباط r لكل من الجدولين.

(و) أوجد معادلة خط الانحدار، ثم قَدِّر في أول معادلة قيمة v عند $s = 3$ ، وأوجد مقدار الخطأ.

(ز) أوجد مقدار الخطأ في الجدول الثاني عند $s = 6$.

(٨) إذا كانت معادلة خط الانحدار للمتغيرين s ، v هي $v = 0,5s + 3,4$ فإن قيمة v المتوقعة عندما $s = 6$ هي:

- (١) $0,5$
- (ب) $6,8$
- (ج) $29,98$
- (د) $25,9$

(٩) إذا كان مُعامل الارتباط بين متغيرين $r = 0,85$ فإن الارتباط يكون:

- (١) طردي قوي
- (ب) طردي ضعيف
- (ج) طردي متوسط
- (د) طردي تام

(١٠) إذا كانت معادلة خط الانحدار للمتغيرين s ، v هي $v = 1 + 1,4s$ فإن مقدار الخطأ عند $s = 5$ علمًا بأن القيمة الجدولية هي $v = 9$ يساوي:

- (١) -1
- (ب) 1
- (ج) 17
- (د) 8

(١١) الشكل المقابل يمثل علاقة بين متغيرين s ، v من نوع هذه العلاقة هو:

- (١) علاقة خطية طردية
- (ب) علاقة خطية عكسية
- (ج) علاقة غير خطية
- (د) ليس أي مما سبق


(١٢) من الجدول التالي:

س	١	٢	٣	٤	٥	٦	٧	٨
ص	٢٣	١٨	١٧	١٤	١٠	٦	٥	١

فإذا كانت معادلة خط الانحدار هي $v = -3,0s + 20,5$ ، فإن مقدار الخطأ عندما $s = 5$ يساوي:

- (١) $-2,5$
- (ب) $-0,25$
- (ج) $20,25$
- (د) $10,25$

(١٣) الشكل الذي يمثل ارتباط عكسي قوي بين متغيرين s ، v هو:



(١٤) قيمة مُعامل الارتباط لا يمكن أن تساوي:

- (١) صفر
- (ب) 1
- (ج) $-0,5$
- (د) $1,5$

(١٥) إذا كان مُعامل الارتباط بين المتغيرين s ، v يساوي صفر فإن الارتباط يكون:

- (١) قوي
- (ب) ضعيف
- (ج) منعدم
- (د) تام

(٤) قرر صاحب أحد متاجر الأجهزة الكهربائية إقامة تجربة لمدة خمسة أشهر لمعرفة مدى تأثير الإنفاق الإعلاني على حجم المبيعات فكانت النتائج كما في الجدول التالي:

الأشهر	١	٢	٣	٤	٥
الإنفاق الإعلاني (س) بالآلاف الدنانير لكل شهر	١	٢	٣	٤	٥
حجم المبيعات (ص) بعشرات آلاف الدنانير لكل شهر	١	٢	٢	٢	٤

(١) أوجد معادلة خط الانحدار.

(ب) أتفق صاحب المتجر في أحد الأشهر ٥٠٠ دينار على الإعلانات، فما حجم مبيعاته المتوقعة في هذا الشهر؟

(٥) أوجد مُعامل الارتباط r وحدّد نوعه وقوته، للمتغيرين s ، v حيث:

س	٤	٥	٦	٧	٨
ص	٨	٥	٦	١٠	١٤

(٦) أوجد مُعامل الارتباط r وحدّد نوعه وقوته، للمتغيرين s ، v حيث:

س	٤	٥	٦	٧	٨
ص	٣	٤	٥	٦	٧

(٧) أوجد مُعامل الارتباط r وحدّد نوعه وقوته، للمتغيرين s ، v حيث:

س	٤	٥	٦	٧	٨
ص	٧	٦	٩	١١	١٢

(٨) أوجد مُعامل الارتباط r وحدّد نوعه وقوته، للمتغيرين s ، v حيث:

س	٤	٥	٦	٧	٨
ص	٢	٣	٤	٥	٦

Time Series

الوحدة الثالثة: السلاسل الزمنية

(١-٣) السلسلة الزمنية

(٢-٣) عناصر السلسلة الزمنية

(٣-٣) تحليل السلاسل الزمنية

معادلة الاتجاه العام للسلسلة الزمنية.

مقدمة الوحدة

الوحدة الثالثة

السلاسل الزمنية Time Series

مشروع الوحدة: المياه واستهلاكها

- 1 مقدمة المشروع: تعتبر المياه وطريقة استهلاكها من أهم المشاكل في دولة الكويت وأكثرها تعقيداً، نظراً لمحدودية مواردها والمصادر المتجددة، ونظراً لارتفاع معدلات استهلاكها مع مرور الوقت.
- 2 الهدف: تحديد مصادر المياه ومحاولة توقع الكميات المطلوبة خلال الـ ٢٠ سنة القادمة بناء على عدة عوامل.
- 3 اللوازم: شبكة الإنترنت، ورق رسم بياني، حاسوب.
- 4 أسئلة حول التطبيق:
 - 1 كيف كانت تؤمن دولة الكويت حاجتها من المياه قبل تدفق عائدات النفط؟
 - 2 ما كلفة إنتاج المياه العذبة المقطرة المحلاة؟ قارنها بكلفة الإنتاج في السنوات الماضية أي منذ ستينيات القرن الماضي. ارسم المخطط التكراري لكلفة تحلية المتر المكعب الواحد خلال الخمسين سنة الماضية آخذين بالاعتبار معدل الكلفة كل ٥ سنوات.
 - 3 ما المعدل اليومي لاستهلاك الفرد من المياه خلال الخمسين سنة الماضية. ارسم مخططاً تكرارياً يحدد معدل الاستهلاك مع مرور الوقت آخذين بالاعتبار معدل الاستهلاك اليومي للفرد كل ٥ سنوات.
 - 4 قارن معدلات الاستهلاك بين عدة بلدان كقطر، والسعودية، وسلطنة عُمان في الفترات الزمنية ذاتها.
 - 5 ما معدل الزيادة السكانية في الكويت؟ وما تأثيره في السنوات القادمة على كمية المياه المستهلكة؟
 - 6 التقرير: قَدِّم تقريراً مفصلاً عن هذا المشروع محاولاً توقع كميات الاستهلاك المطلوبة خلال الـ ٢٠ سنة القادمة، ومحددًا الموارد والمصادر التي يمكن اعتمادها لتأمين الحاجات مراعيًا الزيادة السكانية ليكون التقرير أكثر دقة وموضوعية.

دروس الوحدة

١-٣ السلسلة الزمنية	٢-٣ عناصر السلسلة الزمنية	٣-٣ تحليل السلاسل الزمنية
		معادلة الاتجاه العام للسلسلة الزمنية


٦٤

السلاسل الزمنية هي عبارة عن مجموعة من الملاحظات تم تسجيلها بحسب تسلسلها الزمني.

مثال على ذلك:

- عدد الوفيات اليومية.
- قياس جسيمات التلوث في الهواء.
- بيانات درجات الحرارة.

يوضح الرسم التالي هذه البيانات لإحدى المدن الصناعية الكبرى بين عام ١٩٨٧ و عام ١٩٩٤:



نمثل قياسات السلاسل الزمنية بالمتغيرات التالية:

س_١، ...، س_ن حيث ن يساوي العدد الإجمالي للقياسات. في حين أن معظم المسائل الإحصائية تعني بخصائص تقدير مجتمع إحصائي ما من خلال عينة، ففي تحليل السلاسل الزمنية يختلف الوضع بالرغم من إمكانية تغيير حجم العينة التي يتم دراستها.

عادة ما يكون من المستحيل إجراء ملاحظات متعددة في الوقت نفسه (على سبيل المثال، لا يمكن للمرء مراقبة وفيات يوم ما أكثر من مرة واحدة) مما يجعل من الإجراءات الإحصائية التقليدية المستندة على تقديرات عينة كبيرة غير مناسبة.

أما السكون فهو افتراض مناسب يسمح لنا بوصف الخصائص الإحصائية للسلاسل الزمنية.

مشروع الوحدة

أوجه استخدام المياه كثيرة ومتنوعة، كالأستخدامات الزراعية، المنزلية، الصناعية.


وقد أثرت هذه الأستخدامات في تغيير الأنظمة الإيكولوجية المحيطة مثل الصرف الصحي، وتحويل المياه للري، والأستخدامات الصناعية والمنزلية مما زاد من تلوث المياه وذلك نتيجة الأسمدة الزراعية، والنفايات الصناعية، وبناء السدود، إلخ...

إجابات «أسئلة حول التطبيق»

(أ) قد تتنوع الإجابات بين الطلاب.

(ب) قد تتنوع الإجابات بحسب المراجع التي اعتمدها الطلاب في بحثهم.

على سبيل المثال شكل المصنع التكراري لكلفة محلية المتر المكعب الواحد خلال الخمسين سنة الماضية آخذين الفترة الزمنية كل ٥ سنوات.



(ج) قد تتنوع الإجابات بين الطلاب كذلك بالنسبة إلى المصنع التكراري.

(د) قد تتنوع الإجابات بين الطلاب.

(هـ) قد تتنوع الإجابات بين الطلاب.

التقرير

اعرض تقريرك أمام زملائك في غرفة الصف، وناقش معهم النتائج التي توصلت إليها. إذا وجدت أنك كنت على خطأ في مكان ما فأعد صياغة تقريرك بما يتناسب مع أهداف المشروع.

الوحدة الثالثة

أين أنت الآن (المعارف السابقة المكتسبة)

- غطت الانتشار.
- الارتباط وتطبيقاته.
- تعاملات ارتباط بيرسون.
- الانحدار وتطبيقاته.
- التقدير بمعادلة الانحدار.

ماذا سوف تعلم؟

- السلسلة الزمنية.
- عناصر السلسلة الزمنية.
- تحليل السلاسل الزمنية.

المصطلحات الأساسية

السلسلة الزمنية - عناصر السلسلة الزمنية - المنحنى التاريخي للسلسلة الزمنية - الاتجاه العام - التغيرات الموسمية - التغيرات الدورية - التغيرات العرضية (الفتحية).

أضف إلى معلوماتك

تطور عمر الإنسان وزادت معدلاته، وذلك يعود إلى عدة عوامل أبرزها نوعية التغذية والرعاية الطبية، بحيث كان معدل عمر الإنسان عام ١٩٠٠ في الولايات المتحدة الأمريكية حوالي ٤٧,٣ سنة ليصبح عام ٢٠٠٧ ٧٧,٩ سنة.

أما بالنسبة إلى الدول التي تعتبر فيها معدلات عمر الإنسان الأعلى في العالم، فتحتل اليابان في المركز الثاني حيث إن معدل العمر فيها هو ٨٢ سنة، ودولة أندورا، التي تقع في جبال الپيرينيه بين فرنسا وإسبانيا، تحتل في المركز الأول حيث يبلغ عدد سكانها ٧٢,٠٠٠ نسمة ومعدل أعمار أبنائها ٨٣,٥ سنة. وبالتالي، فإن معدل عمر الإنسان في ارتفاع دائم مع مرور الزمن.

سلم التقييم

٤	العرض في المشروع بكامله واضح - جداول البيانات واضحة ومتناسكة بحيث تخلو من الأخطاء - الرسوم البيانية دقيقة وصحيحة - التقرير مفصل ومنظم ويعكس دقة وجهداً في العمل.
٣	معظم العرض في المشروع واضح - بعض الأخطاء في جداول البيانات - أخطاء طفيفة في الرسوم البيانية - التقرير مفصل ومنظم إنما ينقصه بعض التفاصيل الصغيرة.
٢	بعض العروض في المشروع واضحة - أخطاء متكررة في جداول البيانات وفي الرسوم البيانية - التقرير غير مفصل ويفتقر إلى التنظيم.
١	معظم عناصر هذا المشروع ناقصة وبحاجة إلى إعادة.

٣-١: السلسلة الزمنية

١ الأهداف

- يتعرف السلسلة الزمنية.
- يرسم المنحنى التاريخي للسلسلة الزمنية.

٢ المفردات والمفاهيم الجديدة

السلسلة الزمنية - المنحنى التاريخي للسلسلة الزمنية.

٣ الأدوات والوسائل

حاسوب - جهاز إسقاط (Data Show).

٤ التمهيدي

اطلب إلى الطلاب رسم مخطط الانتشار للبيانات التالية:

س	٢٠٠١	٢٠٠٢	٢٠٠٣	٢٠٠٤	٢٠٠٥	٢٠٠٦
ص	١,١	١,٥	٢	٢,٢	٢,٣	٢,٨

اطلب إليهم ربط النقاط ببعضها بعضاً.

٥ التدريس

السلسلة الزمنية هي متتالية منتهية لمعطيات بدلالة الزمن (دقيقة، ساعة، أيام...).

المنحنى التاريخي للسلسلة الزمنية هو الرسم البياني على مخطط الانتشار للبيانات في الجدول مع ربط النقاط ببعضها بعضاً.

في المثال (١)

تطبيق مباشر للسلاسل الزمنية. لاحظ تزايد متوسط العمر مع الزمن.

في المثال (٢)

يشكل مثالاً لسلسلة زمنية في تناقص مع الزمن.

٦ الربط

المثالان (١) و(٢) هما من المجالات الحياتية حيث تستخدم السلسلة الزمنية.

السلسلة الزمنية

Time Series



دعنا نفكر ونتناقش

تعلمت سابقاً كيف ترسم مخطط الانتشار لمتغيرين وكيفية إيجاد نوع العلاقة بينهما. في الجدول التالي:

س تمثل السنوات ، ص تمثل معدل النمو

س	٢٠٠١	٢٠٠٢	٢٠٠٣	٢٠٠٤	٢٠٠٥	٢٠٠٦
ص	٢,١	٢,٢	٢,٣	٢,٤	٢,٥	٢,٦

١ مثل البيانات بالمخطط المنكسر.

٢ كيف كان معدل النمو بين سنة ٢٠٠٠ وسنة ٢٠٠٦ وبعد سنة ٢٠٠٦؟

٣ ما نوع العلاقة بين الزمن ومعدل النمو في هذه الفترات (ثابتة، متناقصة، متزايدة)؟

سبق لنا أن درسنا في الوحدة السابقة العلاقة بين ظاهرتين (متغيرين) من خلال موضوع الارتباط وفي هذه الوحدة سنتعرض لحالة خاصة من الارتباط يثبت قيم إحدى الظاهرتين (المتغيرين) وهو الزمن باعتبارها المتغير المستقل ودراسة قيم الظاهرة الأخرى عبر الزمن وهو ما يسمى بالسلسلة الزمنية.

تعريف: السلسلة الزمنية

هي مجموعة القيم التي تأخذها ظاهرة ما في فترات زمنية غالباً ما تكون متساوية ومتعاقبة.

أي أنها علاقة تربط بين متغيرين أحدهما هو قيم الظاهرة المطلوب دراستها والآخر هو الزمن. أي أننا نتتبع سلوك الظاهرة في أزمنة متعاقبة (سنة - نصف سنة - ربع سنة - شهر - يوم...) ويسمى التتبع لقيم الظاهرة خلال هذه الأزمنة بالسلسلة الزمنية.

السلسلة الزمنية تحتوي على متغيرين أحدهما هو الزمن (المتغير المستقل) وسوف نرسم له بالرمز (س)، والآخر هو قيمة الظاهرة (المتغير التابع) وسنرمز له بالرمز (ص).

وتقاس قيم هذه الظواهر بنفس الوحدات ونفس طريقة القياس حتى يمكن المقارنة بين قيم الظاهرة خلال فترة الدراسة. وبعض السلاسل الزمنية تكون تصاعدياً بصورة مطردة، وفي هذا النوع تزداد قيم الظاهرة محل الدراسة بمرور الزمن مثل إنتاج تحلية المياه في دولة الكويت، وبعض السلاسل الزمنية تكون تنازلية حيث تكون قيم مشاهداتها تتناقص بمرور الزمن مثل عدد الإصابات بشلل الأطفال في السنوات الأخيرة، والبعض الآخر من السلاسل الزمنية لا تخضع لنظام ثابت فهي متذبذبة بين التصاعدي والتنازلي وتكون قيم الظاهرة موزعة بين الصعود والتحول مثل إنتاج المشروبات الغازية على مدار السنة.

١٦

تمرين

١-٣

السلسلة الزمنية

Time Series

المجموعة ١ تمارين أساسية

(١) يبين الجدول التالي متغيرين، الزمن بالأسابيع (س) وعدد الطلاب الذين تغيروا عن المدرسة بداعي العرض (ص).

الزمن (س)	١	٢	٣	٤	٥	٦	٧	٨
عدد الطلاب (ص)	١	١	٣	٣	١	٢	٢	٨

(أ) مثل البيانات أعلاه بالسلسلة الزمنية.

(ب) بين الاتجاه العام للسلسلة الزمنية.

(٢) يبين الجدول التالي النسبة المئوية للعاطلين عن العمل من سنة ١٩٩٧ حتى سنة ٢٠٠٤

الزمن (س)	١٩٩٧	١٩٩٨	١٩٩٩	٢٠٠٠	٢٠٠١	٢٠٠٢	٢٠٠٣	٢٠٠٤
النسبة المئوية للعاطلين عن العمل (ص)	٠,٦	٠,٦	٠,٦٥	٠,٧	٠,٧	٠,٨	٠,٨	٠,٩

(أ) مثل البيانات أعلاه بالسلسلة الزمنية.

(ب) بين الاتجاه العام للسلسلة الزمنية معلاً إيجابتك.

(٣) يبين الجدول التالي مساحة الأراضي الصالحة للزراعة بالآلاف الأقدمن من سنة ١٩٩٨ حتى سنة ٢٠٠٥

الزمن (س)	١٩٩٨	١٩٩٩	٢٠٠٠	٢٠٠١	٢٠٠٢	٢٠٠٣	٢٠٠٤	٢٠٠٥
مساحة الأرض (ص)	٦	٧	١٠	١٣	١٥	١٥	١٥	١٥

(أ) مثل البيانات أعلاه بالسلسلة الزمنية.

(ب) بين الاتجاه العام للسلسلة الزمنية معلاً إيجابتك.

٣٠

٧ أخطاء متوقّعة ومعالجتها

من المهم لفت انتباه الطلاب إلى أن الزمن يتمثل على محور السينات وإعطائهم جدولاً أو اثنين مع س تمثل زمن ما ليتقنوا رسم المنحنى التاريخي.

٨ التقييم

تابع الطلاب وهم يجلون فقرات «حاول أن تحل» وأعطهم الوقت اللازم لذلك.

سوف يتم تمثيل السلسلة الزمنية بيانياً بخط منكمس ويسمى بالمنحنى التاريخي للسلسلة الزمنية، حيث يتم تمثيل الزمن على المحور الأفقي والظاهرة على المحور الرأسي.

مثال (١)

يبين الجدول التالي متوسط العمر (ص) في إحدى الدول خلال السنوات (س) من سنة ٢٠٠٤ إلى سنة ٢٠١١.


الزمن (س)	٢٠٠٤	٢٠٠٥	٢٠٠٦	٢٠٠٧	٢٠٠٨	٢٠٠٩	٢٠١٠	٢٠١١
العمر (ص)	٧٤	٧٤	٧٥	٧٥	٧٥	٧٦	٧٦	٧٧

١ مثل بيانياً السلسلة الزمنية للبيانات الموجودة في الجدول أعلاه.

٢ ما نوع العلاقة بين متوسط العمر والزمن؟

الحل:

١ مثل الزمن على المحور الأفقي، ومتوسط العمر على المحور الرأسي.



٢ نلاحظ أن متوسط العمر في تزايد مع الزمن.

حاول أن تحل

١ في الجدول التالي متغيرين: الزمن (س) بالسنوات، وعدد الولادات (ص) بالآلاف.

الزمن (س)	٢٠٠٠	٢٠٠١	٢٠٠٢	٢٠٠٣	٢٠٠٤	٢٠٠٥	٢٠٠٦	٢٠٠٧	٢٠٠٨
عدد الولادات بالآلاف (ص)	٤٢	٤٢	٤٣	٤٥	٤٧	٥١	٥٣	٥٥	٥٥


١ مثل بيانياً السلسلة الزمنية للبيانات الموجودة في الجدول أعلاه.

٢ ما نوع العلاقة بين عدد الولادات والزمن؟

اختبار سريع


مثل البيانات أدناه بالسلسلة الزمنية، ثم بين اتجاهها العام.

س	١	٢	٣	٤	٥	٦
ص	١٠,٢	١١	١٠,٨	١٤	١٥	١١



السلسلة الزمنية تبين تغيراً عرضياً.

(أ)




(ب) كان ثابتاً بين سنة ٢٠٠٠ وسنة ٢٠٠٦ وأصبح يتناقص بعد سنة ٢٠٠٦ .

(ج) هي علاقة خطية ثابتة من ٢٠٠٠ إلى ٢٠٠٦ ومتناقصة من ٢٠٠٦ وما بعد.

«حاول أن تحل»

(أ) ١



(ب) نلاحظ أن عدد الولادات يتزايد مع الزمن.

(أ) ٢



(ب) يتناقص عدد الأميين مع الزمن.

(مثال ٢)

يبين الجدول التالي عدد الإصابات بشلل الأطفال (ص) بالآلاف في إحدى الدول خلال السنوات (س) من سنة ١٩٦٠ إلى سنة ١٩٦٧


الزمن (س)	١٩٦٠	١٩٦١	١٩٦٢	١٩٦٣	١٩٦٤	١٩٦٥	١٩٦٦	١٩٦٧
عدد الإصابات (بالآلاف)	١٧	١٤	١٢	١٠	٧	٥	٣	٣

١ مثل بيانياً السلسلة الزمنية للبيانات الموجودة في الجدول أعلاه.



٢ ما نوع العلاقة بين عدد الإصابات بشلل الأطفال والزمن؟

الحل:



٣ نلاحظ أن عدد الإصابات بشلل الأطفال في تناقص مع الزمن.

حاول أن تحل

٤ تهتم الدول بتنمية شعوبها من خلال القضاء على الأمية باستخدام الحاسوب وذلك بإعداد برامج بهذا الخصوص، والجدول التالي يوضح عدد الأميين بالمتات في محافظة ما من خلال الفترات الزمنية الموضحة:

الزمن (س)	٢٠٠٢	٢٠٠٣	٢٠٠٤	٢٠٠٥	٢٠٠٦	٢٠٠٧	٢٠٠٨	٢٠٠٩	٢٠١٠
عدد الأميين بالمتات (ص)	٣١	٢٧	٢٥	٢٥	٢٤	٢٥	٢٣	٢١	١٩

١ مثل بيانياً السلسلة الزمنية للبيانات الموجودة في الجدول أعلاه.

٢ ما نوع العلاقة بين عدد الأميين في استخدام الحاسوب والزمن؟

المجموعة ب تمارين تعزيزية

(١) يبين الجدول التالي تطوّر عدد سكان دولة ما بالملايين كل ٥ سنوات، من سنة ١٩٧٥ حتى سنة ٢٠١٠

الزمن (س)	١٩٧٥	١٩٨٠	١٩٨٥	١٩٩٠	١٩٩٥	٢٠٠٠	٢٠٠٥	٢٠١٠
تطوّر عدد السكان (ص)	١	١,٣٧	١,٧	٢,١	١,٧	٢,١٩	٢,٢٤	٢,٧٣

(أ) مثل البيانات أعلاه بالسلسلة الزمنية.

(ب) بين الاتجاه العام للسلسلة الزمنية. هل عدد السكان إلى تزايد أم إلى تناقص؟

(٢) يبين الجدول التالي متغيرين الزمن بالسنوات (س) واستهلاك الطاقة الكهربائية بالآلاف الكيلوواط/ساعة (ص) في إحدى الدول من سنة ٢٠٠٠ حتى ٢٠٠٨

الزمن (س)	٢٠٠٠	٢٠٠١	٢٠٠٢	٢٠٠٣	٢٠٠٤	٢٠٠٥	٢٠٠٦	٢٠٠٧	٢٠٠٨
كمية الاستهلاك (ص)	١٢	١٣,٥	١٤	١٦	١٧,٨	١٩	٢١,٥	٢٣	٢٥

(أ) مثل البيانات أعلاه بالسلسلة الزمنية.

(ب) بين الاتجاه العام للسلسلة الزمنية.

(٣) يبين الجدول التالي عدد التلاميذ المسجلين في مدرسة ابتدائية من سنة ١٩٩٩ حتى سنة ٢٠٠٥

الزمن (س)	١٩٩٩	٢٠٠٠	٢٠٠١	٢٠٠٢	٢٠٠٣	٢٠٠٤	٢٠٠٥
عدد التلاميذ (ص)	٣٥٠	٣٨٠	٤٢٠	٤٥٠	٥٠٠	٥٦٠	٦٠٠

(أ) مثل البيانات أعلاه بالسلسلة الزمنية.

(ب) بين الاتجاه العام للسلسلة الزمنية.

٢-٣: عناصر السلسلة الزمنية

١ الأهداف

- يتعرّف الاتجاه العام.
- يتعرّف التغيرات الموسمية.
- يتعرّف التغيرات الدورية.
- يتعرّف التغيرات العرضية (الفجائية).

٢ المفردات والمفاهيم الجديدة

الاتجاه العام - التغيرات الموسمية - التغيرات الدورية - التغيرات العرضية.

٣ الأدوات والوسائل

حاسوب - جهاز إسقاط (Data Show).

٤ التمهيدي

اطلب إلى الطلاب أن يرسموا المنحنى التاريخي للسلسلة الزمنية لكل من البيانات في الجدولين التاليين:

س	١	٢	٣	٤	٥	٦
ص	١٠	٩	١٨	١١	١٠	١١

س	١	٢	٣	٤	٥	٦	٧	٨
ص	١٠٠	١٠٥	٥٠	١١٠	١٠٨	١٠٠	٥٥	١٠٣

٥ التدريس

تعرفت في الدرس السابق السلسلة الزمنية. والآن سندرس الاتجاه العام للسلسلة الزمنية وأنواع التغيرات فيها. الاتجاه العام للسلسلة الزمنية هو الاتجاه الذي تأخذه السلسلة لحدث ما خلال فترة طويلة من الزمن.

أما التغيرات فهي ٣ أنواع:

- التغيرات الموسمية: تحصل تقريباً كل سنة خلال فترة زمنية معيّنة، تكثر الأمثلة عن هذه التغيرات، منها: أعداد السواح، درجة الحرارة.

٢-٣

عناصر السلسلة الزمنية

Time Series Elements

سوف نتعلم

- الاتجاه العام.
- التغيرات الموسمية.
- التغيرات الدورية.
- التغيرات العرضية.

دعنا نفكر ونتناقش

انظر إلى السلاسل الزمنية التالية:



١. قارن فيما بينها.
٢. اقترح أمثلة حياتية تتطابق مع السلسلة الزمنية في الشكل ١.
٣. أي سلسلة من السلاسل الزمنية الثلاث تبين تغيراً فجائياً؟

درسنا فيما سبق أن السلسلة الزمنية هي علاقة بين متغيرين أحدهما يسمى المتغير المستقل وهو الزمن (س)، والآخر يسمى المتغير التابع (ص)، ويوجد عدد من المؤثرات المشتركة في كل سلسلة زمنية ولكنها تؤثر بدرجات مختلفة من ظاهرة لأخرى طبقاً لطبيعة الظاهرة محل الدراسة. والهدف من الدراسة الإحصائية للسلسلة الزمنية هو اكتشاف التغيرات التي تطرأ على قيم الظاهرة من زيادة أو نقصان في زمن محدد وتسمى هذه التغيرات التي تؤثر على السلسلة الزمنية سواء كانت منتظمة أم منفردة بعناصر السلسلة الزمنية.

عناصر السلسلة الزمنية هي:

١. المؤثرات الاتجاهية (الاتجاه العام للسلسلة الزمنية).
٢. التغيرات الموسمية.
٣. التغيرات الدورية.
٤. التغيرات العرضية (الفجائية).

وستتناول هذه العناصر بشيء من التفصيل.

٦٩

تمرن

عناصر السلسلة الزمنية

Time Series Elements

المجموعة ١ تمارين أساسية

(١) في دراسة لمتوسط درجات الصف العاشر على مدى ٩ سنوات، قام مدير مدرسة بتسجيل متوسط الدرجات في الجدول التالي حيث النهاية العظمى ١٠ درجات.

الزمن (س)	٢٠٠٢	٢٠٠٣	٢٠٠٤	٢٠٠٥	٢٠٠٦	٢٠٠٧	٢٠٠٨	٢٠٠٩	٢٠١٠
متوسط الدرجات (ص)	٦	٧	٨	٨	٨,٥	٩	٨,٥	٨	٥

(أ) مقل بالخط المنكسر بيانات الجدول أعلاه.

(ب) ما نوع التغير الذي طرأ على درجات الطلاب؟

(٢) يبين الجدول التالي مبيعات أكياس الثلج في متجر ما خلال أشهر السنة.

الزمن (س)	١	٢	٣	٤	٥	٦	٧	٨	٩	١٠	١١	١٢
المبيعات (ص)	٢	٣	٢	٢	٣	٦	٩	٥	٥	٤	٣	٣

(أ) مقل بالخط المنكسر بيانات الجدول أعلاه.

(ب) برأيك، ما سبب التغير في الشهر السابق؟

(٣) يبين الجدول التالي عدد المرضى الذين تمّ استقبالهم في إحدى المستشفيات خلال فصول سنتي ٢٠١٠ و ٢٠١١.

الزمن (س)	٢٠١٠	٢٠١٠	٢٠١٠	٢٠١١	٢٠١١	٢٠١١	٢٠١١	٢٠١١
عدد المرضى (ص)	٢٠٠	٣٢٠	٢١٠	٣٣٠	٢١٠	٣١٠	٢٠٠	٣٤٠

(أ) مقل بالخط المنكسر بيانات الجدول أعلاه.

(ب) ما نوع التغير الذي طرأ في كل خريف وشتاء؟ علّل إجابتك.

٣٢

- التغيرات الدورية: هي تغيرات على فترات طويلة تمتد لأكثر من سنة؛ مثلاً: فترة كساد أو ركود الأسواق، حركة الكواكب،...

- التغيرات العرضية (الفجائية): هي التغيرات الفجائية في السلسلة الزمنية تعود إلى الصدفة البحتة: الزلازل، كوارث طبيعية، النزاعات والحروب.
- وستتعرف أيضاً في هذا الدرس التغيرات وكيفية تمييزها من خلال المنحنى التاريخي للسلسلة الزمنية.

في المثال (١)

نلاحظ عند رسم المنحنى التاريخي للسلسلة الزمنية تغيراً مفاجئاً تمثل بانخفاض كبير جداً للأرباح، وعند قراءة السنة نلاحظ أن السبب هو العدوان العراقي على الكويت سنة ١٩٩٠.

في المثال (٢)

نلاحظ التغير الدوري في المبيعات خلال الفترات الزمنية من ٤ أشهر. يبين الخط المنكسر تناقصاً في المبيعات خلال الأشهر من ٥ إلى ٨.

في المثال (٣)

كل فترة هي نصف سنة. كذلك نشهد تغيراً دورياً مع تزايد بطيء على مر الزمن.

٦ الربط

يبين المثالان (١)، (٢) كيف أن الأحداث الواقعية تتمثل في المنحنى التاريخي للسلسلة الزمنية.

٧ أخطاء متوقعة ومعالجتها


نبه الطلاب إلى عدم الخلط بين أنواع التغيرات، والانتباه دائماً إلى المدة الزمنية التي تحصل خلالها هذه التغيرات، إذا كانت أقل من سنة فتكون موسمية، وأكثر من سنة فتكون دورية، وإذا كانت غير متوقعة فتكون فجائية.

Secular Trend

١- الاتجاه العام للسلسلة الزمنية

الاتجاه العام للسلسلة الزمنية هو الاتجاه الذي تأخذه السلسلة الزمنية لحدث ما خلال فترة طويلة من الزمن.

هناك العديد من الأمثلة التي تبين ذلك منها: عدد سكان بلد ما، الفئات العمرية للمجتمع، ...



Seasonal Variations

٢- التغيرات الموسمية

هي التغيرات التي تتكرر بانتظام خلال فترات زمنية أقل من سنة كأن تكون نصف سنوية أو ربع سنوية أو شهرية أو أسبوعية أو ...

والأمثلة على ذلك متعددة منها سقوط الأمطار بشكل موسمي، وكذلك مبيعات المشروبات الغازية تزداد خلال فصل الصيف، واستهلاك الكهرباء والماء يزداد أيضاً في فصل الصيف، وزيادة حركة المواصلات وازدحام الطرق في فترتي الصباح والظهيرة من كل يوم، والشكل التالي يبين التغيرات الموسمية لأعداد السواح بالآلاف للعامين ٢٠٠٦ م، ٢٠٠٧ م على الترتيب.

(٤) يبين الجدول التالي عدد المصابين بحوادث السير والذين أدخلوا إلى أحد المستشفيات خلال فصول السنة الأربعة في السنوات ٢٠٠١، ٢٠٠٢، ٢٠٠٣.

السنة	٢٠٠١	٢٠٠٢	٢٠٠٣
الفصل	١ ٢ ٣ ٤	١ ٢ ٣ ٤	١ ٢ ٣ ٤
عدد المصابين	٢٧ ١٥ ١٧ ١٤	٢١ ١٣ ٢٦ ١٨	١٣ ١٠ ١٣ ٢٤

(١) مثل بيانياً على شكل منحنى بيانات الجدول أعلاه.

(ب) ما الذي تلاحظه بالنسبة إلى الاتجاه العام للسلسلة؟

(٥) سجلت إحدى الشركات العالمية المبالغ التي حصلت عليها (بملايين الدنانير) من بيع ألعاب على الحاسوب للسنوات من ٢٠٠٠ إلى ٢٠٠٥ خلال الفصول الأربعة.

السنة	الشتاء	الربيع	الصيف	الخريف
٢٠٠٠	٦,٧	٤,٦	١٠	١٢,٧
٢٠٠١	٦,٥	٤,٦	٩,٨	١٣,٦
٢٠٠٢	٦,٩	٥	١٠,٤	١٤,١
٢٠٠٣	٧	٥,٥	١٠,٨	١٥
٢٠٠٤	٧,١	٥,٧	١١,١	١٤,٥
٢٠٠٥	٨	٦,٢	١١,٤	١٤,٩

(١) مثل بيانياً على شكل منحنى بيانات الجدول أعلاه.

(ب) هل الاتجاه العام للسلسلة في تزايد؟

المجموعة ب تمارين تعزيزية


(١) يوضح الجدول التالي بيانات تطور طول الرجال في بلد معين. المتغيران هما الزمن (س) ووحدته ١٠ سنوات، والمتغير (ص) الطول بالسنتيمتر.

الزمن (س)	١٩٥٠	١٩٦٠	١٩٧٠	١٩٨٠	١٩٩٠	٢٠٠٠	٢٠١٠
الطول بالسنتيمتر (ص)	١٧٠	١٧١	١٧١,٩	١٧٣	١٧٥	١٧٥,٥	١٧٨

(١) مثل بالخط المنكسر بيانات الجدول أعلاه.

(ب) ما الاتجاه العام لطول الرجال في هذا البلد؟


تابع الطلاب وهم يجلون فقرات «حاول أن تحل» وأعطهم الوقت اللازم لذلك.



لاحظ أن الاتجاه العام للسلسلة الزمنية في نقصان.

٣- التغيرات الدورية Cyclic Variations

هي تغيرات للسلسلة الزمنية على فترات طويلة المدى نسبياً أكثر من سنة، وتختلف التغيرات الدورية عن التغيرات الموسمية في أن التغيرات الموسمية تحدث في فترات زمنية أقل من سنة، ويمكن اعتبار التغيرات الدورية تحركاً لفترة أقل طولاً من فترة الاتجاه العام، ومن الأمثلة المهمة للتغيرات الدورية ما يحدث لشركة ما من فترة رخاء اقتصادي، ثم فترة ركود اقتصادي، ثم فترة كساد، ثم انفراج من الأزمة الاقتصادية كما هو موضح في الشكل.




لاحظ أن الاتجاه العام للسلسلة في تزايد.

اختبار سريع

مثّل بيانياً على شكل خطّ منكسر بيانات كل من الجداول أدناه موضحاً طبيعة السلسلة الزمنية.

(أ)


س	٦	٧	٨	٩	١٠	١١
ص	٩	١٠	٩	١٧	١٢	٩



السلسلة تبين تغيراً عرضياً (فجائياً).

(ب)


س	١	٢	٣	٤	٥	٦	٧
ص	٤	٤	٥	٦	٦	٥	٤



السلسلة تبين تغيراً دورياً.

(ج)

س	١	٢	٣	٤	٥	٦	٧	٨
ص	٢	٥	١٣	٧	٢	٢	١٤	٥



السلسلة تبين تغيرات موسمية.

١ في السلسلة الزمنية (أ)، نلاحظ أن التغيرات تحصل

فقط خلال فصلي الربيع والصيف من كل سنة.

في السلسلة الزمنية (ب)، التغير يحصل على مدى

سنتين أو أكثر.

في السلسلة الزمنية (ج)، التغير يطرأ فقط على شهر

واحد ليعود بعد ذلك ويستقر.

٢ بعض الأمثلة:


- التغير في درجات الحرارة.

- عدد السواح في البلد.

- عدد الحجوزات الفندقية.

٤- التغيرات العرضية (الفجائية) Irregular Variations

تأثر كثير من الظواهر من وقت إلى آخر بعوامل مختلفة تعود إلى تغيرات غير متوقعة أو إلى أمور يصعب التنبؤ بها، فمثلاً في المحلات التجارية تختلف قيم المبيعات من يوم إلى آخر متأثرة بطبيعة الطقس أو وجود حفلات زواج وما إلى ذلك من تغيرات. كما أن التغيرات تحدث نتيجة عوامل مفاجئة كالخروب، والفيضانات، والأوبئة، والزلازل، والتغيرات من هذا النوع تعرف بالتغيرات العرضية أو الفجائية، ويمكن توضيح التغيرات العرضية أو الفجائية في المنحنى التاريخي للسلسلة الزمنية بالشكل التالي:



مثال (١)

يمثل الجدول التالي أرباح إحدى الشركات الكبرى بملايين الدنانير من سنة ١٩٨٥ إلى سنة ٢٠٠٠

السنة (س)	٢٠٠٠	١٩٩٩	١٩٩٨	١٩٩٧	١٩٩٦	١٩٩٥	١٩٩٤	١٩٩٣	١٩٩٢	١٩٩١	١٩٩٠	١٩٨٩	١٩٨٨	١٩٨٧	١٩٨٦	١٩٨٥
الربح بالملايين (ص)	١٧	١٦	١٥	١٦	١٥	١٣	١١	١٠	٩	٥	١	١٢	١١	١١	١٠	١١

١ مثل بيانياً على شكل خط منكسر بيانات الجدول أعلاه.

٢ ما نوع التغيرات التي طرأت على أرباح هذه الشركة؟ وما السبب الأبرز لهذه التغيرات؟

الحل:



(٢) يبين الجدول التالي متوسط سعر أسهم شركة ما من سنة ٢٠٠٦ حتى سنة ٢٠١٢

الزمن (س)	٢٠٠٦	٢٠٠٧	٢٠٠٨	٢٠٠٩	٢٠١٠	٢٠١١	٢٠١٢
متوسط السعر (ص)	٤١٠	٤٠٣	٢٠٠	٢٣٠	٢٦٠	٢٨٠	٢٧٠

(أ) مثل بالخط المنكسر بيانات الجدول أعلاه.

(ب) ما نوع التغير الذي طرأ في الرسم البياني؟

(٣) يمثل الجدول البياني التالي سعر كيلو الشاي بالدنير خلال مدة زمنية محددة بالأشهر.

الزمن (س)	١	٢	٣	٤	٥	٦
سعر الكيلو (ص)	١,٠١	١,٠٣	١,٠٤	٠,٩٩	٠,٩٥	٠,٩٥

(أ) مثل بالخط المنكسر بيانات الجدول أعلاه.

(ب) هل الاتجاه العام يظهر أن السعر إلى تزايد أم إلى تناقص؟

(٤) سجل صاحب إحدى المؤسسات الصغيرة عدد العمال المتغيين في السنوات ٢٠١١، ٢٠١٢، ٢٠١٣ خلال الفصول الأربعة.

السنة	٢٠١١				٢٠١٢				٢٠١٣			
الفصل	١	٢	٣	٤	١	٢	٣	٤	١	٢	٣	٤
عدد العمال المتغيين	٤	٧	٣	٥	١٢	٩	٤	٦	١٦	١٢	٤	٤

(أ) مثل بيانياً على شكل منحنى بيانات الجدول أعلاه.

(ب) ما الذي تلاحظه بالنسبة إلى الاتجاه العام للسلسلة؟

(٥) يبين الجدول مبيعات إحدى شركات الإلكترونيات (بملايين الدنانير) خلال فصول السنوات من ٢٠٠٢ إلى ٢٠٠٥.

السنة	٢٠٠٢				٢٠٠٣				٢٠٠٤				٢٠٠٥			
الفصل	١	٢	٣	٤	١	٢	٣	٤	١	٢	٣	٤	١	٢	٣	٤
مبيعات	٥,٣	٤,١	٦,٨	٦,٧	٤,٨	٣,٨	٥,٦	٦,٨	٤,٣	٣,٨	٥,٧	٦	٥,٦	٤,٦	٦,٤	٥,٩

(أ) مثل بيانياً على شكل منحنى بيانات الجدول أعلاه.

(ب) ما الذي تلاحظه بالنسبة إلى الاتجاه العام للسلسلة؟

٣ السلسلة الزمنية (ج) تبين تغيرًا فجائيًا.

«حاول أن تحل»

١ (أ)

١ لدينا تغير مفاجئ في سنة ١٩٩٠ يمثل بانخفاض جلدي للأرياح. السبب الأبرز هو العدوان العراقي على الكويت.

حاول أن تحل

٢ يبين الجدول التالي عدد المنتسبين إلى أحد الأندية الرياضية خلال أشهر سنة ٢٠٠٨

الأشهر (س)	١	٢	٣	٤	٥	٦	٧	٨	٩	١٠	١١	١٢
عدد المنتسبين (ص)	٣٠	٣٢	٤٠	٤١	٥٠	٥٠	٦٠	٧٠	٧٥	٧١	٦٠	٥٥

١ مثل بياناتك على شكل خط منكمسر بيانات الجدول أعلاه.

٢ ما الذي تلاحظه في الرسم البياني؟

٣ برأيك، ما سبب هذه التغيرات؟

مثال (٢)


١ يبين الجدول التالي عدد البسوت المباعة في أحد المجمعات التجارية خلال فترة زمنية من أربعة أشهر وعلى امتداد أربع سنوات.



السنوات	الفترة الأولى	الثانية	الثالثة
٢٠٠٢	١٥٠	٧٠	١٨٠
٢٠٠٣	١٦٥	٨٥	٢١٥
٢٠٠٤	٢٠٥	٩٥	٢٣٠
٢٠٠٥	٢٢٠	١١٠	٢٥٠

١ مثل بياناتك على شكل خط منكمسر بيانات الجدول أعلاه.

٢ ما الذي تلاحظه؟



(ب) نلاحظ أن عدد المنتسبين إلى ارتفاع من بداية السنة إلى

أن يبلغ القيمة القصوى في شهر ٩، ٧٥ منتسبًا، ثم

يتناقص في أشهر ١٠، ١١، ١٢.


(ج) في فصل الشتاء يكون عدد المنتسبين أقل من أشهر

الفصول الأخرى، لأن الناس يفضلون ممارسة

النشاطات الرياضية في القاعات المغطاة في أشهر الربيع

والصيف.

الحل:



١ تتكرر التغيرات بانتظام خلال الفترات الزمنية من ٤ أشهر. تزداد المبيعات في الفترتين الأولى والثالثة من كل سنة مع ازدياد خفيف خلال السنوات.

حاول أن تحل

٢ يبين الجدول التالي مبيعات إحدى المؤسسات التجارية (بالآلاف الدنانير) خلال كل فصل من فصول السنة الأربعة وعلى امتداد ثلاث سنوات.

السنة	الفصل الأول	الثاني	الثالث	الرابع
٢٠٠٣	٢٠٢	١٥٠	٥٠	١٠٠
٢٠٠٤	٢١٠	١٧٠	٦٠	١١٠
٢٠٠٥	٢٣٠	١٩٠	٧٥	١٣٠


١ مثل بياناتك على شكل خط منكمسر بيانات الجدول.

٢ ما الذي تلاحظه؟



(ب) تتكرر التغيرات بانتظام خلال الفترات الزمنية من ٣ أشهر.

تزداد المبيعات في الفترتين الأولى والرابعة وتتناقص في الفترتين الثانية والثالثة مع ازدياد خفيف خلال السنوات.



(ب) الاتجاه العام للسلسلة في تزايد وتناقص مما يشكل نوع من الذبذبة.

مثال (٣)


يبين الجدول التالي مبيعات إحدى الشركات (بمئات آلاف الدنانير) خلال فترة ثماني سنوات موزعة على كل نصف سنة كما في الجدول التالي:

نصف السنة	الصف الأول	الصف الثاني	الصف الثالث	الصف الرابع
٢٠٠٢-٢٠٠١	٥,٨	٥,١	٧,٠	٧,٥
٢٠٠٤-٢٠٠٣	٦,٨	٦,٢	٧,٨	٨,٤
٢٠٠٦-٢٠٠٥	٧,٠	٦,٦	٨,٥	٨,٨
٢٠٠٨-٢٠٠٧	٧,٣	٦,٩	٩,٠	٩,٤

١ ارسم بيانياً على شكل منحني بيانات الجدول أعلاه.

٢ ما الذي تلاحظه بالنسبة إلى الاتجاه العام للسلسلة؟

الحل:



٣ الاتجاه العام للسلسلة في تزايد.

حاول أن تحل

٢٠ يبين الجدول التالي المسافات التي يركضها (بعضرات الأمتار) أحد لاعبي كرة القدم خلال ١٤ دقيقة.

الزمن	١	٢	٣	٤	٥	٦	٧	٨	٩	١٠	١١	١٢	١٣	١٤
المسافة (بعضرات الأمتار)	١٥	٧	٩	٨	٢	١٤	٦	٢	٨	١٥	٧	٨	٢	١٤

١ ارسم بيانياً على شكل منحني بيانات الجدول أعلاه.

٢ ما الذي تلاحظه بالنسبة إلى الاتجاه العام للسلسلة؟

٣-٣: تحليل السلاسل الزمنية

١ الأهداف

- يتعرّف معادلة الاتجاه العام للسلسلة الزمنية.
- يحسب مقدار الخطأ.

٢ المفردات والمفاهيم الجديدة

معادلة الاتجاه العام للسلسلة الزمنية.

٣ الأدوات والوسائل

حاسوب - جهاز إسقاط (Data Show).

٤ التمهيد

اطلب إلى الطلاب أن يمثّلوا البيانات على شكل خط منكمسر، وأن يحسبوا معادلة الانحدار الخطي بعد التأكد من أن العلاقة بين المتغيرين خطية.

س	٧	٦	٥	٤	٣	٢	١	٠
ص	٣٠	٢٩	٢٨	٣٠	٣٨	٢٤	٢٣	٢٢

٥ التدريس

معادلة الاتجاه العام للسلسلة الزمنية، هي نفسها معادلة الانحدار الخطي مع فرق بسيط أن المتغير س يتمثل بالزمن. نحول أولاً المتغير س، باعتبار أن الفترة الأولى تأخذ القيمة س = صفر، الفترة الثانية س = ١، وهكذا دواليك. ثم نطبق الخطوات نفسها التي استخدمناها عند حساب معادلة الانحدار الخطي: $\hat{ص} = ب + س$ مع

$$ب = \frac{ن(صس) - (صس)(صس)}{ن(صس) - (صس)^2}$$

$$ب = \bar{ص} - \bar{س} \text{ حيث أن:}$$

$$\bar{س} = \frac{صس}{ن}, \bar{ص} = \frac{صص}{ن}$$

تحليل السلاسل الزمنية Analysing Time Series

دعنا نفكر ونتناقش

أخذت أوزان عشرة أطفال عند الولادة في أحد المستشفيات الغربية بهدف دراسة العلاقة بين وزن الطفل عند الولادة وعدد السجائر التي تدخنها الأم يومياً خلال أول شهرين من فترة الحمل.

عدد السجائر في اليوم (س)	٢	٣	٦	١١	٧	٩	٨	٥	١٠	١٥
الوزن بالجرام (ص)	٢٥٣٧	٢٢١٠	٢٢١٤	٢١٤٥	٢٠٣١	١٨٥٧	١٧١٢	١٧٠١	١٥٠٠	١٤٤٧

١ هل يوجد علاقة بين المتغيرين س، ص؟

(إرشاد: أوجد مُعامل الارتباط (r)).

➡ أوجد معادلة خط الانحدار.

➤ إذا كان وزن الطفل عند الولادة ١٩٥٠ جراماً،

فما تقريباً عدد السجائر التي تدخنها الأم يومياً؟

معادلة الاتجاه العام للسلسلة الزمنية Equation of Time Series

الاتجاه العام للسلسلة الزمنية هو أهم عنصر من عناصر السلسلة، لأنه يساعد الباحثين وفوي الاختصاص على تقدير أو توقع قيمة مستقبلية لزمين قادم.

تعلّمنا سابقاً كيفية إيجاد معادلة خط الانحدار.

وفي هذا الدرس، سوف نستخدم الطريقة ذاتها لإيجاد معادلة الاتجاه العام للسلسلة الزمنية مع فرق بسيط وهو استخدام المتغير (س) لتمثيل الزمن، يفرض أن العلاقة بين الزمن (س) وقيم الظاهرة (ص) هي علاقة خطية.

سوف تتعلم

- معادلة الاتجاه العام للسلسلة الزمنية.
- حساب مقدار الخطأ

تَمَرَّنْ
٣-٣

تحليل السلاسل الزمنية Analysing Time Series

المجموعة ١ تمارين أساسية

(١) يوضّح الجدول التالي متغيرين: (س) هو الزمن بالسنوات و(ص) معدل دخل الفرد السنوي بالآلاف الدنانير.

الزمن بالسنوات (س)	٢٠٠٦	٢٠٠٧	٢٠٠٨	٢٠٠٩	٢٠١٠	٢٠١١
معدل دخل الفرد السنوي (ص)	١٣	١٣,٥	١٠	٩	١٠	١١

(أ) أوجد معادلة الاتجاه العام لمعدل دخل الفرد السنوي.

(ب) قُدّر قيمة ص سنة ٢٠١٦.

(ج) احسب مقدار الخطأ لقيمة ص سنة ٢٠٠٩ وسنة ٢٠١٠.

(٢) يبيّن الجدول التالي مستوى السكر في الدم (ص) لشخص ما في أعمار مختلفة (س).

العمر (س)	٣٥	٤٠	٤٥	٥٠	٥٥	٦٠
مستوى السكر في الدم (ص)	٥	٦	٧	٨	١٠	١٢

(أ) أوجد معادلة الاتجاه العام لمستوى السكر في الدم.

(ب) قُدّر مستوى السكر الموجود في الدم إذا كان عمر الشخص ٧٠ عامًا.

(ج) احسب مقدار الخطأ عند س = ٤٥.

(٣) يبيّن الجدول التالي تطوّر عدد العمال في إحدى المؤسسات خلال السنوات من ٢٠٠٠ إلى ٢٠٠٥.

السنة	٢٠٠٠	٢٠٠١	٢٠٠٢	٢٠٠٣	٢٠٠٤	٢٠٠٥
عدد العمال	٤٥	٥١	٥٥	٦٢	٧٠	٧٣

(أ) أوجد معادلة الاتجاه العام لعدد العمال في المؤسسة.

(ب) قُدّر عدد العمال عام ٢٠٠٨.

(ج) احسب مقدار الخطأ سنة ٢٠٠٤.

عند إيجاد المعادلة كاملة، يمكن التقدير بقيم مستقبلية على
الآ تكون بعيدة جداً عن طرفي فترة الزمن.

مقدار الخطأ =

|القيمة الجدولية - القيمة التي تحقق معادلة الاتجاه
العام للسلسلة الزمنية|

ونعبر عنه بـ: |ص_س - ص_س|

في المثال (١)

يبيّن الجدول عدد الخبراء الأجانب في دولة ما من سنة
٢٠٠٧ حتى سنة ٢٠١٤.

لإيجاد معادلة الاتجاه العام للسلسلة الزمنية، نبدأ بتحويل
الزمن: ٢٠٠٧ إلى صفر، ٢٠٠٨ إلى ١، وهكذا دواليك.

الجدول في الإجابة هو طريقة لتنظيم العمل وتسهيل
الحسابات.

في (ب)، سنة ٢٠١٧ هي عملياً س = ١٠، لذا ففي المعادلة
نعوض س بـ ١٠ ونحسب عدد العمال المتوقع سنة ٢٠١٧.

في المثالين (٢)، (٣)

تطبيق مباشر لإيجاد معادلة الاتجاه العام وتقدير قيم
مستقبلية وحساب مقدار الخطأ.

الخطوات المتبعة لإيجاد معادلة الاتجاه العام للسلسلة الزمنية

١ نفرض قيم الزمن (س) باعتباره الفترة الأولى (سنة الأساس) ونعبر عنه بالعدد صفر، الفترة
الثانية بالعدد ١، ثم الفترة الثالثة بالعدد ٢، وهكذا ...

٢ نعين قيم الثوابت ب، ب كما سبق شرحه حيث:

$$ب = \frac{ن(ن-١)(ص) - (ن-١)(ص)س}{ن(ن-١) - (ن-١)س}$$

$$ب = \frac{ص - ب(ن-١)س}{ن}$$

٣ معادلة الاتجاه العام تكتب على الشكل التالي: ص_س = ب + ب س

٤ يمكننا التنبؤ بقيمة ص إذا علمت قيمة س.

٥ نحسب مقدار الخطأ:

مقدار الخطأ = |القيمة الجدولية - القيمة التي تحقق معادلة الاتجاه العام للسلسلة الزمنية|
ونعبر عنه بـ: |ص_س - ص_س|.

مثال (١)

يبيّن الجدول التالي عدد الخبراء الأجانب بالآلاف في دولة ما، من سنة ٢٠٠٧ حتى سنة ٢٠١٤

السنوات (س)	٢٠٠٧	٢٠٠٨	٢٠٠٩	٢٠١٠	٢٠١١	٢٠١٢	٢٠١٣	٢٠١٤
عدد الخبراء بالآلاف (ص)	٠,٥	٠,٧	٠,٨٣	١,٢	١,٥	١,٨	١,٨	١,٣

١ أوجد معادلة الاتجاه العام لعدد الخبراء الأجانب في الفترة المذكورة أعلاه.

٢ قدر كم سيصبح عدد الخبراء سنة ٢٠١٧

٣ احسب مقدار الخطأ في عدد الخبراء سنة ٢٠١٢

الحل:

١ نعتبر سنة ٢٠٠٧ هي السنة الأساس ونعبر عنها بالعدد صفر، وسنة ٢٠٠٨ بالعدد ١

وهكذا دواليك حتى سنة ٢٠١٤ فنعتبر عنها بالعدد ٧

السنوات	س	ص	س ص	س ^٢
٢٠٠٧	٠	٠,٥	٠	٠
٢٠٠٨	١	٠,٧	٠,٧	١
٢٠٠٩	٢	٠,٨٣	١,٦٦	٤
٢٠١٠	٣	١,٢	٣,٦	٩
٢٠١١	٤	١,٥	٦	١٦
٢٠١٢	٥	١,٨	٩	٢٥
٢٠١٣	٦	١,٣	٧,٨	٣٦
٢٠١٤	٧	١	٧	٤٩
المجموع	٢٨ = ن	٨,٨٣ = ص	٣٥,٧٦ = س ص	١٤٠ = س ^٢

$$ب = \frac{ن(ن-١)(ص) - (ن-١)(ص)س}{ن(ن-١) - (ن-١)س}$$

$$ب = \frac{(٨,٨٣)(٢٨) - (٣٥,٧٦)٨}{٧٨٤ - (١٤٠)٨}$$

$$ب = ٠,١١٥٦$$

$$ب = ص - ب(ن-١)س$$

$$ص = \frac{ص - ب(ن-١)س}{ن} = \frac{٠,١١٥٦ - ١,١٠٣٨}{٧} = ٣,٥$$

$$ب = ٠,١١٥٦ - ١,١٠٣٨ = ٣,٥ \times ٠,١١٥٦ - ١,١٠٣٨ = ٠,٦٩٩٢$$

∴ معادلة الاتجاه العام هي:

$$ص_س = ب + ب س$$

$$ص_س = ٠,٦٩٩٢ + ٠,١١٥٦ س$$

٢ نريد تقدير عدد الخبراء الأجانب سنة ٢٠١٧، أي عند س = ١٠

$$ص_س = ٠,٦٩٩٢ + ٠,١١٥٦ \times ١٠ = ١,٨٥٥٢$$

$$ص_س = ١,٨٥٥٢$$

تقدير سنة ٢٠١٧ هو ١٨٥٥ خبيراً (أجانباً) (١٨٥٥,٢ = ١٠٠٠ \times ١,٨٥٥٢)

٦ الربط

توضّح الأمثلة (١)، (٢)، (٣) أهمية معادلة الاتجاه العام للسلسلة الزمنية في حياتنا اليومية.

٧ أخطاء متوقعة ومعالجتها

خطأ شائع جداً، غالباً ما يرتكبه الطلاب لذا يجب تبيئهم إلى ضرورة البدء بصفر عند تحويل المتغير الذي يمثل الزمن. ثم اسألهم: إذا كانت سنة ١٩٩٩ هي س = صفر، فأى سنة يعبر عنها بـ س = ١١، س = ٥.

٨ التقييم

تابع الطلاب وهم يحلون فقرات «حاول أن تحل» وأعطهم الوقت اللازم لذلك.

اختبار سريع

١ إذا كانت سنة س = ٢٠٠٢ تمثل بـ س = ٢، فكيف تمثل سنة: س = ٢٠٠٠؟ س = ٢٠٠٦؟ س = ٢٠٠٩؟

س = ٢٠٠٠ تمثل بـ س = صفر،

س = ٢٠٠٦ تمثل بـ س = ٦،

س = ٢٠٠٩ تمثل بـ س = ٩

٢ إذا كانت المعادلة هي: $\hat{S} = ١,٣س - ٢,٠$ ، فقدر \hat{S} سنة ٢٠٠٥.

س = ٢٠٠٥ تمثل بـ س = ٥

نعوض بالمعادلة س = ٥

$\hat{S} = ١,٣(٥) - ٢,٠ = ٠,٤٥$

ض $f = ب س$
 $١,٢٧٧٢ = ٥ \times ٠,١١٥٦ + ٠,٦٩٩٢ = ٢,١١٢$
 مقدار الخط = $|١,٢٧٧٢ - ١,٨| = ٠,٥٢٢٨$
 أي أن مقدار الخطأ في عدد الخبراء ٥٢٢٨، $٨ = ١٠٠٠ \times ٠,٥٢٢٨$ ، $٥٢٢,٨ = ٥٢٣$ خبيراً

حاول أن عمل

١ بين الجدول التالي عدد مستخدمي شبكة الإنترنت بالآلاف في دولة ما من سنة ٢٠٠٠ حتى سنة ٢٠٠٨

السنوات (س)	٢٠٠٠	٢٠٠١	٢٠٠٢	٢٠٠٣	٢٠٠٤	٢٠٠٥	٢٠٠٦	٢٠٠٧	٢٠٠٨
عدد المستخدمين (بالآلاف) (ص)	١٠٠	١٥٠	٢٠٠	٣٠٠	٤٠٠	٦٠٠	٩٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠

١ أوجد معادلة الاتجاه العام.

٢ قدر عدد مستخدمي شبكة الإنترنت سنة ٢٠١٢

٣ أوجد مقدار الخطأ سنة ٢٠٠٦

مثال (٢)

بين الجدول التالي التكلفة لإنتاج إحدى السلع بالآلاف دينار كويتي من سنة ٢٠٠٦ حتى سنة ٢٠١٣

السنة (س)	٢٠٠٦	٢٠٠٧	٢٠٠٨	٢٠٠٩	٢٠١٠	٢٠١١	٢٠١٢	٢٠١٣
التكلفة (بالآلاف دينار) (ص)	١٥	١٦	١٨	١٨	٢٠	٢٢	٢٤	٢٨

١ أوجد معادلة الاتجاه العام لتكلفة إنتاج السلعة.

٢ قدر قيمة التكلفة عام ٢٠١٧

٣ احسب مقدار الخطأ سنة ٢٠١١

المجموعة ب تمارين تعزيزية

(١) بين الجدول التالي متغيرين، الزمن (س) بالسنوات و(ص) كمية الدجاج المجمد في دولة الكويت بالمليون كيلوجرام.

الزمن (س)	١٩٩٧	١٩٩٨	١٩٩٩	٢٠٠٠	٢٠٠١	٢٠٠٢
كمية الدجاج بالمليون (ص)	٢٤	٢٧	٣٠	٣٣	٤٢	٣٧

(أ) أوجد معادلة الاتجاه العام للدجاج المجمد في الكويت.

(ب) قدر كم ستصبح قيمة ص سنة ٢٠٠٥

(ج) احسب مقدار الخطأ لسنة ٢٠٠٠

(٢) من الجدول التالي:

الزمن (س)	٢٠٠٠	٢٠٠١	٢٠٠٢	٢٠٠٣	٢٠٠٤	٢٠٠٥
ص	٨,٧	٥,٥	٥,٦٥	٥,٨	٥,٣	٤,٢

(أ) أوجد معادلة الاتجاه العام

(ب) قدر قيمة ص سنة ٢٠٠٩

(ج) احسب مقدار الخطأ لسنة ٢٠٠١

٩ إجابات وحلول

«دعنا نفكر وتناقش»

(أ) $r = -7,056$


يوجد ارتباط عكسي (سالب) قوي.

(ب) $\hat{ص} = 2418,5571 - 23,0733 \times س$

(ج) $س \approx 37,03$ ، تدخن الأم يومياً حوالي 7 سجائر.

«حاول أن تحل»

(أ) ١



الحل:

١ نعتبر سنة ٢٠٠٦ هي السنة الأساس.

السنوات	ص	س	ص	س	ص	س
٢٠٠٦	٠	١٥	٠	٠	٠	٠
٢٠٠٧	١	١٦	١٦	١	١٦	١
٢٠٠٨	٢	١٨	٣٦	٢	٣٦	٤
٢٠٠٩	٣	١٨	٥٤	٣	٥٤	٩
٢٠١٠	٤	٢٠	٨٠	٤	٨٠	١٦
٢٠١١	٥	٢٢	١١٠	٥	١١٠	٢٥
٢٠١٢	٦	٢٤	١٤٤	٦	١٤٤	٣٦
٢٠١٣	٧	٢٨	١٩٦	٧	١٩٦	٤٩
المجموع	٢٨ = $\sum س$	١٦١ = $\sum ص$	٦٣٦ = $\sum ص \times س$	١٤٠ = $\sum س^2$		

$$ن = \frac{\sum ص}{n} = \frac{161}{8} = 20,125 \quad س = \frac{\sum س}{n} = \frac{28}{8} = 3,5$$

$$ب = \frac{n(\sum ص \times س) - (\sum ص)(\sum س)}{n(\sum س^2) - (\sum س)^2} = \frac{8(636) - (161)(28)}{8(140) - (28)^2} = \frac{5104 - 4508}{1120 - 784} = \frac{596}{336} = 1,7722$$

$$١ = ص - ب \times س \Rightarrow ١٤,٠٨٣٣ = ٣,٥ \times (١,٧٢٢٢) - ٢٠,١٢٥$$

∴ معادلة الاتجاه العام هي:

$$\hat{ص} = ١,٧٢٢٢ + ١٤,٠٨٣٣ \times س$$

١ قيمة التكلفة سنة ٢٠١٧ عند $س = ١١$

$$\hat{ص}_{٢٠١٧} = ١,٧٢٢٢ + ١٤,٠٨٣٣ \times ١١ = ١٥٧,٧١٤٣$$

∴ $\hat{ص}_{٢٠١٧} = ١٥٧,٧١٤٣$ ألف دينار

$$\hat{ص}_{٢٠١١} = ١,٧٢٢٢ + ١٤,٠٨٣٣ \times ٥ = ٨٠,٨٣٣٣$$

$$\hat{ص}_{٢٠١١} - \hat{ص}_{٢٠١٧} = ٨٠,٨٣٣٣ - ١٥٧,٧١٤٣ = -٧٦,٨٨١٠$$

٨١

∴ مقدار الخطأ = $|ص_{٢٠١١} - \hat{ص}_{٢٠١١}|$

$$= |٢٢ - ٩٨,٧١٤٣| = ٧٦,٧١٤٣$$

∴ مقدار الخطأ = ٧٦,٧١٤٣ ديناراً

حاول أن تحل

٢ الجدول التالي يبين قيم ظاهرة معينة خلال ٧ سنوات.

السنة	١٩٩٨	١٩٩٩	٢٠٠٠	٢٠٠١	٢٠٠٢	٢٠٠٣	٢٠٠٤
قيم الظاهرة	٣	٥	٨	١٠	١٤	١٦	١٨

١ أوجد معادلة الاتجاه العام لقيم الظاهرة.

٢ تنبأ بالقيمة المتوقعة للظاهرة سنة ٢٠٠٧

٣ احسب مقدار الخطأ سنة ٢٠٠٣

مثال (٣)

الجدول التالي يبين إنتاج إحدى شركات السيارات بالألف سيارة من سنة ٢٠٠٧ حتى سنة ٢٠١٣

السنة (س)	٢٠٠٧	٢٠٠٨	٢٠٠٩	٢٠١٠	٢٠١١	٢٠١٢	٢٠١٣
عدد السيارات بالألف (ص)	٤٠	٦٠	٧٠	٩٠	١٠٠	١٥٠	١٨٠

١ أوجد معادلة الاتجاه العام للسلسلة الزمنية

٢ قدر عدد السيارات المنتجة سنة ٢٠١٦

٣ احسب مقدار الخطأ سنة ٢٠١١

٨٢

الاتجاه العام في زيادة مستمرة.

$$\hat{ص} = 3833 \text{ س} + 117,8001$$

(ب) سنة 2012 تمثل بـ $ص = 12$

$$\hat{ص}_{2012} = 3997,1514 \approx 1514$$

(ج) $\hat{ص}_{2012} = 816,14$

$$\text{مقدار الخطأ} = |ص_{2012} - \hat{ص}_{2012}|$$

$$= 16,0999 \approx 16$$

(أ) $\hat{ص} = 2,6071 + 2,7501$ س

(ب) 26,214

(ج) 0,2144

(أ) $\hat{ص} = 83,3928 + 8,6786$ س

(ب) 161,5002

(ج) 0,8928

الحل:

1 نعتبر سنة 2007 هي السنة الأساس.

السنوات	س	ص	س	ص
2007	0	40	0	0
2008	1	60	1	60
2009	2	70	2	140
2010	3	90	3	270
2011	4	100	4	400
2012	5	150	5	750
2013	6	180	6	1080
المجموع	21	690	21	2700

$$ن = \frac{ص}{س} = \frac{690}{21} = 32,8571$$

$$ب = \frac{ص - (ن \times س)}{س} = \frac{690 - (32,8571 \times 21)}{21} = 22,5$$

$$ب = 22,5 - 32,8571 = -10,3571$$

$$ب = 31,0714$$

معادلة الاتجاه العام هي: $ص = ب + ن \times س$

تقدير عدد السيارات المنتجة سنة 2016 أي عند $س = 9$

$$ص = 9 \times 22,5 + 31,0714 = 233,0714$$

تقدير عدد السيارات المنتجة سنة 2016 هو حوالي 234 ألف سيارة.

$$ص_{2011} = 100, 100 = 22,5 \times 6 + 31,0714 = 121,0714$$

$$\text{مقدار الخطأ} = |ص_{2011} - \hat{ص}_{2011}| = |100 - 121,0714| = 21,0714$$

حوالي 21 ألف سيارة.

حاول أن تحل

2 الجدول التالي يوضح مبيعات إحدى الشركات بالألف دينار في الفترة من سنة 2001 وحتى سنة 2007

السنة (س)	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
المبيعات بالألف (ص)	87	91	96	109	119	129	135

أوجد:

1 معادلة خط الاتجاه العام للمبيعات خلال الفترة المذكورة.


2 القيمة المتوقعة للمبيعات عام 2010

3 مقدار الخطأ سنة 2005

المرشد لحل المسائل

المرشد لحل المسائل

يبين الخط المنكسر التالي أعداد السواح الذين قاموا بزيارة دولة الكويت من سنة ١٩٩٥ حتى سنة ٢٠١٠



- 1 كَوِّنْ جدولًا مستخدمًا المعطيات من الرسم البياني للخط المنكسر.
- 2 أوجد معادلة الاتجاه العام.
- 3 قَدِّرْ عدد السواح لسنة ٢٠١٥.
- 4 أوجد مقدار الخطأ سنة ٢٠١٠.

الحل:

يهتم المعطون بتقدير عدد السواح للأعوام القادمة، ويبيح مقدار الخطأ لسنة ٢٠١٠
1 نستخرج المعلومات من الخط المنكسر ونضعها في جدول على الشكل التالي:

السنوات	س	ص	ص	س
١٩٩٥	٠	٠	٧٢٠٠٠	٠
١٩٩٦	١	٧٦٠٠٠	٧٦٠٠٠	١
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮
٢٠١٠	٢٢٥	٣١٠٥٠٠	٢٠٧٠٠٠	١٥
	كس = ٢	كس = ٢١٠٩٥٠٠٠	كس = ٢١٦٥٠٠٠	كس = ١٢٠

معادلة الاتجاه العام:

$$٢٨١٦١,٨ = ٢ \quad , \quad ب = ١٤٢٨٦,٨ \quad , \quad ص = ١٤٢٨٦,٨ + ٢٨١٦١,٨ س$$

٨٥

إجابة «مسألة إضافية»

(أ)

الزمن	س	ص	ص	س
ربع ٤	٠	٠	٢٥٠٠٠	٠
ربع ١	١	٣٥٠٠٠	٣٥٠٠٠	١
ربع ٢	٢	١٥٠٠٠٠	٧٥٠٠٠	٢
ربع ٣	٣	٣٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠	٣
ربع ٤	٤	٧٠٠٠٠٠	١٧٥٠٠٠	٤
ربع ١	٥	١٣٧٥٠٠٠	٢٧٥٠٠٠	٥
ربع ٢	٦	٢٢٥٠٠٠٠	٣٧٥٠٠٠	٦
ربع ٣	٧	٣٥٠٠٠٠٠	٥٠٠٠٠٠	٧
ربع ٤	٨	٥٤٠٠٠٠٠	٦٧٥٠٠٠	٨
	كس = ٣٦	كس = ٢٢٣٥٠٠٠	كس = ٢٢٣٥٠٠٠	كس = ٢٠٤

$$(ب) \quad \hat{ص} = ٧٩٥٠٠ - س = ٦٩٦٦٧$$

$$س = ربع (٢٠١٥) \text{ تمثل } ب = ٢٤$$

$$س ربع (٢٠١٥) = ١٨٣٨٣٣٣$$

$$(ج) \quad \hat{ص} ربع = ٢٤٨٣٣٣ = (٢٠١٠)$$

$$\text{مقدار الخطأ} = |٢٤٨٣٣٣ - ١٧٥٠٠٠| = ٧٣٣٣٣$$

$$٧٣٣٣٣ =$$

تقدّر سنة ٢٠١٥، $س = ٢٠$ ، بالتعويض بـ «ص»:

$$\hat{ص} = ٣١٣٨٩٧$$

نوجد مقدار الخطأ لسنة ٢٠١٠:


$$\text{مقدار الخطأ} = |ص - \hat{ص}| = ٣٥٤٦٤ = |٣١٠٩٥٠٠٠ - ٣١٣٨٩٧|$$

$$٣٥٤٦٤ =$$

مقدار الخطأ تقريباً ٣٥٤٦٤ سائحاً.

مسألة إضافية

يدلّل الخط المنكسر التالي تطور عدد تطبيقات الهواتف الذكية التي تعمل بحسب أحد أنظمة التشغيل وذلك خلال الأرباع التالية من الربع الرابع من سنة ٢٠٠٩ إلى الربع الرابع من سنة ٢٠١١



يهتم المعطون بمعرفة تطور أعداد التطبيقات في الربع الرابع من سنة ٢٠١٥ لما يرتب على ذلك من ارتفاع في المداخل من جراء تحميل هذه التطبيقات في الهواتف الذكية.

1 كَوِّنْ جدولًا كما في «المرشد لحل المسائل» مستخرجًا المعطيات من الرسم البياني للخط المنكسر.

2 ما هو العدد المتوقع للتطبيقات في الربع الرابع من سنة ٢٠١٥؟

3 ما هو مقدار الخطأ في الربع الرابع من سنة ٢٠١٠؟

٨٦

بنود الصح والخطأ

في البنود (١-١٥) عبارات، طلل (أ) إذا كانت العبارة صحيحة، (ب) إذا كانت العبارة خاطئة.

استخدم الجدول التالي للإجابة عن التمارين (١-١١):


الزمن (س)	١	٢	٣	٤	٥
ص	١٣٥	١٤٣	١٤٠	١٥٤	١٥٢

- (١) (أ) (ب)
(٢) (أ) (ب)
(٣) (أ) (ب)
(٤) (أ) (ب)
(٥) (أ) (ب)
(٦) (أ) (ب)
(٧) (أ) (ب)
(٨) (أ) (ب)
(٩) (أ) (ب)
(١٠) (أ) (ب)
(١١) (أ) (ب)
(١٢) (أ) (ب)
(١٣) (أ) (ب)
(١٤) (أ) (ب)
(١٥) (أ) (ب)

- (١) $١٥ = ن$
(٢) $٥١ = ص$
(٣) $٧٢٤ = ص$
(٤) $٣ = ص$
(٥) $١٤٥ = ص$
(٦) $٥٥ = ص$
(٧) $٢٢٧١ = ص$
(٨) $٤,٥ = ب$
(٩) $١٣١,٣ = ب$

- (١٠) معادلة الاتجاه العام هي: $ص = ٤,٥س + ١٣١,٣$
(١١) تقدير ص عندما $س = ٦$ هو ١٨٥
(١٢) لا تتغير السلسلة الزمنية بالمتغيرات الفجائية.
(١٣) السلسلة الزمنية هي تتبع لقيم ظاهرة معينة عبر الزمن.
(١٤) تتأثر السلسلة الزمنية بمتغير واحد فقط هو التغيرات الدورية.
(١٥) التغيرات الدورية فترتها تكون أكبر من سنة.

مخطط تنظيمي للوحدة الثالثة



ملخص

- السلسلة الزمنية هي مجموعة قيم تأخذها ظاهرة ما في فترات زمنية مختلفة.
- المنحنى التاريخي للسلسلة الزمنية هو الخط المكسر الذي يربط النقاط الممتدة للبيانات.
- الاتجاه العام هو الاتجاه الذي تأخذه السلسلة على مدة طويلة من الزمن.
- الاتجاه العام للسلسلة يمكن أن يكون تصاعدياً أو تنازلياً أو كليهما معاً.
- التغيرات الموسمية هي تغيرات تتكرر بانتظام خلال فترات معينة من الزمن تكون مدتها أقل من سنة.
- التغيرات الدورية هي تغيرات على فترة طويلة المدى أي أكثر من سنة.
- التغيرات العرضية هي تغيرات فجائية تعود إلى الصدفة البحتة أو إلى أمور يصعب تكهنها.
- معادلة الاتجاه العام تستخدم في عملية التكهّن بقيم الظاهرة لفترات زمنية مستقبلية، وتعطى بالقاعدة: $ص = ب + ب$

حيث: $ب = \frac{ن(ص) - (ص)(ص)}{ن(ص) - (ص)}$ ، $ب = ص - ب$

استخدم الجدول التالي للإجابة عن التمارين من (١٦ - ٢٠):


أرقام الفصل (س)	١	٢	٣	٤	٥
المبيعات (ص)	١٥	٢٠	١٢	١٣	٤٠
بالاتف الدنانير					

- (١٦) $ص =$
(أ) ٣ (ب) ٥ (ج) ١٥ (د) ليس مما سبق
(١٧) $ص =$
(أ) ٢٥ (ب) ٢٠ (ج) ١٠٠ (د) ليس مما سبق
(١٨) $ب =$
(أ) ٤,٣- (ب) ٣,٤ (ج) ٤,٣ (د) ٣,٤-
(١٩) $ب =$
(أ) ٣ (ب) ٣- (ج) ١,٥ (د) ٧,١

(٢٠) معادلة الاتجاه العام هي:

- (أ) $ص = ١,٥س + ٤,٣$ (ب) $ص = ٧,١س + ٤,٣$
(ج) $ص = ٤,٣س + ٧,١$ (د) $ص = ١,٥س + ٣$

(٢١) الشكل المقابل يبين عدد الأميين خلال الفترة الزمنية المحددة (٢٠٠٠ - ٢٠٠٣) فإن الاتجاه العام للسلسلة الزمنية يشير إلى:



اختبار الوحدة الثالثة

أسئلة المقال

(١) يبين الجدول التالي إنتاج القمح (ص) في بلد ما بملايين الكيلوجرامات على مدى ٨ سنوات.

الزمن (س)	٢٠٠٥	٢٠٠٦	٢٠٠٧	٢٠٠٨	٢٠٠٩	٢٠١٠	٢٠١١	٢٠١٢
كمية الإنتاج (ص)	٢٥٢٨	٢٦٧٨	٢٤٢٨	١٣٠٥	١٩٧٥	٢٨٧٥	٢٥٧٤	٢١٠٠

- (أ) أوجد معادلة الاتجاه العام المناسبة.
(ب) قُدّر كم سيصبح الإنتاج سنة ٢٠١٤
(ج) أوجد مقدار الخطأ سنة ٢٠٠٨
(د) يدوّن متجر لبيع المنتجات مبيعاته اليومية في الجدول التالي على مدى أسبوع:

الزمن (س)	١	٢	٣	٤	٥	٦	٧
المبيعات (ص)	١٣٥	١٣٧	١٧٤	١٤٨	١٨١	٢٠٤	٢٠٠

- (أ) أوجد معادلة الاتجاه العام المناسبة.
(ب) قُدّر قيمة المبيعات يوم $س = ١٧$
(ج) أوجد مقدار الخطأ عدد $س = ٤$
(د) يبين الجدول التالي إنتاج الغاز الطبيعي (ص) بمئات ملايين الأمتار المكعبة $\times ١٠٠$ كل سنتين من سنة ٢٠٠٢ حتى سنة ٢٠٠٨

الزمن (س)	٢٠٠٢	٢٠٠٤	٢٠٠٦	٢٠٠٨
إنتاج الغاز (ص)	٨,٧	٩,٧	١٢,٥	١٢,٧

- (أ) أوجد معادلة الاتجاه العام المناسبة.
(ب) قُدّر كم سيكون الإنتاج سنة ٢٠١٢

تمارين إثرائية

(١) يسجل سائق حافلة نقل عمومية عدد الركاب خلال أيام الأسبوع ابتداءً من يوم الاثنين :

الزمن باليوم (س)	الاثنين (١)	الثلاثاء (٢)	الأربعاء (٣)	الخميس (٤)	الجمعة (٥)	السبت (٦)	الأحد (٧)
عدد الركاب (ص)	١٥٠	١٥٥	١٥٣	١٤٨	٢٢٠	١٣٠	١٢٠

(أ) أوجد معادلة خط الاتجاه العام لأعداد الركاب خلال أيام الأسبوع.

(ب) قَدِّر عدد الركاب ليوم الجمعة التالي.

(ج) احسب مقدار الخطأ عند $s = 1$ ، وعند $s = ٥$

(٢) مسؤول في شركة إنتاج للأفلام السينمائية يسجل عدد الزبائن خلال أيام الأسبوع :

أيام الأسبوع (س)	الاثنين (١)	الثلاثاء (٢)	الأربعاء (٣)	الخميس (٤)	الجمعة (٥)	السبت (٦)	الأحد (٧)
عدد الزبائن (ص)	٣٠٠	٢٨٠	٢٩٠	٣١٥	٩١٠	٨٠٠	٢٩٠

(أ) أوجد معادلة خط الاتجاه العام لعدد الزبائن.

(ب) قَدِّر عدد الزبائن ليوم الأربعاء التالي.

(ج) أوجد مقدار الخطأ ليوم الخميس.

(٢٢) إذا كانت معادلة الاتجاه العام لأعداد الطلبة خلال الفترة من ١٩٩٦ حتى عام ٢٠٠٤ هي

$$\hat{y} = 2,82x + 1,8 \text{ فإن العدد المتوقع للطلاب المتقدمين عام } 2007 \text{ هو،}$$

٢٧ (أ) ٣٠ (ب) ٢٨ (ج) ٥ (د) ليس أيًا مما سبق

(٢٣) العوامل التي تؤثر في السلسلة الزمنية هي:

الاتجاه العام فقط (أ) التغيرات الدورية فقط (ب)

التغيرات الموسمية والعرضية (ج) جميع ما سبق (د)

(٢٤) الجدول التالي يوضح عدد الطلاب المتقدمين للحصول على شهادة الماجستير من إحدى الكليات من عام ١٩٩٨م وحتى عام ٢٠٠٤م

السنة	١٩٩٨	١٩٩٩	٢٠٠٠	٢٠٠١	٢٠٠٢	٢٠٠٣	٢٠٠٤
عدد الطلاب	٣	٤	٦	١٠	١٢	١٥	٢٠

فإذا كانت معادلة الاتجاه العام لأعداد الطلاب خلال الفترة المذكورة $\hat{y} = 2,82x + 1,54$

فإن العدد المتوقع للطلاب المتقدمين عام ٢٠٠٧ تقريبًا:

٢٧ (أ) ٢٦ (ب) ٢٨ (ج) ٥ (د) ليس أيًا مما سبق

المجموعة ١ تمارين أساسية

$$(١) (أ) \frac{\alpha - 1}{2} = \frac{0,97}{2} = 0,485, \text{ نبحث في الجدول عن القيمة } 0,485 \text{ إذا } U_{\frac{\alpha}{2}} = 2,17$$

$$(ب) \frac{\alpha - 1}{2} = \frac{0,94}{2} = 0,47, \text{ القيمة } 0,47 \text{ تقع في الجدول بين القيمتين } 0,4699, 0,4706$$

$$\text{إذا } U_{\frac{\alpha}{2}} = \frac{1,89 + 1,88}{2} = 1,885$$

$$(ج) \frac{\alpha - 1}{2} = \frac{0,98}{2} = 0,49, \text{ القيمة } 0,49 \text{ تقع في الجدول بين القيمتين } 0,4898, 0,4901$$

$$\text{إذا } U_{\frac{\alpha}{2}} = \frac{2,33 + 2,32}{2} = 2,325$$

$$(د) \frac{\alpha - 1}{2} = \frac{0,92}{2} = 0,46, \text{ القيمة } 0,46 \text{ تقع في الجدول بين القيمتين } 0,4599, 0,4608$$

$$\text{إذا } U_{\frac{\alpha}{2}} = \frac{1,76 + 1,75}{2} = 1,755$$

$$(٢) (أ) \therefore \text{ مستوى الثقة } 95\% \therefore U_{\frac{\alpha}{2}} = 1,96$$

$$\therefore \sigma \text{ معلومة } \therefore \text{ هامش الخطأ ه } = U_{\frac{\alpha}{2}} \times \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$$

$$\therefore \text{ ه } = \frac{16\sqrt{2}}{64\sqrt{2}} \times 1,96 = \frac{1}{4} \times 1,96 = 0,49$$

$$(ب) \text{ فترة الثقة هي } (\bar{s} - \text{ه}, \bar{s} + \text{ه}) = (0,2, 1,2, 98, 13)$$

(ج) عند اختيار ١٠٠ عينة عشوائية ذات الحجم نفسه (ن = ٦٤) وحساب حدود فترة الثقة لكل عينة فإننا نتوقع أن ٩٥ فترة تحوي القيمة الحقيقية للمتوسط الحسابي μ للمجتمع الإحصائي.

$$(٣) (أ) U_{\frac{\alpha}{2}} = 1,96, \text{ ه } = U_{\frac{\alpha}{2}} \times \frac{\sigma}{\sqrt{n}} = \frac{0,5}{1000\sqrt{2}} \times 1,96 = 0,0310$$

$$(ب) \text{ فترة الثقة هي } (\bar{s} - \text{ه}, \bar{s} + \text{ه}) = (0,4, 9690, 0,0310, 5)$$

(ج) عند اختيار ١٠٠ عينة عشوائية ذات الحجم نفسه (ن = ١٠٠٠) وحساب حدود فترة الثقة لكل عينة فإننا نتوقع أن ٩٥ فترة تحوي القيمة الحقيقية للمتوسط الحسابي μ للمجتمع الإحصائي.

$$(٤) (أ) U_{\frac{\alpha}{2}} = 1,96, \text{ ه } = U_{\frac{\alpha}{2}} \times \frac{\sigma}{\sqrt{n}} = \frac{1,25\sqrt{2}}{25\sqrt{2}} \times 1,96 = 0,4383$$

$$(ب) \text{ فترة الثقة هي } (\bar{s} - \text{ه}, \bar{s} + \text{ه}) = (0,5617, 0,4383, 7, 8)$$

(ج) عند اختيار ١٠٠ عينة عشوائية ذات الحجم نفسه (ن = ٢٥) وحساب حدود فترة الثقة لكل عينة فإننا نتوقع أن ٩٥ فترة تحوي القيمة الحقيقية للمتوسط الحسابي μ للمجتمع الإحصائي.

$$(5) (أ) \sigma = \frac{\alpha}{\sqrt{2}} = 1,96 \text{ غير معلوم، } n < 30 \therefore \text{هـ} = \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \times \frac{\alpha}{\sqrt{2}} = 1,96 \times \frac{2,2}{\sqrt{80}} \approx 0,4821$$

$$(ب) \text{ فترة الثقة هي } (0,4821 - 0,8, 0,4821 + 0,8) = (0,3179, 0,2821)$$

(ج) عند اختيار 100 عينة عشوائية ذات الحجم نفسه (n = 80) وحساب حدود فترة الثقة لكل عينة فإننا نتوقع أن 95 فترة تحوي القيمة الحقيقية للمتوسط الحسابي μ للمجتمع الإحصائي.

$$(6) (أ) \therefore \sigma \text{ غير معلوم، } n \geq 30 \therefore \text{نستخدم توزيع ت.}$$

$$\therefore n = 13 \therefore \text{ درجات الحرية } (n - 1) = 13 - 1 = 12$$

$$\therefore \text{ مستوى الثقة } 1 - \alpha = 95\% \therefore \alpha - 1 = 95 \Leftarrow \alpha = 0,050$$

$$\therefore \frac{\alpha}{\sqrt{2}} = 0,25 \text{، من جدول توزيع ت تكون قيمة ت } = \frac{\alpha}{\sqrt{2}} = 0,25 \therefore 2,179$$

$$\text{هـ} = \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \times \frac{\alpha}{\sqrt{2}} = \frac{3,5}{\sqrt{13}} \times 2,179 \approx 2,1126$$

$$(ب) \text{ فترة الثقة هي } (\bar{س} - \text{هـ}, \bar{س} + \text{هـ}) = (27,8874, 32,1126)$$

المجموعة ب تمارين تعزيرية

$$(1) (أ) \sigma = \frac{\alpha}{\sqrt{2}} = 1,96 \text{، هـ} = \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \times \frac{\alpha}{\sqrt{2}} = 1,96 \times \frac{0,5}{\sqrt{64}} = 12,25$$

$$(ب) \text{ فترة الثقة هي } (\bar{س} - \text{هـ}, \bar{س} + \text{هـ}) = (147,75, 172,25)$$

(ج) عند اختيار 100 عينة عشوائية ذات الحجم نفسه (n = 64) وحساب حدود فترة الثقة لكل عينة فإننا نتوقع أن 95 فترة تحوي القيمة الحقيقية للمتوسط الحسابي μ للمجتمع الإحصائي.

$$(2) (أ) \sigma = \frac{\alpha}{\sqrt{2}} = 1,96 \text{، هـ} = \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \times \frac{\alpha}{\sqrt{2}} = 1,96 \times \frac{44}{\sqrt{11}} = 3,92$$

$$(ب) \text{ فترة الثقة هي } (\bar{س} - \text{هـ}, \bar{س} + \text{هـ}) = (26,58, 42,34)$$

$$(3) (أ) \sigma = \frac{\alpha}{\sqrt{2}} = 1,96 \text{، هـ} = \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \times \frac{\alpha}{\sqrt{2}} = 1,96 \times \frac{0,8}{\sqrt{32}} \approx 0,2772$$

$$(ب) \text{ فترة الثقة } = (0,228, 14,0772)$$

(ج) عند اختيار 100 عينة عشوائية ذات الحجم نفسه (n = 32) وحساب حدود فترة الثقة لكل عينة فإننا نتوقع أن 95 فترة تحوي القيمة الحقيقية للمتوسط الحسابي μ للمجتمع الإحصائي.

$$(4) (أ) \text{ درجات الحرية } (n - 1) = 15 - 1 = 14$$

$$1 - \alpha = 95 \Leftarrow \alpha = 0,050 \text{، } \frac{\alpha}{\sqrt{2}} = 0,25 \Leftarrow \alpha = 0,145$$

$$\text{هـ} = \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \times \frac{\alpha}{\sqrt{2}} = \frac{2}{\sqrt{15}} \times 2,145 \approx 2,3261$$

$$(ب) \text{ فترة الثقة } = (-0,6261, 0,261)$$

$$(5) (أ) \quad 1,96 = \frac{\alpha}{2} \quad \text{هـ} \quad 1,96 = \frac{\alpha}{2} \times \frac{ع}{\sqrt{ن}} = \frac{ع}{\sqrt{ن}} \times 1,96 = \frac{119,5}{\sqrt{40}} \approx 37,0334$$

(ب) فترة الثقة = (209,5334, 135,4666)

(ج) عند اختيار 100 عينة عشوائية ذات الحجم نفسه (ن = 40) وحساب حدود فترة الثقة لكل عينة فإننا نتوقع أن 95 فترة تحوي القيمة الحقيقية للمتوسط الحسابي μ للمجتمع الإحصائي.

تمرّن 1-2

اختبارات الفروض الإحصائية

المجموعة 1 تمارين أساسية

(1) (أ) صياغة الفروض

ف: $\mu = 30$ مقابل ف: $\mu \neq 30$

(ب) σ غير معلومة ن = 150، ن < 30، $\bar{س} = 30,3$ ، $ع = 6,5$

∴ نستخدم المقياس الإحصائي $U = \frac{\bar{س} - \mu}{\frac{ع}{\sqrt{ن}}}$

$$\therefore U = \frac{30,3 - 30}{\frac{6,5}{\sqrt{150}}} \approx 0,5653$$

(ج) ∴ مستوى الثقة 95%

$$\therefore \alpha = 0,05 \leftarrow \frac{\alpha}{2} = 0,025$$

$$\therefore \frac{\alpha}{2} = 1,96$$

(د) منطقة القبول هي (-1,96, 1,96)

(هـ) ∴ $0,5653 \in (-1,96, 1,96)$

∴ القرار بقبول فرض العدم $\mu = 30$

(2) (أ) صياغة الفروض

ف: $\mu = 5$ مقابل ف: $\mu \neq 5$

(ب) σ غير معلومة ن = 1000، ن < 30، $\bar{س} = 4,5$ ، $ع = 1$

∴ نستخدم المقياس الإحصائي $U = \frac{\bar{س} - \mu}{\frac{ع}{\sqrt{ن}}}$

$$15,8114 - \approx \frac{5 - 4,5}{1} = 0 \quad \therefore$$

$$0,025 = \frac{\alpha}{2} \leftarrow 0,05 = \alpha \quad \therefore \text{(ج)}$$

$$1,96 = \frac{\alpha}{2} \quad \therefore$$

(د) منطقة القبول هي $(-1,96, 1,96)$

(هـ) $\therefore 15,8114 - \notin (-1,96, 1,96)$

\therefore القرار: نرفض فرض العدم $\mu = 5$ ونقبل الفرض البديل $\mu \neq 5$

(3) (أ) صياغة الفروض: ف: $\mu = 300$ مقابل ف: $\mu \neq 300$

(ب) $\therefore \sigma = 2, 32$ (معلومة)، $n = 20$ ، $\bar{s} = 280$

$$\therefore \text{نستخدم المقياس الإحصائي } t = \frac{\bar{s} - \mu}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}}$$

$$2,7777 - \approx \frac{300 - 280}{\frac{2,32}{20\sqrt{}}} = 0 \quad \therefore$$

$$0,025 = \frac{\alpha}{2} \leftarrow 0,05 = \alpha \quad \therefore \text{(ج)}$$

$$1,96 = \frac{\alpha}{2} \quad \therefore$$

(د) منطقة القبول هي $(-1,96, 1,96)$

(هـ) $\therefore 2,7777 - \notin (-1,96, 1,96)$

\therefore القرار: نرفض فرض العدم $\mu = 300$ ونقبل الفرض البديل $\mu \neq 300$

(4) (أ) صياغة الفروض: ف: $\mu = 35$ مقابل ف: $\mu \neq 35$

(ب) $\therefore \sigma = 7$ (معلومة)، $n = 50$ ، $\bar{s} = 40$

$$\therefore \text{نستخدم المقياس الإحصائي } t = \frac{\bar{s} - \mu}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}}$$

$$5,0508 \approx \frac{35 - 40}{\frac{7}{50\sqrt{}}} = 0 \quad \therefore$$

$$0,025 = \frac{\alpha}{2} \leftarrow 0,05 = \alpha \quad \therefore \text{(ج)}$$

$$1,96 = \frac{\alpha}{2} \quad \therefore$$

(د) منطقة القبول هي (-96, 1, 96, 1)

(هـ) $\therefore 5, 0508 \ni (-96, 1, 96, 1)$

\therefore القرار: نرفض فرض عدم $\mu = 35$ ونقبل الفرض البديل $\mu \neq 35$

(5) (أ) صياغة الفروض: ف: $\mu = 9600$ مقابل ف: $\mu \neq 9600$

(ب) $\therefore \sigma$ غير معلومة $n = 64$, $n < 30$, $\bar{s} = 9420$, $e = 640$

$$\therefore \text{نستخدم المقياس الإحصائي } t = \frac{\bar{s} - \mu}{\frac{e}{\sqrt{n}}}$$

$$t = \frac{9600 - 9420}{\frac{640}{\sqrt{64}}} = 2,25$$

(ج) \therefore مستوى الثقة 95%

$$\therefore \alpha = 0,05 \leftarrow \frac{\alpha}{2} = 0,025$$

$$\therefore t_{\frac{\alpha}{2}} = 1,96$$

(د) منطقة القبول هي (-96, 1, 96, 1)

(هـ) $\therefore -2,25 \ni (-96, 1, 96, 1)$

\therefore القرار: نرفض فرض عدم $\mu = 9600$ ونقبل الفرض البديل $\mu \neq 9600$

(6) (أ) صياغة الفروض: ف: $\mu = 16$ مقابل ف: $\mu \neq 16$

(ب) $\therefore \sigma = 1,4$ (معلومة) $n = 10$, $\bar{s} = 15$

$$\therefore \text{نستخدم المقياس الإحصائي } t = \frac{\bar{s} - \mu}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}}$$

$$t = \frac{16 - 15}{\frac{1,4}{\sqrt{10}}} \approx 2,2588$$

$$(ج) \therefore \alpha = 0,05 \leftarrow \frac{\alpha}{2} = 0,025$$

$$\therefore t_{\frac{\alpha}{2}} = 1,96$$

(د) منطقة القبول هي (-96, 1, 96, 1)

(هـ) $\therefore -2,2588 \ni (-96, 1, 96, 1)$

\therefore القرار: نرفض فرض عدم $\mu = 16$ ونقبل الفرض البديل $\mu \neq 16$

المجموعة ب تمارين تعزيزية

- (أ) (١) صياغة الفروض: ف. $\mu = 200000$ مقابل ف. $\mu \neq 200000$
- (ب) σ غير معلومة $n = 100$ ، $\bar{x} = 195000$ ، $s = 80000$
- \therefore نستخدم المقياس الإحصائي $U = \frac{\bar{x} - \mu}{\frac{s}{\sqrt{n}}}$
- $$U = \frac{195000 - 200000}{\frac{80000}{\sqrt{100}}} = -0,625$$
- (ج) $\alpha = 0,05 \leftarrow \frac{\alpha}{2} = 0,025$
- $\therefore U_{\frac{\alpha}{2}} = 1,96$
- (د) منطقة القبول هي $(-1,96, 1,96)$
- (هـ) $\therefore -0,625 \in (-1,96, 1,96)$
- \therefore القرار بقبول فرض العدم $\mu = 200000$

- (أ) (٢) صياغة الفروض: ف. $\mu = 3,5$ مقابل ف. $\mu \neq 3,5$
- (ب) $\sigma = 0,7$ (معلومة) $n = 200$ ، $\bar{x} = 3,3$
- \therefore نستخدم المقياس الإحصائي $U = \frac{\bar{x} - \mu}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}}$
- $$U = \frac{3,3 - 3,5}{\frac{0,7}{\sqrt{200}}} = -0,406$$
- (ج) $\alpha = 0,05 \leftarrow \frac{\alpha}{2} = 0,025$
- $\therefore U_{\frac{\alpha}{2}} = 1,96$
- (د) منطقة القبول هي $(-1,96, 1,96)$
- (هـ) $\therefore -0,406 \notin (-1,96, 1,96)$
- \therefore القرار: نرفض فرض العدم $\mu = 3,5$ ونقبل الفرض البديل $\mu \neq 3,5$

- (أ) (٣) صياغة الفروض: ف. $\mu = 12$ مقابل ف. $\mu \neq 12$
- $\therefore \sigma = 3,1$ (معلومة) $n = 10$ ، $\bar{x} = 11$

$$\frac{\mu - \bar{s}}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}} = u \quad \therefore \text{نستخدم المقياس الإحصائي } u$$

$$1,0201 - \approx \frac{12 - 11}{\frac{3,1}{10\sqrt{}}}$$

$$0,025 = \frac{\alpha}{2} \leftarrow 0,05 = \alpha \quad \therefore$$

$$1,96 = \frac{\alpha}{2} u \quad \therefore$$

منطقة القبول هي $(-1,96, 1,96)$

$$1,0201 - \in (-1,96, 1,96) \quad \therefore$$

\therefore القرار: بقبول فرض العدم $\mu = 12$

(ب) صياغة الفروض: ف: $\mu = 12$ مقابل ف: $\mu \neq 12$

$$\therefore \sigma \text{ غير معلومة، } n = 25 \text{ (} n \geq 30 \text{) } \bar{s} = 11, ع = 1,1$$

$$\frac{\mu - \bar{s}}{\frac{ع}{\sqrt{n}}} = t \quad \therefore \text{نستخدم المقياس الإحصائي } t$$

$$4,5455 - \approx \frac{12 - 11}{\frac{1,1}{25\sqrt{}}}$$

درجات الحرية $(n - 1) = 25 - 1 = 24$

$$0,025 = \frac{\alpha}{2} \leftarrow 0,05 = \alpha \quad \therefore$$

$$2,064 = \frac{\alpha}{2} t \quad \therefore$$

منطقة القبول هي $(-2,064, 2,064)$

$$4,5455 - \notin (-2,064, 2,064) \quad \therefore$$

\therefore القرار: نرفض فرض العدم $\mu = 12$ ونقبل الفرض البديل $\mu \neq 12$

(4) (أ) صياغة الفروض: ف: $\mu = 42,1$ مقابل ف: $\mu \neq 42,1$

$$(ب) \therefore \sigma \text{ غير معلومة } n = 80, n < 30, \bar{s} = 45,2, ع = 12$$

$$\frac{\mu - \bar{s}}{\frac{ع}{\sqrt{n}}} = u \quad \therefore \text{نستخدم المقياس الإحصائي } u$$

$$2,3106 \approx \frac{42,1 - 45,2}{\frac{12}{80\sqrt{}}}$$

$$(ج) \quad 0,05 = \alpha \leftarrow 0,25 = \frac{\alpha}{4}$$

$$\therefore 1,96 = \frac{\alpha}{4} U$$

(د) منطقة القبول هي $(-1,96, 1,96)$

(هـ) $\therefore 2,3106 \notin (-1,96, 1,96)$

\therefore القرار: نرفض فرض العدم $\mu = 1$ ونقبل الفرض البديل $\mu \neq 1, 42$

اختبار الوحدة الأولى

أسئلة المقال

$$(1) (أ) \quad \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \times \frac{\alpha}{4} U = هـ, 1,96 = \frac{\alpha}{4} U$$

$$هـ = 1,96 = \frac{16\sqrt{4}}{25\sqrt{4}} \times 1,96 = \frac{4}{5} \times 1,96 = 1,568$$

(ب) فترة الثقة هي $(\bar{س} - هـ, \bar{س} + هـ) = (432, 6, 568, 9)$

$$(2) (أ) \quad \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \times \frac{\alpha}{4} U = هـ, 1,96 = \frac{\alpha}{4} U$$

$$هـ = 1,96 = \frac{1,1}{150\sqrt{4}} \times 1,96 = 0,1760$$

(ب) فترة الثقة هي $(\bar{س} - هـ, \bar{س} + هـ) = (3240, 7, 6760, 7)$

$$(3) (أ) \quad \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \times \frac{\alpha}{4} U = هـ, 1,96 = \frac{\alpha}{4} U$$

$$هـ = 1,96 = \frac{4\sqrt{4}}{160\sqrt{4}} \times 1,96 = 0,30988$$

(ب) فترة الثقة هي $(\bar{س} - هـ, \bar{س} + هـ) = (8, 99012, 60988, 9)$

(4) (أ) صياغة الفروض: ف: $\mu = 100000$ مقابل ف: $\mu \neq 100000$

(ب) $\therefore \sigma = 100000\sqrt{4} = 100000$ (معلومة) $n = 50, \bar{س} = 95000$

$$\therefore \text{نستخدم المقياس الإحصائي } U = \frac{\bar{س} - \mu}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}}$$

$$\therefore U = \frac{95000 - 100000}{\frac{100000}{50\sqrt{4}}} = -353,5534$$

$$(ج) \quad 0,05 = \alpha \leftarrow 0,025 = \frac{\alpha}{2}$$

$$\therefore 1,96 = \frac{\alpha}{2} t$$

(د) منطقة القبول هي $(-1,96, 1,96)$

$$(هـ) \quad -353,5534 \ni (-1,96, 1,96)$$

\therefore القرار: نرفض فرض العدم $\mu = 1000000$ ونقبل الفرض البديل $\mu \neq 1000000$

(5) (أ) صياغة الفروض: ف: $\mu = 22$ مقابل ف: $\mu \neq 22$

(ب) σ غير معلومة، $n = 10$ ($n \geq 30$) $\bar{s} = 20$ ، $\bar{c} = 4$

$$\therefore \text{نستخدم المقياس الإحصائي ت} = \frac{\bar{s} - \mu}{\frac{\bar{c}}{\sqrt{n}}}$$

$$ت = \frac{22 - 20}{\frac{4}{\sqrt{10}}} \approx -1,5811$$

(ج) درجات الحرية $(n - 1) = 10 - 1 = 9$

$$\therefore 0,05 = \alpha \leftarrow 0,025 = \frac{\alpha}{2}$$

$$\therefore ت = 2,262 = \frac{\alpha}{2}$$

(د) منطقة القبول هي $(-2,262, 2,262)$

$$(هـ) \quad -1,5811 \ni (-2,262, 2,262)$$

\therefore القرار: بقبول فرض العدم $\mu = 22$

(6) (أ) صياغة الفروض: ف: $\mu = 50$ مقابل ف: $\mu \neq 50$

(ب) $\sigma = 9\sqrt{3} = 3$ (معلومة) $n = 35$ ، $\bar{s} = 47$

$$\therefore \text{نستخدم المقياس الإحصائي } u = \frac{\bar{s} - \mu}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}}$$

$$u = \frac{50 - 47}{\frac{3}{\sqrt{35}}} \approx 5,9161$$

$$(ج) \quad 0,05 = \alpha \leftarrow 0,025 = \frac{\alpha}{2}$$

$$\therefore 1,96 = \frac{\alpha}{2} t$$

(د) منطقة القبول هي $(-1,96, 1,96)$

$$(هـ) \therefore -9161, 5 \approx (-96, 1, 96, 1)$$

\therefore القرار: نرفض فرض العدم $\mu = 50$ ونقبل الفرض البديل $\mu \neq 50$

(٧) (أ) صياغة الفروض: ف: $\mu = 42$ مقابل ف: $\mu \neq 42$

$\therefore \sigma$ غير معلومة $n = 35$, $n < 30$, $\bar{s} = 40$, $\bar{c} = 3$

$$\therefore \text{نستخدم المقياس الإحصائي } U = \frac{\bar{s} - \mu}{\frac{\bar{c}}{\sqrt{n}}}$$

$$3,9441 - \approx \frac{42 - 40}{\frac{3}{\sqrt{35}}} = U$$

$$\therefore \alpha = 0,05 \leftarrow \frac{\alpha}{2} = 0,025$$

$$\therefore U_{\frac{\alpha}{2}} = 1,96$$

منطقة القبول هي $(-96, 1, 96, 1)$

$$\therefore -3,9441 \approx (-96, 1, 96, 1)$$

\therefore القرار: نرفض فرض العدم $\mu = 42$ ونقبل الفرض البديل $\mu \neq 42$

(ب) صياغة الفروض: ف: $\mu = 42$ مقابل ف: $\mu \neq 42$

$\therefore \sigma$ غير معلومة، $n = 25$ ($n \geq 30$), $\bar{s} = 40$, $\bar{c} = 3$

$$\therefore \text{نستخدم المقياس الإحصائي } T = \frac{\bar{s} - \mu}{\frac{\bar{c}}{\sqrt{n}}}$$

$$\therefore T = 3,3333 - \approx \frac{42 - 40}{\frac{3}{\sqrt{25}}}$$

$$\text{درجات الحرية (ن - 1) } = 25 - 1 = 24$$

$$\therefore \alpha = 0,05 \leftarrow \frac{\alpha}{2} = 0,025$$

$$\therefore T_{\frac{\alpha}{2}} = 2,064$$

منطقة القبول هي $(-2,064, 2,064)$

$$\therefore -3,3333 \approx (-2,064, 2,064)$$

\therefore القرار: نرفض فرض العدم $\mu = 42$ ونقبل الفرض البديل $\mu \neq 42$

بنود الصح والخطأ

- (أ) (١) (ب) (٢) (ب) (٣) (أ) (٤) (٥) (أ)
 (أ) (٦) (أ) (٧) (أ) (٨) (ب) (٩) (أ) (١٠)

بنود الاختيار من متعدد

- (ب) (١١) (ب) (١٢) (أ) (١٣) (ب) (١٤) (ج) (١٥)
 (ب) (١٦) (أ) (١٧) (ج) (١٨) (أ) (١٩) (ج) (٢٠)
 (أ) (٢١) (ب) (٢٢) (ج) (٢٣) (د) (٢٤) (ب) (٢٥)
 (ب) (٢٦) (أ) (٢٧) (أ) (٢٨) (د) (٢٩) (ب) (٣٠)

تمارين إثرائية

$$(1) (أ) \quad \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \times \frac{\alpha}{2} = 1,96 = \frac{\alpha}{2} \quad \text{هـ}$$

$$\text{هـ} = 1,96 = \frac{9\sqrt{2}}{130\sqrt{2}} \times 1,96 \approx 0,5157$$

(ب) فترة الثقة هي $(\bar{s} - \text{هـ}, \bar{s} + \text{هـ}) = (28,5157, 27,4843)$

(2) (أ) $\because \sigma^2$ غير معلوم، $n \geq 30$ \therefore نستخدم توزيع ت.

$$\because n = 25$$

$$\therefore \text{درجات الحرية (ن - 1)} = 25 - 1 = 24$$

$$\therefore \text{مستوى الثقة } 1 - \alpha = 95\%$$

$$\therefore 1 - \alpha = 95\% \Leftrightarrow \alpha = 5\%$$

$$\therefore \frac{\alpha}{2} = 2,5\%$$

من جدول توزيع ت تكون قيمة ت $\frac{\alpha}{2} = 2,5\%$ $= 2,064$

$$\text{هامش الخطأ هـ} = \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \times \frac{\alpha}{2}$$

$$\text{هـ} = 2,064 = \frac{6}{25\sqrt{2}} \times 2,064 = 2,4768$$

(ب) فترة الثقة هي $(\bar{s} - \text{هـ}, \bar{s} + \text{هـ}) = (24,4768, 19,5232)$

(3) (أ) صياغة الفروض: ف: $\mu = 290000$ مقابل ف: $\mu \neq 290000$

(ب) $\sigma = 70000$ (معلومة)، $n = 1500$ ، $\bar{s} = 300000$

$$\therefore \text{نستخدم المقياس الإحصائي } U = \frac{\bar{s} - \mu}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}}$$

$$U \approx \frac{290000 - 300000}{\frac{70000}{\sqrt{1500}}} = 0,5328$$

(ج) $\alpha = 0,05 \leftarrow \frac{\alpha}{2} = 0,025$

$$\therefore U_{\frac{\alpha}{2}} = 1,96$$

(د) منطقة القبول هي $(-1,96, 1,96)$

(هـ) $\therefore 0,5328 \notin (-1,96, 1,96)$

\therefore القرار: نرفض فرض العدم $\mu = 290000$ وقبول الفرض البديل $\mu \neq 290000$

(4) (أ) صياغة الفروض: ف: $\mu = 10$ مقابل ف: $\mu \neq 10$

(ب) σ غير معلومة $n = 40$ ، $n < 30$ ، $\bar{s} = 9$ ، $\bar{c} = 4$

$$\therefore \text{نستخدم المقياس الإحصائي } U = \frac{\bar{s} - \mu}{\frac{\bar{c}}{\sqrt{n}}}$$

$$U \approx \frac{10 - 9}{\frac{4}{\sqrt{40}}} = 1,5811$$

(ج) $\alpha = 0,05 \leftarrow \frac{\alpha}{2} = 0,025$

$$\therefore U_{\frac{\alpha}{2}} = 1,96$$

(د) منطقة القبول هي $(-1,96, 1,96)$

(هـ) $\therefore 1,5811 \in (-1,96, 1,96)$

\therefore القرار بقبول فرض العدم $\mu = 10$

(5) (أ) صياغة الفروض: ف: $\mu = 150$ مقابل ف: $\mu \neq 150$

$\sigma = 10$ (معلومة) $n = 40$ ، $\bar{s} = 143$

$$\therefore \text{نستخدم المقياس الإحصائي } U = \frac{\bar{s} - \mu}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}}$$

$$4,4272 - \approx \frac{150 - 143}{\frac{10}{\sqrt{40}}} = U$$

$$0,025 = \frac{\alpha}{4} \leftarrow 0,05 = \alpha \quad \therefore$$

$$1,96 = \frac{\alpha}{4} U \quad \therefore$$

منطقة القبول هي $(-1,96, 1,96)$

$$\therefore 4,4272 - \ni (-1,96, 1,96)$$

\therefore القرار: نرفض فرض العدم $\mu = 150$ ونقبل الفرض البديل $\mu \neq 150$

(ب) صياغة الفروض: $\mu = 150$ مقابل $\mu \neq 150$

$\therefore \sigma$ غير معلومة، $n = 7$ ($n \geq 30$)، $\bar{s} = 143$ ، $\bar{c} = 8$

$$\therefore \text{نستخدم المقياس الإحصائي } T = \frac{\bar{s} - \mu}{\frac{\bar{c}}{\sqrt{n}}}$$

$$T = \frac{150 - 143}{\frac{8}{\sqrt{7}}} \approx 2,315$$

درجات الحرية $(n - 1) = 7 - 1 = 6$

$$0,025 = \frac{\alpha}{4} \leftarrow 0,05 = \alpha \quad \therefore$$

$$\therefore T = \frac{\alpha}{4} = 2,447$$

منطقة القبول هي $(-2,447, 2,447)$

$$\therefore 2,315 - \ni (-2,447, 2,447)$$

\therefore القرار: قبول فرض العدم $\mu = 150$ ونرفض الفرض البديل $\mu \neq 150$

$$(6) \text{ (أ)} \quad \frac{\bar{c}}{\sqrt{n}} \times \frac{\alpha}{4} U = هـ، 1,96 = \frac{\alpha}{4} U$$

$$هـ = \frac{2,5}{\sqrt{36}} \times 1,96 \approx 0,8167$$

(ب) فترة الثقة هي $(\bar{s} - هـ، \bar{s} + هـ) = (10,7833, 12,4167)$

$$(7) \quad \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \times \frac{\alpha}{4} U = هـ، 1,96 = \frac{\alpha}{4} U$$

$$\therefore \frac{20}{\sqrt{n}} \times 1,96 = 3,92$$

$$\therefore 10 = \sqrt{n} \quad \therefore n = 100$$

(أ) (٨) صياغة الفروض: ف: $\mu = 15$ مقابل ف: $\mu \neq 15$

(ب) σ غير معلومة، $n = 5$ ($n \geq 30$)، $\bar{s} = 9$ ، $\bar{c} = 11$

$$\frac{\bar{s} - \mu}{\frac{\bar{c}}{\sqrt{n}}} = \text{ت} \quad \therefore \text{نستخدم المقياس الإحصائي ت}$$

$$\text{ت} = \frac{15 - 9}{\frac{11}{\sqrt{5}}} \approx 1,2197$$

(ج) درجات الحرية ($n - 1$) = $5 - 1 = 4$

$$\alpha = 0,05 \leftarrow \frac{\alpha}{2} = 0,025$$

$$\text{ت} = \frac{\alpha}{2} = 2,776$$

(د) منطقة القبول هي $(-2,776, 2,776)$

(هـ) $\therefore -1,2197 \in (-2,776, 2,776)$

\therefore القرار بقبول فرض العدم $\mu = 15$

(أ) (٩) صياغة الفروض: ف: $\mu = 4$ مقابل ف: $\mu \neq 4$

(ب) σ غير معلومة، $n = 10$ ($n \geq 30$)، $\bar{s} = 3,5$ ، $\bar{c} = 1,2$

$$\frac{\bar{s} - \mu}{\frac{\bar{c}}{\sqrt{n}}} = \text{ت} \quad \therefore \text{نستخدم المقياس الإحصائي ت}$$

$$\text{ت} = \frac{4 - 3,5}{\frac{1,2}{\sqrt{10}}} \approx 1,3176$$

(ج) درجات الحرية ($n - 1$) = $10 - 1 = 9$

$$\alpha = 0,05 \leftarrow \frac{\alpha}{2} = 0,025$$


$$\text{ت} = \frac{\alpha}{2} = 2,262$$

(د) منطقة القبول هي $(-2,262, 2,262)$

(هـ) $\therefore 1,3176 \in (-2,262, 2,262)$

\therefore القرار بقبول فرض العدم $\mu = 4$

المجموعة ١ تمارين أساسية



علاقة عكسية (سالبة).

(٢) $r \approx 0,9862$

(٣) $r \approx -0,9223$ ، نوع الارتباط: عكسي (سالب) قوي.


(٤) $r \approx -0,9785$ ، نوع الارتباط: عكسي (سالب) قوي.

(٥) $r \approx -0,2434$ ، نوع الارتباط: عكسي (سالب) ضعيف.

(٦) $r = 1$ ، نوع الارتباط: طردي (موجب) تام.

(٧) $r \approx 0,5045$ ، نوع الارتباط: طردي (موجب) متوسط.


المجموعة ب تمارين تعزيزية



(ب) $r \approx 0,9673$ ، نوع الارتباط: طردي (موجب) قوي، والعلاقة خطية.

(٢) $r \approx 0,9932$ ، نوع الارتباط: طردي (موجب) قوي، إذاً هناك علاقة خطية بين وزن الدببة ومحيط الصدر.

(٣) $r \approx -0,8507$ ، نوع الارتباط: عكسي (سالب) قوي، إذاً هناك علاقة خطية بين كمية استهلاك الوقود وثقل السيارة.



$r \approx -0,9651$ ، نوع الارتباط: عكسي (سالب) قوي، إذاً هناك علاقة خطية عكسية بين س، ص.

(٥) $r \approx 0,9930$ ، نوع الارتباط: طردي (موجب) قوي.

(٦) $r = 1$ ، نوع الارتباط: طردي (موجب) تام.

(٧) $r = -1$ ، نوع الارتباط: عكسي (سالب) تام.

(٨) $r \approx 0,2766$ ، نوع الارتباط: طردي (موجب) ضعيف.

تمرّن ٢-٢

الانحدار

المجموعة ١ تمارين أساسية

$$(١) \hat{ص} = 0,2830 + 1,1887 \text{ س}$$

$$(٢) \hat{ص} = 66,9586 + 3,0617 \text{ س}$$

$$(ب) \hat{ص} = 66,9586 + 3,0617 \times 90$$

$$= 342,5116$$

$$(٣) \hat{ص} = 6,7802 - 1,7702 \text{ س}$$

$$(ب) \hat{ص} = 6,7802 - 1,7702 \times 50$$

$$= 81,7298$$

$$(ج) \text{ مقدار الخطأ} = |ص_{٤٢} - \hat{ص}_{٤٢}| = 4,4318$$

المجموعة ب تمارين تعزيرية

$$(1) \text{ (أ) } \hat{ص} = ٤٠,٨٣٠٥ - ٣,١٧٨٠ = \text{س}$$

$$(ب) \hat{ص} = ٣ \times ٣,١٧٨٠ - ٤٠,٨٣٠٥ =$$

$$٣١,٢٩٦٥ =$$

إذا عدد الرواد ٣١

$$(2) \text{ (أ) } \hat{ص} = ١٠٧,١٣٩١ - ٠,٢١٧ = \text{س}$$

$$(ب) \hat{ص} = ٩٢,٠٩٢٤ =$$

$$(ج) \text{ مقدار الخطأ} = |٩٨,٢٢٢٦ - ١٠٣| = ٤,٧٧٧٤$$

$$\text{مقدار الخطأ} = |٨٦,٩٨٣٩ - ٨٦| = ٠,٩٨٣٩$$

$$(3) \hat{ص} = ٣ = \text{س}$$

$$(4) \hat{ص} = ٦,٦٥٢٦ - ٠,٢١٠٥ = \text{س}$$

$$(5) \text{ (أ) } \hat{ص} = ٠,٢٦٩٧ + ٠,١٠٤١ = \text{س}$$


$$(ب) \hat{ص} = ٢٣ \times ٠,٢٦٩٧ + ٠,١٠٤١ =$$

$$٦,٣٠٧٢ =$$

إذا عدد أفراد الأسرة ٦

اختبار الوحدة الثانية

أسئلة المقال



لا علاقة.


(ب) $r \approx 0,2259$ ، نوع الارتباط: طردي (موجب) ضعيف.

(2) (أ) $r \approx 0,9803$

(ب) $\hat{ص} = 4934,7275 + 0,9392س$

(ج) $\hat{ص} = 12206,2155$

(د) مقدار الخطأ = $|11946,5195 - 12400| = 453,4805$



علاقة خطية طردية.

(ب) $r \approx 0,9784$

(ج) $\hat{ص} = 38,7908 + 0,4663س$

$\hat{ص} = 57,4428$

(د) مقدار الخطأ = $|62,1058 - 60| = 2,1058$

(4) (أ) $\hat{ص} = 0,13745 + 0,8893س$

(ب) $\hat{ص} = 0,13745 + 8 \times 0,8893$

$= 7,33185$

إذا عدد أفراد الأسرة هو 7

(5) $\hat{ص} = 1 + 2س$

(6) $\hat{ص} = 3 - س$

بنود الصح والخطأ

(5) (أ)

(4) (أ)

(3) (أ)

(2) (ب)


(1) (أ)

بنود الاختيار من متعدد

- (ب) (١٠) (أ) (٩) (د) (٨) (ب) (٧) (د) (٦)
 (ج) (١٥) (د) (١٤) (ج) (١٣) (أ) (١٢) (ج) (١١)

تمارين إثرائية

(١) (أ) $r = 1$




(ج) $\hat{ص} = \frac{1}{4}س$

(د) $\hat{ص} = 6,5 \times \frac{1}{4} = 3,25$

(هـ) الارتباط تام، إذا لكل س مقدار الخطأ = $|ص_s - \hat{ص}_s| = 0$

(٢) (أ) $r = -1$




(ج) $\hat{ص} = 8 - س$

(د) $\hat{ص} = 2,5 - 8 = 5,5$

(هـ) الارتباط تام، إذا لكل س مقدار الخطأ = 0


(أ) (٣)




(ب) $r \approx 0,1290$

$$\hat{ص} = 4,8036 + 0,0714س$$

(ج) مقدار الخطأ = $|5,0178 - 4| = 1,0178$



علاقة خطية طردية (موجبة)



علاقة خطية عكسية (سالبة)

(هـ) $r_1 \approx -0,9254$ (سالبة قوية) ، $r_2 \approx 0,7800$ (موجبة قوية)

(و) $\hat{ص}' = 7,5 - 1,05س$ ، $\hat{ص}'' = 0,15 + 0,85س$

$$\hat{ص}'_p = 7,5 - 1,05 \times 3 = 4,35$$
 ، مقدار الخطأ = $|4,35 - 4| = 0,35$

(ز) $\hat{ص}''_p = 0,15 + 0,85 \times 6 = 4,95$ ، مقدار الخطأ = $|4,95 - 4| = 0,95$

مقدار الخطأ = $|4,95 - 4,0| = 0,95$

$$(4) (أ) \hat{ص} = -0,1 + 0,7 \times س$$

(ب) $\hat{ص}_ه = -0,1 + 0,7 \times 0,5 = 0,05$ ، إذا حجم مبيعاته هو 30500 دينار.


(5) $r \approx -0,2434$ ، نوع الارتباط: عكسي (سالب) ضعيف.

(6) $r \approx 0,8253$ ، نوع الارتباط: طردي (موجب) قوي.


(7) $r \approx 0,6117$ ، نوع الارتباط: طردي (موجب) متوسط.

(8) $r \approx 0,4286$ ، نوع الارتباط: طردي (موجب) ضعيف.


المجموعة ٢ تمارين أساسية



(ب) اتجاه عام للسلسلة الزمنية في تزايد.




(ب) الاتجاه العام في زيادة مستمرة، لأن الرسم البياني هو على شكل خط منكمسر تصاعدي.




(ب) الاتجاه العام في زيادة مستمرة حتى سنة ٢٠٠٢ وثبات من سنة ٢٠٠٢ حتى ٢٠٠٥.


المجموعة ب تمارين تعزيزية



(ب) الاتجاه العام في عدد السكان إلى تزايد.




(ب) الاتجاه العام في زيادة مستمرة.




(ب) الاتجاه العام في زيادة مستمرة.


المجموعة ١ تمارين أساسية




(ب) تغيّر دوري، فبعد أن كان متوسط الدرجات في تزايد مستمر من سنة ٢٠٠٢ حتى ٢٠٠٧، أصبح يتناقص من سنة ٢٠٠٧ حتى ٢٠١٠.




(ب) تتنوع الإجابات. مثال: شهر ٧ أي شهر يوليو كان حار جداً.



(ب) هناك تغيّر موسمي ففي كل خريف يزداد عدد المرضى ليعود ويتناقص في كل شتاء.




(ب) لا، اتجاه عام للسلسلة الزمنية.




(ب) نعم، الاتجاه العام للسلسلة في تزايد.

المجموعة ب تمارين تعزيزية




(ب) الاتجاه العام لطول الرجال في هذا البلد في تزايد مستمر.

(أ) (٢)




(ب) تغيير مفاجئ في سنة ٢٠٠٨ يتمثل بانخفاض جذري لسعر أسهم الشركة.

(أ) (٣)




(ب) الاتجاه العام يظهر أن السعر إلى تناقص.

(أ) (٤)



(ب) الاتجاه العام للسلسلة دوري يتزايد في الفصل الثالث.



(ب) الاتجاه العام للسلسلة دوري يتزايد في الشهرين ٣ و ٤.

تمرن ٣-٣

تحليل السلاسل الزمنية

المجموعة ٢ تمارين أساسية

$$(١) (أ) \hat{ص} = ١٢,٦١٩٠ - ٠,٦١٤٣ س$$

$$(ب) \hat{ص}_{٢٠١٦} = ١٢,٦١٩٠ - ٠,٦١٤٣ \times ١٠ = ٦,٤٧٦$$

$$(ج) \text{مقدار الخطأ} = |\hat{ص}_{٢٠٠٩} - ص_{٢٠٠٩}| = |١٠,٧٧٦١ - ٩| = ١,٧٧٦١$$

$$\text{مقدار الخطأ} = |\hat{ص}_{٢٠١١} - ص_{٢٠١١}| = |١٠,١٦١٨ - ١٠| = ٠,١٦١٨$$

$$(٢) (أ) \hat{ص} = ب + س$$

$$\therefore \hat{ص} = ٤,٥٧١٥ + ١,٣٧١٤ س$$

$$(ب) \hat{ص} = ٤,٥٧١٥ + ٧ \times ١,٣٧١٤$$

$$= ١٤,١٧١٣ \text{ أي } ١٤ \text{ تقريباً.}$$

$$(ج) \hat{ص}_٥ = ٤,٥٧١٥ + ٢ \times ١,٣٧١٤$$

$$= ٧,٣١٤٣$$

$$\therefore \text{مقدار الخطأ} = |٧,٣١٤٣ - ٧|$$

$$= ٠,٣١٤٣$$

$$(3) (أ) \hat{ص} = 5,8286 + 44,7619 = 50,5905$$

$$(ب) \hat{ص}_{\dots 8} = 8 \times 5,8286 + 44,7619 = 91,3907$$

$$(ج) \text{مقدار الخطأ} = |\hat{ص}_{\dots 8} - ص_{\dots 8}| = |91,3907 - 70| = 21,3907$$

المجموعة ب تمارين تعزيرية

$$(1) (أ) \hat{ص} = 3,2286 + 24,0952 = 27,3238$$

$$(ب) \hat{ص}_{\dots 8} = 8 \times 3,2286 + 24,0952 = 49,924$$

$$(ج) \text{مقدار الخطأ} = |\hat{ص}_{\dots 8} - ص_{\dots 8}| = |49,924 - 33,781| = 16,143$$

أي أن مقدار الخطأ هو حوالي ٧٨١٠٠٠ كيلوجرام.

$$(2) (أ) \hat{ص} = 7,4976 - 0,6557 = 6,8419$$

$$(ب) \hat{ص}_{\dots 9} = 9 \times 0,6557 - 7,4976 = 1,0963$$

$$(ج) \text{مقدار الخطأ} = |\hat{ص}_{\dots 9} - ص_{\dots 9}| = |1,0963 - 5,5| = 4,4037$$

اختبار الوحدة الثالثة

أسئلة المقال

$$(1) (أ) \hat{ص} = 2370,5833 - 17,9167 = 2352,6666$$

$$(ب) \hat{ص}_{\dots 14} = 14 \times 17,9167 - 2370,5833 = 2209,333$$

تقدير سنة ٢٠١٤ هو حوالي ٢٢٠٩ مليون كيلوجرام.

$$(ج) \text{مقدار الخطأ} = |\hat{ص}_{\dots 14} - ص_{\dots 14}| = |2209,333 - 1305| = 904,333$$

أي أن مقدار الخطأ هو حوالي ١٠١٢ مليون كيلوجرام.

$$(2) (أ) \hat{ص} = 120,4286 + 12 = 132,4286$$

$$(ب) \hat{ص}_{\dots 17} = 17 \times 12 + 120,4286 = 324,4286$$

أي أن مقدار المبيعات حوالي ٣٢٤

$$(ج) \text{مقدار الخطأ} = |\hat{ص}_{\dots 17} - ص_{\dots 17}| = |324,4286 - 168| = 156,4286$$

$$(3) \text{ (أ) } \hat{ص} = 68 + 8, 48 + 1, 48$$

$$(ب) \hat{ص}_{٢٠١٢} = 68 + 8, 48 + 1, 48 = 5 \times 16, 08$$

أي أن إنتاج الغاز سنة ٢٠١٢ يقدر بـ $16, 08 \times 10^8$ متر مكعب.

بنود الصح والخطأ

- | | | |
|----------|----------|----------|
| (أ) (٣) | (ب) (٢) | (ب) (١) |
| (أ) (٦) | (ب) (٥) | (أ) (٤) |
| (أ) (٩) | (أ) (٨) | (ب) (٧) |
| (ب) (١٢) | (ب) (١١) | (أ) (١٠) |
| (أ) (١٥) | (ب) (١٤) | (أ) (١٣) |
| (ج) (١٨) | (ب) (١٧) | (أ) (١٦) |
| (ب) (٢١) | (ب) (٢٠) | (د) (١٩) |
| (أ) (٢٤) | (د) (٢٣) | (د) (٢٢) |

تمارين إثرائية

$$(1) \text{ (أ) } \hat{ص} = 1429, 164 - 164, 164 - 2, 6071$$

$$(ب) \hat{ص}_{١٢} = 1429, 164 - 164, 164 - 2, 6071 = 12 \times 132, 8577$$

أي حوالى ١٣٣ راكبًا.

$$(ج) \text{ مقدار الخطأ} = |\hat{ص}_1 - ص_1| = |161, 5358 - 150| = 11, 5358$$

$$\text{مقدار الخطأ} = |\hat{ص}_0 - ص_0| = |1074, 151 - 220| = 68, 8926$$

$$(2) \text{ (أ) } \hat{ص} = 1426, 222 + 222, 2143 + 58$$

$$(ب) \hat{ص}_{١٠} = 1426, 222 - 222, 2143 - 10 \times 58 = 604, 2856$$

أي عدد الزبائن حوالى ٦٠٤.

$$(ج) \text{ مقدار الخطأ} = |\hat{ص}_\epsilon - ص_\epsilon| = |454, 9998 - 315| = 139, 9998$$